




BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III

XXV

B

30
P. Q. I.







THE RAPEVTA
NEAPOLITANVS
MARCI AVRELI SEVERINI
AD EXC: FR̄CISCVM MARINVM CARACCIO
LVM ABELLIN PRINC. ET ATRIPALD DUCEM
FELICISSIMVM.





THERAPEVTA
NEAPOLITANVS,

Scu

VENI MECVM
CONSULTOR

**Curandarum febrium, & internorum
omnium morborum.**

*Inclusa Padanchone affectu pestilente, ac
pueros praefocante.*

**Cum Commentario Cl. Thomæ Bartholini
Regis Danorum Archiatri.**

*Quæ SUMMA sunt, TERMINVS,
& CARDUS*

Facilitandæ necessariæ Medicinæ

ERVTA DE SCRIPTIS


MARCI AVRELII
SEVERINI.

Ædedit

GREGORIUS VILLANVS ATRIPALDENSIS
Vtriusq; Medicinæ Doctor, Clariss. Viri
Auditor, & Observator.



NEAPOLI, Typis Roberti Molli. 1653
Sumptibus Ioannis Alberti Tarini.





ILL.^{MO} AC EXC.^{MO} DOMINO

D. FRANCISCO
MARINO
CARACCILO,

*Abellinatum Principi, Atripaldensium
Duci, S. Seuerini Regulo, ac
Magno huius Regni Can-
cellario, &c.*



VM ipse (Excellentiss.
Princeps) Heroum
vestigijs insistas, quid
ni tibi medicas artes
ornamentum esse
existimem? Achillem illum inter

nonnulli dixerunt Auicennam. Mesuem verò Regia familia ortum medicinali scientia instructum, adhuc post obitum intervivos versari videmus, nec inferiorem parentum dignitate, gloriam rerum cognitione acquisivisse. Tu quoque (Princeps Excellentissime) tuorum maiorum splendori lucem addis, cum his artibus seriò incumbas. Quare non ab re duxi præclarissimi mei Magistri opus tibi dicere, cui VENI MECVM Medici Curatoris, idest Praxis curandorum internorum morborum Neapolitana, nomen est, in qua ferè oculorum vno inspectu, Geographorum more, totam medicam artem breuissimè, ac

Heroas non secundum his etiam
artibus imbutum à Chirone,
scientiarum omnium fonte, le-
gimus. Maximilianus primus Im-
perator cum bellis ferè continuis
lacebatur, & minimum ocij ad
literarum studia excolenda reli-
quum habebat, & tamen sæpe de
rebus grauiissimis, tum è Medici-
na, tum è Philosophia sæpius
disserere solebat. Porro à regia ma-
iestate nunquam hæc facultas ab-
horruit. Hanc igitur artem, utpote
nobilissimam, Reges meditari, &
exercere quondam nequaquam
dedignabantur. Quales fuerunt
Sabor, & Giges Medorum Re-
ges; Sabid Rex Arabum; Mithri-
dates Ponti Rex; Aegyptiorum
Hermes; Cordubæ Principem,
non-

graphicè descriptam inspiceres. Non tantum, vt aliquid tuo genio darem, medicum hoc opus tibi nuncupo, sed vt aliquod meæ in te obseruantia argumentum, etiam præberem. Tandem hunc laborem amantissimi mei Magistri animo benignissimo recipias, & per Nestoreos annos viuas vitam rogo. Vale, ornamentum, & totius Italiae nostræ decus.

Excell. Vestrae

Seruus Humillimus, & Homoligijs

Gregorius Villanus.

IN-

INGENVOLECTORI

Operis Insinuatio.

Immensitas Artis medica (benigne Lector) arctissimam humanae vitae periodum sic excedit, ut nemo quantumvis ingenio felix, ac sedulus amplissimos eius fines Hippocrate, & Galeno comprobantibus, perstringere queat. quapropter summa cura mortalibus intendendum est, ut quidquid compertum, atq; exploratum, siue mentis vi, siue industria, siue tradentium beneficio nobis innotuit, literis, & posteritati candide tradatur. Ideo viderer ipse mihi non nihil delinquere, si iuuandae humanitatis haud leuem, quae se offert, occasionem oculis conuiuentibus omitterem. Enimuero inter vniuersas lucubrationes, quas admirando vir ingenio M. Aurelius Seuerinus praeceptor meus in omni vitae summa cum sua laude complexus est: praeticum iuuenum ad medendum apparatus non inuidente genio pertraxit; quem ego suis in plateis aliud agens inueni nuper; Schediasma perbreue, & compendiosum, quod ex observationibus, & curationibus omnigenis, atq; ex doctissimorum Medicorum congressibus ineunte iam adolescentia sub primis medendi stimulis, velut apis è varijs floribus, excerpfit; experimentis, & ratione sic solidatum, atq; contextum opus, ut ex hoc vno praeceps ingenij specimine non obscurum sit, admirabilem hunc virum genuinum naturae interpret-

pretē, & omnis scientia compotem secū initio de-
 xisse copiosa disciplinarum semina; de quibus pri-
 mis natura charagmatis, & initij idem fuisse dis-
 feruit in opere incomparabili, quod nullo exem-
 plo hactenus viso, aut audito, sed suo ipsius lumi-
 ne, & Idea composuit, emphytologice, & pbyfia-
 gogiam inscriptam, methodum methodorum pri-
 mam, & pēdiam summam, qua una lustratas in
 natura libro nannullas artes, artiumue partes
 composuit, quae sunt Pbyfiognomonica medica;
 Zootomia; Dimiatria; Pneusitheoria; Pneu-
 sictbyia cum multis epidochis perelegantibus
 annexis; Agyrama; Vipera Pythia; Magirium
 naturale; Symbola anatomica; Apostimatis; octo
 Differentiae Chirurgicae, quae sunt Exegematicae;
 Illustratae; Authenticae; Inermis, et Spiritalis; Ef-
 ficax; Traumatica; Trimēbris, & Scholaistica
 fructuosa à maioribus non tradita, cuius compo-
 sitiones aut Ideam contemplati, aut fructus ad-
 mirati longinquius germanica gens prima, atque
 ad extremam usque arctum exteri, praestantem
 Seuerini virtutem, & nouam scribendi sagaci-
 tatem non obscure videntur agnouisse. Hanc au-
 tem indagandorum dogmatum dioptram in lucu-
 brationum suarum Synopsis promissam, & à ple-
 risque doctissimis Europae viris efflagitatam non
 longo post tempore sicut confido, promulgabit, &
 non obscurabit, Galeno, non dubito, cognitam, &
 ostensam in libris 14. de demonstratiōe, quae ta-
 men hodierna die non extant. Quas ob res omnes
 non aliena per Deum à tanto viro praxis haec
 pbysiatrica censeretur debet. simul ac enim insignis

VIR

vir laurea donatus est Apollinari, Hippocratica
facultatis improbo cum labore, quotidianisq; cum
experimentis medullam suxit; ac ne sibi pars ul-
la Hippocratica medicina deisset, Chirurgicis
iam grandis natu se tradidit ergastrijs: in quo
ministerio, quia longè maiorem, quam in ceteris
medicina partibus reperijt agendi certitudinem,
aëtorumq; constantiam, mirificas ut hauserit
hoc de fonte pragmateias: in hac optima tamquã
statione sistendum sibi viriliter decreuit; non
sic præcisè tamen, ut penitissimam interna medi-
cina meditationem, & curam animo, vel usu de-
poneret suo; quod continuo patecet, cum in lucem
geminum cõjultationum medicarum nominibus,
& conditionibus singularium, & certorum aëro-
torum, & collegarum prænotatum prodibit opus,
quod non modo vitiorum externorum, verum
etiam internorum remedia quam felicissimè cõ-
monstrabit. Nec vero novum est ab unico Opifi-
ce duplices pertractari facultates. Enimvero Gu-
lielmus à Saliceto, & Hieronymus Fabricius ab
Aquapendente Chirurgici medici solennes, medi-
cam curandarum internarum aff. Etionum me-
thodum edidere: Gabriel vero Falloppius de me-
dicamentis internè purgantibus, ac de natura
fossilium, ac de thermis, deq; alijs huiusmodi phy-
sics thesibus conscripsit. Quo pacto & huius fe-
licator Phil. Ingrassias in Auditorio Neapolita-
no, tum clinicam medendi partem docuit, tum
etiam Anatomicam, & Chirurgicam, usque adeo
ut Chirurgicus per ironiam ab obgannitoribus
Scholasticis publicè fuerit indigitatus; quam rem
ipse

ipse de se perhibuit in Iatrapologia . Taceo Iul.
Cesarem Arantium Bononiensem, Iul. Cesarem
Casserium Placentinum, & Gasparem Taliaco-
tium, aliosq; ducentos, quos hic Author in Physico
Chirurgico Illustrata sua chirurgia c. 14. nomi-
navit. Hoc igitur enucleatum, & luculentum
practica medicina subsidium gestiens, plaudens,
& avidis occurrens vlnis, cordate Lector, exci-
pias, decet, quam hic physiatrus absolutissimus
paratum olim velut enschiridion sibi, suisq; con-
scripserat, praecisis ex industria nil operantibus
sape notioribus subtilioribus, & à Galeno voca-
tis logiatryis; sed qualem ad unguem epitomen
morborum internorum curativam ex Marco Car-
tinaria nunquam satis laudatus descripsit Iaco-
bus Sylvius. Quo demum ipso, tum magistri, tum
meo velut auxiliarij labore gaudeas velim, ut
ego tui gratia, Lector amice gaudeo, qui compos
es factus consultoris tam medendo parati, qualis
est VENI MECUM noster optimo quidem
& illo iure vocatus, quod moneat praxeos medi-
cinae studiosos, ut praemanibus codiculum semper
habeant; si munus suimet ipsorum ritè, rectèq;
& cum aegrotorum fructu peragendum exoptèt,
quemadmodum docet satis emblemata primo operis
fronte praefixum. Addecimus ad hac eiusdem Se-
uerini Pœdaneobonos pestifera curationem, tum
quia Francofortensibus idest longinquis Typis
expressa, & per Academias omnes Europa di-
stracta, viscebatur hic infrequè, quae quidè Vrbis,
quaeuè ditio nostra tam plane frugifero, tamq;
necessario adiumento quid caruisset aperta cum
inria.

iniuria, certoq; cum detrimento: tum quia conie-
cimus & commentarium, quem super tractatum
accuratè, grauiter, ac perdoctè elaberauit alio-
rum complurium immortalium Autor præcla-
rissimus Thomas Bartholinus, & Danorum Re-
gis Archiater dignissimus. Cæterum unum abs-
te velim, æquus sis mendis aliquot elementer con-
donandis, aut non continenter opprobrandis, quæ
vitio festinationis, aut nostri minus vacare va-
lentium, aut excusorum parum aduertentium
operis irrepperunt. nulla siquidem intendi tam
oculata potuit industria, quæ satis esset. Hæc igitur
ubi fas est, comiter, & fraternè dissimula-
re, non gratuitò nos de te, deq; tuis studijs bene-
mereri studentes ama.

Adduntor in Pædanchones partic.vij. satisfac-
toria pag.70.&71. Si supernæ partes tur-
geant, quæ circa caput, vlcera purgatio,
vomitus, aqua. Hippocr. l.2.epid.sect.6. in
quam rem adi Vallesium p.218. Sal autem
vitrioli vomitorium competens, & frugife-
rum Anginz môstrat Io.Querect.loco eius-
dem argumenti proprio, & Angelus Sala in
Iatrochymicis, quæ de Sale vitrioli parando.

ILLVSTRIVM AVTORVM ELOGIA DE SEVERINO.

Quoniam autem exorsus fueram orna-
 menta Seuerini, id ne priuatæ meæ af-
 fectioni, gratiæ referas Lector: en di-
 ctis, & velitationi meæ succinunt eximij, &
 veritatis præindictæ viri, à quorum iudicio
 minimè discrepet cordatus homo quispiam.
 vtinam autem omnes hac loci angustia pro-
 ferri fas esset. è paucis igitur prodeat primus
 Epiphanius Ferdinandus vir plurimis, & his
 vsu probatissimis monumentis conspicuus:
 qui viuens vbi prima Marci scripta deliba-
 set, hæc ad eundem scripsit. *Legi tuum He-*
ptalon admirandum medicum opus. In hoc fa-
cile (ita me Deus adiuuet) perspexi adeò desi-
deratam illam ab Aristotele saphiniam in-
scribendo, necnon angelicam seu sagacitatem,
tuumque acre, ac vastum ingenium. quo qui-
dem factum est; ut simul cum his in te scien-
tiarū ambitus ille optatus (græci encyclopediā
appellant) maximè eluceat: unde tu solus per
Iouem aliquando (nam ero partis æquis) de
ignorantia triumphabis: & sanè triumphasti,
cum medicorum sis iubar, & coryphæus. per-
gratum facies, si ad me scripseris aliquem tibi
reconditum vsu Vena Saluatella. in cu-
iis gratiā Seuerinus iustum Seilomastigis vo-
lumen emisit Francosurti Typis exprimen-
dum, &c. Ità quidem non vnus è ditionis no-
 stræ viris.

E Ge.

E Genuensi vero memorabo primū vniuersæ
sapiētīæ diuinæ, atq; humanæ condū, & pro-
mum omni laude maiorem Fortunium Li-
cetum, qui profatus est alicubi sic: *Non
sine magna iucunditate, parique utilitate legi
solidè doctas Seuerini commentationes in
(particulam Timæi Platonici de Respiratione
pertractantem, & in opusculū Theophrasti de
piscibus in sicco degentibus, ubi se peritissimū
exhibet Academiæ pariter, atq; Peripati, &c.
quæ in 2. & 5. de quæsit. ad quæsit. Seuerini.*

Ex Vrbe verò Roma præclarissimus, & singula-
ris Autor, Archiater item longè dignissimus
Paulus Zacchias in familiari, & genuina sua
quadam epistola tamquam ex Tripode bre-
uibus, & argutis de nostro viro verbis pero-
rauit ad hunc modum. *Quanto m'insuperbi-
sco vedermi honorato dal Signor Marc' Au-
relio Seuerino, persona à giuditio del Mondo,
delle maggiori, che habbia la Republica de
Letterati, &c.*

Ad hos quid senserit de nostro Autore sagacis-
simus P. Castellus patefiet ex eiusdem me-
dic. Epist. V. Seuerino inscripta.

Sequutus est ex Florentino lepore naturæ re-
rum scientissimus, & Asclepiada subtilissimus
Io. Nardius, qui *Pro xenys ait, Natalitjs tibi
debitis, en turbellam, quam excitauit D. Ches-
fletius de Acia. Cor. Celsi: Durum mihi videtur
ferreo filo, quod ille probare nititur, consui-
tunc temporis vulnera consueuisse. quæso Te,
cui utraq; medicina pars exploratissima est,
per ocium profer iudicium,* Me-

Memorandus & hic est Pythagoricæ, Ægyptiacæ, & arcanæ, dogmaticæq; sapientiæ myſta Sūmus Athanaſius Chircherius è Soc. Ieſu, qui inquit, *Certe litera tua, & ſtyli elegantia perpolita, & omni humanitatis genere condita, tales omnium opinione viſa ſunt, quæ æternitati conſecrentur, quod quidem peropportunè in Oedipi opere fieri poſſe cogitavi. in quo litera tua immortalitatis trophæo affixa, quantum Marco Aurelio Seuerino grata poſteritas debeat, ſat ſuperq; docebunt. Viperam tuam Pythiam è manibus non depo-
no, ſemper in omnem occaſionem intentus, ut quanto beneficio, rara, & recondita tua doctrina Remp. literarum obligaris, in Arte magnetica, quæ iam tertiâ parte auctior, & iam tertio recuditur, mundo aperiâ.*

Accedit nunc, è qualis ſcribentium cenſor, & homo naſutus, ut oculatus, & profundè ductus Gaſpar Hofmannus, qui ſcribens ad Seuerinum, hoc illum modo compellat. *Opus tuum de abſceſſibus, & commodè ad me venit per D. Veſlingium, & lectum à me eſt (nihil ſingo) cum ſupore: Tu perge quaſo, & Zootomiam quoq; tuam communica.*

Non indiatus autem hic ibit mihi ſcriptor multiſcius, & omnis naturæ conſultiſſimus Hermannus Corringius, qui librum exquiſitiſſimum de calore innato nuncupauit Seuerino, virum hunc aliquando ſic affatus.
* *Excimia excellentia veſtra eruditio perſpecta mihi fuit ex aureo de Abſceſſibus tra-*
ſlatu,

Statu, cui parem fateor alium eius argumenti non vidit hac aetas: nec parum aucterat opinionem mihi index librorum, quos impossibile expectare iubebat Volsbomerus.

Inter hos vero Ioannes Veslingius in Patauino Lyceo Botanicæ, & Anatomicæ rei professor eruditissimus sic Seuerinum interdum alloquutus est. *Fuit olim, quem à Gadibus ad Liviū visendam fama accersebat: Hodie ab intimo Germania recessu, Belgio, Britannis, Danis, & ab ultimo septentrione ad Tevirerum optime, Neapolim properant, non inania capita, sed solida, & eximia virtutis pectora, ingeniaq; leuissima, &c.*

E Germanicis vero viris & lynceis laudatissimus Ioannes Faber Bambergensis hæc ad Seuerinum aliquando scripserat. *Vtinā, Aureli, mihi subinde in Natura illo theatro, in Vulcanio foro, in agro, inquam, Puteolano, in Academjæ vestris Parthenopais, quas frequentant, Imperati, Columnæ, Schipani, Capaci, Porta, Stelliola, Campanella viris istis, quos Tulliana Musa eloqui finxit, poetici lepores fecundant, Oratorum granitas exornat, Annalium fidelitas illustrat; philosophica deniq; lima conspiciuos mundo reddidit, interasse liceret, inter quos, haud fallor, ipse, Marce, cum primis eluces. Illud autem physico Chirurgicum opus tuum fac, ut aliquādo videamus, &c.*

Ad hos Thomas Bartholinus Danus vir scribendorum insignium librorum gloria reuerentissimus; *Præclara* (inquit ad Seuerinum)

nominis tui fama excitatus curiosi ingenij
Volebomerus noster post suum à Germania
reditum, quum ex admirandis ingenij tui
monumentis doctrinam hæcenus agnorit, co-
ram intimiori cultu gestit accuratius per-
cipere.

Deniq; concludam sermonem cum perspicu-
cissimo Harueo, qui scribens ad Seuerinum
ait; Gaudeo mihi pariter, ac tibi gratulor de
literatissimo opere tuo de recondita abscessuum
natura, quod mihi dono dare pro tua benefi-
centia voluisti. perlegi anide cum incredibili
anima iucunditate, utpote cum lepore, & ve-
nustate conscriptum, nec minori meo fru-
ctu, tum propter illorum morborum plenam
conditionem, perfectamq; notitiam manife-
stam, tum multis novis observationibus, medi-
camentisq; locupletatam, & exornatam di-
sciplinam, &c. alia grandi cum æstimatione
de Seuerino prædicata.

Non persequor ultra quamplurimos inclitos
Professores, qui plenis Aurelium buccis ex-
tulerunt hic equidem interfeco multa: tu su-
stine parumper moram: ducentos postmo-
dum audies vi candoris, & distante veritate
grauissimos, & optimos quosq; viros mirum
in modum Eulogos de Seuerino, Danos,
Borussos, Anglos, Celtas, Allobrogas, Bel-
gas, Saxonas, Francos, Noricos, Italos, &c.
qui templum honorum Aurelio nostro con-
struxere:

**Chirurgia Scholaſtica duplex maior, minor.
Sophiſtica medicina detecta Satyra pediſſe-
qua Brancalconis.**

***Paraphraſes, & exegeſes, ſeu Commentaria no-
ſtra Principes in Autores.***

**In Hippocratis libros technicos ſingulos cõ-
mentaria, & in alios, pleroſq; lib. indigita-
menta.**

**In Dioſcoridæ libri primi præmiũ, & in re-
liquum de medica materia paraphraſis, &
notæ tantum non abſolutum opus.**

**Pro Galeno deſenſiones aduerſus Trallianum,
Auicennam, magnum Commentatorem.**

**In artis Galeni medicæ librum primum dia-
tribz.**

**In Haruei lib. de cordis, & ſanguinis motu ana-
lecta marginalia.**

**Scribonij largi vita, & in eiufdem compoſitio-
nes aduerſaria.**

***In Rem Chirurgicam commentaria, ex quibus
Ars Chirurgica conſtat exegematica.***

**In librum de vlceribus Hippocraticum com-
mentarius.**

**Item in librum de vulneribus capitis Hippo-
craticum commentarius.**

**Paraphraſis in præmiũ generale Celfi.
Commentarius in Quintum de re medica.**

Celfi

In eiusdem Autoris octauo libri caput 4. Paraphrasis.

De vulneribus neruorum ex Galeno.

In Auicennæ tractatum de vlceribus metaphrasis.

Item in Auicennam de vlceribus generatim.

Exoterica.

Aduersus Astrologos declamatio adscito Sexto nostra versione.

Præfationes, laudationes, testationes.

Vita Seuerini ab optimo viro Georgio Volchomero hospite suo descripta, elogijs antea de Seuerino prædicatis per Cl. quosq; viros Italos, exteros, & longinquos.

Græcismus deriuatus, quo cum comprehenditur Grammatica græca per verborum species, vt latina, digesta.

Epistolarum latinarum centuriæ paulo tribus minores.

Iuuenilia, tum carmina, tum prosæ genij gratia seruata.

Problematalogus variè contextus.

In genere logico.

De locis dialecticis ex Rhodolpho Agricola.

Rudimentum de norma repetitionis ab Auditoribus retinenda.

De Methodis doctrinarum ex Zabarella, & Ca.

**Capiuacca cum Aristotelis organi compila-
tione coniunctæ periochæ.**
**Animaduersiones in Arist. de binis methodis
synthetica, & analytica.**

Ex Physicis.

**Animaduersiones in Aristotelem de calore
natiuo.**

**De rerum ortu simpliciter, de elementis, de ge-
neratione, de mixtione, &c.**

*Oratorij, & Poetici argumenti nella volgar
fauella.*

**Declamationi contro i migliori filosofi, & ora-
tori.**

**La Galleria del Casa, cioè delle bellezze, &
degli artifici osseruati nelle rime di Monfig.
della Casa, con cui van congiunte la topica
di Giulio Camillo dal Seuerino ricompila-
ta, & vn, della comedia antica, trattato.**

La Filosofia, o vero il perche degli Scacchi.

*** La querela della (&) accorciata.**

**Et alia, quæ visa recensuerunt tum in Præfa-
tione ad opus Simonis à Campo doctissi-
mus, & disertissimus Honophrius Riccius
Professor Medicus Neapolitanus, tum
in priore Nomenclatoris æditione vir
absolutissimus Thomas Bartholinus Dani
Regis Archiatros.**

IMPRI-

IMPRIMATUR.

Gregorius Peccerillus Vic. Gen.

Io: Dominicus Gallus Dep. vidit.

*M. F. Ioseph de Rubeis Ord. Min.
Conn. S. T. D. Emin. Card. Philamar.
Theol. & Consult. S. Officij.*

IMPRIMATUR.

Zufia Regens. Caracciolus Reg.

Capyc. Larr. Reg. Garzia Regens.

Prouisum per S. E. Neap. die 22. Aprilis 1653.

Barrilis.

COROLLARIUM

APHORISMORVM

Hipp. lib. 1.



T si equidem noram nonnul-
los esse, qui negent mutuum
aphorismorum Hipp. ordinē
aut connexionem tradi cer-
tissimam posse; quod sine
hac scriptos arte putent: ego
tamen non sum diffusus ra-
tionem quampiam excogi-
tare, qua non omnino dissoluti, nec πολύσπαροι
viderentur. Et id quidem in primo libro lucu-
lenter satis cum Gal. præstitisse mihi videor.
In alijs vero libris, siquidem id mihi per vi-
res meas, aut per rei conditionem licebit per-
ficere, studium certe non deerit. Sed enim
utcumque per omne tempus res cedat; exer-
cere tamen nostrum hac in parte ingenium
non piguit. Cui autem penitus difficile, &
absurdum videbitur eo iudicio vltum Hipp.
postquam perlegerit commentariolum hunc
meum, persuasio nulla est amplius: sed veluti
si promiserim iucundissimum cibum, hic po-
stea non perplaceat, nihil tū cogam, & me
continebo.

*In hoc primo libro Aphor. agit Hipp. de duob. de
Dieta, & de purgandi ratione.*

De Dieta quidem ab Aphor. 5. vsque ad 20.
exclusiue. In ceteris vero de purgatio-
nibus, vt ait Gal. ad calcem com.
vltimi in hunc librum.

*Agam prius de methodo doctrine siue instituto
Hipp. quoad dietam, mox vero de alia
quoad purgationem.*

P Rincipio tria sunt capita quibus tota vi-
ctus ratio comprehenditur, quantitas, qua-
litas, modus, vt docet Gal. comm. 19. huius
libri. Quare facile apparet errare eos, qui pro
re vna nominant dietam, & victus rationem,
cum vtraque longe aliam significationem
obtineat.

Victus enim, & dieta sibi mutuo respon-
dent, significantes materiam, & cibos ipsos,
victus autem ratio quantitatem, qualitatem,
& modum victus, quas si breuissime comple-
cti velis, præscriptam viuendi formulam di-
xeris. Quæ dixi, cognosces apertissime ex ver-
bis græci textus in aphor. 4. huius libri.

Dieta in quantitate duplex, tenuis, &
crassa. De tenui quidem principaliori parte
diætæ agit Hipp. ab aph. 5. vsque ad 20. vt di-
ximus de crassa autem non meminit, sed in-
potentia videtur dixisse de ea, nisi tamen
dicas

dicas quod in aph. 5. de ea differit.

Quia vero dubitabatur in vtro morborum genere tenuis diætā exhibenda sit: in longis ne morbis, an vero in acutis: distinguit Hipp. in aph. 4. in morbis longis conuenire, in morbis vero acutis aliquam do conuenire, aliquando non item.

At quia potest esse comparatio, quæ nam in vniuersum sit eligibilior ne diætā, an admodum exquisita: satisfacit Hipp. huic quæstioni dicens, & in salubri, & in morbofo statu viciū exquisitum cum periculo opponi, propterea quod errores, qui committuntur tunc temporis grauius feruntur, quod quidem periculum cauere vult.

Et amplius cum morborum acutorum alij sint acuti, alij peracuti, descendit in aph. 79. ad speciem peracutorum, vt in illis diætā hanc tenuem præcipiat. Et primo peracutorum cognoscendorum tradit hoc signum, quod statim extremos habet labores, mox decernit diætā tenuissimā institui oportere.

At quia est aliqua latitudo, siue amplitudo huiusmodi tenuis diætæ præcipit in eodem aph. tantum cibi indulgendum esse, quantum morbus fuerit mollior extremis, idest vigore summo.

Quam sententiam vniuersaliorem fecit 10. aph. nec amplius ab hoc ille aphor. vt declarat ibi Gal.

A Cum vero per Galen. in comm. 12. in primum hunc librum tres sint intentiones ad perfectam, & indeficientem victus rationem prima quidem sumpta à viribus ægrotantis, secunda ex morbi constitutione, & tertia præter has particularibus accessionibus: quoad indicationem ex constitutione morbi dicit in 8. aph. Cum morbus iam in suo vigor constituterit extremè tenuissimo victu utendum est. Causam vero affert Gal. in comm. 'propter symptomatum magnitudinem, & morbi conditionem.

Quoad secundam indicationem, quæ est indicatio virium monet in 11. ut quantitatem declinationis victus ab extrema tenuitate capiendam exquisitè noscamus, quæ certè observatio recessus ab extrema tenuitate gratia virium sit, uti annotat ibi Gal.

Quoad tertiam indicationem, quia particulatim victus convenienter est offerendus, docet in 11. aph. cauendas esse accessiones.

Ad quas quidem accessiones, & constitutiones cognoscendas iubet in 12. aph. observanda esse anni tempora, & circuituum successiva incrementa, & signa, aut aliquo post tempore apparentia.

At vero, quia ætates, & tempora anni conducunt maxime ad victus rationem inveniendam propterea de primo agit ab aph. 13. usque ad 15. exclusivè. De secundo vero à 15. usque ad 16. inclusivè.

De

De temporibus vero anni insuper 18. hic tamen disputat de æstate, & autumno in prioribus vero de hyeme, & vere, quorum utrorumque hæc est comparatio, & hæc differentia, quod ibi dicit in prioribus temporibus facillime cibos ferri, in posterioribus difficile.

Et quoad ætates, quia istarum hæc sub augmento est, hæc sub consistentia, hæc sub declinatione de singulis agit, quasi per gradus ascendendo, eas inuicem comparans.

Et siquidem cognouimus quantitatem diætæ sumendam à motu morbi, vel chronici, vel acuti, vel peracuti, & ex constitutione, & ex viribus quasi præmeditatione anteuertentes minutè, & exquisitè durationem morbi, & virtutis tolerantiam, tum quoque ex ætatibus, & anni temporibus posthac, & qualitatem callere debemus.

Propterea de illa unico aph. 16. edisserit dicens victum humidum febricitantibus omnibus conferre & maxime pueris, & ijs, qui eo victu uti consueuerunt. Cuius hæc est ratio.

Pro confesso est, & ipse alibi, dixit contrarijs contraria opponi, & quanto quis à statu sanitatis recessit, tanto vehementiora adhibenda contraria esse. Quapropter, & similibus, quæ secundum naturam sunt gaudere.

Format itaque aphor. In febricitantibus victum humidum in pueris autem alioqui

humidis, & alijs humido victu assuetis humidum deberi.

Et siquidem tradidit secundò præcepta quoad qualitatem victus, subdit hæc quoque. Tertiò quoad modum offerendi in 17. aph. ita enim Gal. ait non enim sufficit hoc ipsum solum cognoscere, quod huic plus, vel minus sit offerendum, vel quod victu humectante, vel exiccante vtendum sit, sed non quid semel aut sæpius qualibet nocte, vel die cibum offerri oporteat, necessarium est considerare, & ad hæc ipsa à tempore, ab ætate à consuetudine sumere indicationes sicut in quantitate, & qualitate, & cætera, omnia quidem diuine explicat.

Aph. vero 19 quia ad modum diætæ maxime conferunt accessiones non temerè Hipp. meminit earum vltimo. Cuius aphor. hæc est analysi. In morbis obueniunt accessiones, vel ordinatim, vel inordinatim.

Obuenientes ordinatim docent tempora particularia ciborum. In horum itaque accessionibus nil dare neque cogere oportet.

Longe autem diuersus est hic aph. ab 11. nam ibi docet cibandi tempus incongruum esse in accessionibus. Hic autem dicit ante accessiones subtrahendum potius cibis, quàm addendum. Tempus autem ante accessiones cognosci ait, si illæ fiant ordinatim.

His de victus ratione iam habitis ab apho. 4. vsque ad 20. cæterum in reliquis aphor. agit Hipp.

Hipp. de purgatione, qui videlicet sunt numeri. 7. primo excluso, qui libri, & operis totius proœmium est. In quibus fere omnibus, ut non fallentem purgationis normam præscribat, à communissimis, & facilimis, ut incipio libri de officina medici propositum est, aspiciendum præcepit.

Ea sunt videlicet exemplar naturæ, quam sibi medicus imitandam, perpetuo proponere debet. Itaque natura ipsa dum inculpatè purgat, in eo probatur eiusdem opera, quod, quid, quale, quantum, quando, & qua via purgare expedit, secernit. Porro pertinent ad quid aph. 2. & 25. Ad quale aph. 20. Ad quantum aph. 3. & 23. sed ea tamen inter hæc differētia: quod in aph. 3. ratio exponitur sanitatis conservatiua, aut præservatiua: in 23. vero morbi curatiua. Ad quando aph. 24. denique qua via aphor. 2. ostendit.

Vel hac alia ratione.

Instituit Hippocrates non fallentia præcepta purgationis. Exorditur quasi sic via resolutiua.

Purgatio quædam habet essentialia; quædam accidentalialia. Essentialiale quidem est id, quod peccat in corpore expurgare (Definitio namq. Galeni est comm. 2. in hunc librum; Purgatio est humorum sua qualitate peccantium evacuatio.) Accidentalialia vero purga-

Noni sunt quantitas, tempus, & via. Hæc quidem singula secundum consuetum naturæ morem moderari nos docet Hipp. Quid scilicet in aph. 2. & 25. Quale in aph. 20. Quantum in aph. 3. & 23. atque hoc prout supra distinximus. Quando in apho. 24. Qua via, & vnde aph. 21. non aliter sane quam in superiori ratione monstratum est.

Haftenus de purgatione Hip. quæ quidem omnia arbitratu tuo ampliare, atque exornare poteris. nostrum fuit tantum hæc præmonstrasse angustia pressorum non concessi oci.



DEFLORATIO⁹

LIBRI DE FEBRIBVS

Auicennæ Can. 4.

fen. 1.

Definitio febris. Est calor extraneus accensus in corde, & procedens ab eo mediantibus sanguine, & spiritu per venas, & arterias in totum corpus, & inflammatur in eo inflammatione, quæ nocet operationibus naturalibus, non sicut caliditas iræ, & laboris, cum non vltimantur, &c.

Prima diuisio. Febris est duorum generum, febris ægritudo, & febris accidens, febris ægritudo est illa, cuius causa, est immediata, causa non est morbus. febris accidens est illa, cuius causa est morbus, & febris ipsa à morbo dependet, vt febris bubonis.

Secunda diuisio. Febris occupat omnes partes corporis humani, quæ sunt trium generum, quæ vocantur contenta, continentia, & impetum facientia. Contenta sunt humores, continentia sunt vasa, & partes solidæ, impetum facientia sunt spiritus. Itaq; iuxta triplicitatem partium, siue subiecti triplex est quoque febris, ephemera, siue diaria, quæ accenditur in spiritibus, putrida quæ accenditur in humoribus, & hætica, quæ in partibus solidis.

Ex

Exemplum primi, ut folles fabrorum, quia attrahunt aerem calidum, & calefiunt. Exempl. secundi ut lebes frigidus, qui calefit ab aqua calida. Exempl. tertij ut lebes calidus, qui calefacit aquam frigidam.

Atque hæ sunt differentia februm essentialia. Cæterum accidentales sunt hæ. Acuta vel chronica; nocturna, diurna; benigna maligna; intermittentes continua, continua, quæ intenduntur; continua, quæ remittuntur; cum rigore, vel horrore, & sine his; simplices, & compositæ, &c. hæ sunt differentia februm essentialia. Cæterum accidentales per accidens morbi.

De corporibus preparatis ad febres.

Cap. II.

Prima conclusio Corpora vehementius præparata ad febres præcipue putridas, sunt calida, & humida, & propriè cum humiditas fortior, est caliditate, &c.

Secunda conclusio, Corpora calida, & sicca sunt obnoxia febribus ephemeris, sed ephemera deinde transcunt ad putredinem, & adustionem, quandoque in hæticam.

De temporibus februm. Cap. III.

Prima conclusio, februm tempora sunt, quæ cæterorum morborum, ut principium

pium, augmentum, status, & declinatio.

1. Corollarium. Periculum, & timor in febribus est à principio, vsque ad statum: nam in declinatione non moritur æger, nisi causa communi, vtpote virium defectu, &c.

Prima definitio. principium est tempus, in quo calor naturalis præfocatur à materia submersa in morbo, donec non appareat maturationi, aut diuersitati eius contrariæ maturationi vestigium.

2. Corollarium. Principium quod de se semper est in omni ægitudine, tamen in aliquibus occultatur, vt in synocho, Epilepsia, Apoplexia.

2. Definitio, Augmentum est tempus, in quo mouetur calor naturalis ad resistendum materiæ motu manifesto, & apparent signa digestionis, aut signa contraria digestionis.

3. Definitio. Status est tempus, in quo vehemens est pugna inter naturam, & materiam, & apparet victoria alterius duorum; nã in eo completur vestigium digestionis, aut contrarij eius.

2. Conclusio, In habentibus Paroxysmos acutos spatium status est proximus motu, & non cognoscitur, nisi per comparisonem ad primum illum paroxysmum, qui sequitur, vel ad secundum, vel ad tertium.

3. Definitio, Declinatio est tempus, in quo calor naturalis dominatur materiæ, & vincit eam iam alleuiatus, & expeditus separat

bonum à malo ..

3. Conclusio . status diuersificatur in morbis . Morborum enim peracutorum status longinquior est, vsque ad 4. diem.

3. Corollarium . febres ephemerę non sunt acutę, quoniam non sufficit ad acuitatem ægritudinis, vt sit status eius proximus, sed vt, ea hoc habeant, & periculum annexum: ephemerę autem omni prorsus vocant periculo.

4. Corollarium. iuuant notitię temporum febris ad regimen bonę diætę tum in morbis acutis, tum in chronicis.

4. Conclusio . plures febres complent principium augmentum, statum in paroxysmo vno, & faciunt paroxysmum alium declinando.

5. Conclusio febres varietatē habent nonnullam in temporibus; nam quędā sunt quarum augmentum se prorogat, & quędam sunt, quorum declinatio prorogatur.

De Cognitione temporum vniuersalium, & præcipuē status. Cap. IV.

Prima Conclusio, Tempora ægritudinum vniuersalia cognoscuntur multis vijs. Primo ex specie ægritudinis simpliciter acuta, peracuta, vel acutissima. Item ex chronica.

2. Ex modo motus celeris, vel tardis.

3. Ex virium robore, vel imbecillitate.

4. Ex ætate, tēpore, regione calidis, frigidis,

5. Ex

5. Ex pulsu crebro, vel raro.

6. Ex rigore, cuius proprium est abbreviare, &c.

7. Ex parte harum paroxysmorum; namque si fuerint procedentes secundum antecessionem superfluentem: ægritudo erit in augmento. Si constiterit antecessio, & constiterint superfluitates, tunc sine dubio erit in statu. Si postponuntur in declinatione erit.

8. Ex augmento accidentium statu, & diminutione. item longitudine, & breuitate paroxysmorum.

9. Ex qualitate euacuationum, quæ fiunt sine materiæ copia, sine expulsiuæ virtutis robore:

10. Ex modo digestionis, aut cruditatis, sicut hoc & singula omnia rite hic explicat Auicēna; sufficit enim ceteroqui nobis, locum tantum ostendere memoriæ gratia.

Sequitur Notificatio temporum particularium.

PRima definitio, seu potius descriptio. Principium paroxysmi, est tempus in quo coarctantur pulsus, frigescent, ac ferè liuescent extrema corporis, pigritia, angustia, somnolentia, ædium loquendi, horror circa dorsum, & rigor adest. His additur quandoque fluxus saliuæ, Pulsatio temporum, tinnitus aurium, stertutatio, membrorumque corporis commotio.

2. Definitio. Augmentum duas habet partes, seu medietates, quarum una tempus est, in quo pulsus incipit dilatari, atque citari calor spargi secundum æqualitatem. Altera pars seu medietas est, in qua non cessat hic idem calor sparsus cum æqualitate augeri.

3. Definitio. Status est tempus quo conservatur ista caloris æqualitas, symptomata sunt in dispositione sua, & pulsus fit maior celerior ac frequentior.

4. Definitio. Declinatio duas habet partes. Prima in qua imminuuntur symptomata, pulsusque temperantur, & æquantur. Altera in qua visitur sudor, & infebrecitatio. Exemplum ibi lege de tertiana.

1. Corollarium. Tempus morti proximum; sæpè speciem habet declinationis, sed tamen, quia prudens es, & diligens investigator, veram declinationem aucto validoque pulsu existimabis, id quod in mortuis non est.

2. Corollarium. Morbus propter res causas prorogatur; ob materiam multitudinem, ob ob eiusdem crassitiem, ob eiusdem frigiditatem. Quæ, & tempus anni frigidum, regio, ætasque frigida, imbecillitas virium, & corporis densitas solet adiuvare.

De febre ephemerā, & causis eiusdem.

Cap. V.

Prima Conclusio. Causę cuiusque febris ephemerę sunt primitiue calefacientes per se, idest propria ratione, & calefacientes per accidens, & in summa sunt omnes res non naturales.

2. Conclusio. Causę febris ephemerę quandoque non sunt primitiue manifestę, sed antecedentes immanifestę, vt obstructio.

1. Corollarium. Causę primitiue plerumque mouent antecedentes, ita vt de ephemerā fiat putrida.

2. Corollarium. non gignitur præcisę ephemerā ex labore spiritus, & corporis violento, vt putarunt multi.

3. Conclusio. febres ephemerę rarò pertranseunt, diem vnũ quod si pertranseunt, suspicio, est ne conuertantur in hecticas, vel in putridas: & causa est, quia retentio caloris in spiritu pertransit ad humorem, & corpus.

3. Corollarium. sunt nonnulli, qui putant ephemeram quandoque perdurare sex diebus.

4. Conclusio. ephemerā febris, est facilis curationis, sed difficilis cognitionis, quemadmodum, & febris hectica incipiens.

5. Conclusio. corpora, naturaliter præparata ad ephemerā sunt calida, & sicca. deinde

calida humida. Tertio in quibus prædominatur caliditas. Quarto ea in quibus prædominantur siccitas.

6. Conclusio calidi, & sicci, quibus accidit fames, vigilia, labor animæ, labor corporis incurrunt facile ephemeræ cum horrore quodam, &c.

4. Corollarium, & si his citò non decurrat ephemera, statim degenerabit in putredinem, & opus est conueniente cibatione, & curatione.

De signis februm ephemerarum, & præcipue de signis ipsarum, distinctiuis. Cap. VI.

Prima febris ephemeræ significatio est, quod proprium ipsius est non produci à causis antecedentibus, & immediatis.

Secundo, quia in ea non videntur, neque observantur signa febris putridæ, iam recensita cap. 4. hoc est pulsus coartatus, rigor, & infrigidatio extremorum, quæ quandoque non nego apparere, quandoque in frigidaitionis vestigium, & similitudo: cum punctio est quædam à malichymi euaporatione generata.

Tertio, calor tactusque corporis non est mordax, sed veluti laborantis, & ebrij.

Quarto, urina in prima die concocta, nunc cum sedimento, nunc cum nebula coloris non alieni, qui color, & si non æquatur semper substantiæ: tamen bona est semper.

Quin-

Quinto . Pulsus vergit ad crebrum vehementem , & magnum , nisi tamen sit à causis debilitantibus , & transmutantibus extrinsecis, &c.

Sexto. Celerior est pulsus dilatatio, quam constrictionis, & causa nota est.

Septimo , Pulsus in declinatione peruenit ad munditiem.

Octauo , Principium accessionis est lenè , augmentum non pertransit spatium duarum horarum, status non habet accidentia vehementia , aut praua , non est seruator in eo magnus, & dolor omnis remittitur, capitis autem dolor omninò tollitur.

Nono, Infebricitatio ephemeræ perficitur cum sudore non multo, & sanitatem, ferè referente; si enim multus sit, verendum est vera sit ephamera.

Decimo, Ingressus balneum, qui ephemeram patitur, & non horrens ephamera vera laborat, horrens vero putrida laborat.

De permutatione feb. ephem. Cap. VII.

I **C**onclusio , qui ephamera laborat ab inedia, si medico non aduertente nocibetur, in hecticam incurret, si gracilis est in synocham putridam, in, non putridam si carnosus. Si incurret in hecticam, tactus arteriarum est valde calidus , tempore cibationis augetur calor, pulsus est durus, &c. si incurret

in putridam, prædicta non adfunt, & augetur calor præterquam à cibo, & facies quasi inflammata apparet.

De signis permutationis ephemeræ in alias febres.
Cap. VIII.

Conclusio. Ephemera terminatur sine sudore, aut humectatione, aut cū sudore sine pulsus mundicie, cum declinatione longa, & difficili, dolore capitis non succedente. in hecticam quidem si causæ eius, sint magnæ, & longior paroxysmus; in putridam, vero si malus sit humorum apparatus. Vtriusq; autē propria signa suo loco habebis, &c.

De curatione febris ephemeræ in vniuersali.
Cap. IX.

Cibi sint boni succi nutrientes, lenis transitus, & citæ transmutationis. Adhuc vero magis ijs, qui patiuntur febrem ephemeram ex labore, angustia, & fame; biliosis, & gracilibus largus permittuntur.

Et quibus in ephemeris horror accidit in principio: iisdem in principio conceditur cibus in aqua, aut in vino maceratus, vt magis sit penetrās. Simpliciter autem conceditur & his victus in principio.

In quibusdam ephemeris prohibetur largior hic victus, & exhibetur tenuis, & subtilis, quem-

quemadmodum, & in his, quæ sunt ab obstructione, & constipatione pororum, aut ab abscessu. In quibus cibandi tempus est declinatio. In principio autem cum virtus est valida, tuto in his permittitur potus aquæ frigidæ, qui tamen potus cum debilis est viscerum virtus, cum febris, est longior, tutum non est, nisi parcè cibare.

Conuenit quoque his dum paroxysmus consumitur balneum, quod est ad sudandum, ad humectandum, & rarefaciendum poros. Excipe hos casus. Primo in ephemeris ab obstructione, ne degenerent in putridam. Secundo in ephemeris ex repletionem, & crapula. In his non competit, nisi facta iam digestione. Tertio in ephemeris ex catarrho humido, in adusto non improbat.

Balneum est duplex humidum aereum, & humidum aqueum. In balneo aereo non diu perduret, In aqueo quantum volet.

Ad sudandum autem in aereo ij; qui constipati sunt, aut obstructi diutius possunt perdurare. omnis ephemera ab obstructione, siue interna, siue externa frequentibus oportune frictionibus curatur. euacuatione internorum humorum aliqua, febris ephemera non curatur, nisi tamen ea, quæ est ex repletionem: hæc enim, solo vomitu curatur.

*De febribus putridis tractatus secundus.**Cap. I.*

Putredo quidem varie gignitur. primo per cibos, & cibus putredinem inducit; vel quia malus est in propria substantia, qualis enim cibi nutrientis est materia, tale & nutritum erit. Vel quia, licet bonæ sit substantiæ, citæ tamen est corruptionis, & alterationis, ut lac. Aut quia est succulentus, & excrementosus, ut fructus tardi, & humidi nimis. Vel quia durus est concoctus: sic reliquiæ, quæ superant ab eius concoctione euinci calore, non possunt naturali, sed ei succedit innaturalis, ut cucumis, citrullus, pyra, & sim.

Aut quia male parata, maleq; condita sunt.

Aut, quia non tempore conuenienti non ordine conuenienti assumuntur.

Secundo inducitur putredo propter obstructionem, quæ viam claudit transpirationi fuliginum, quam iuuat etiam mala corporis constitutio. Ad concoquendum, autem facultates, in eo casu vel non concoquunt, vel corrumpunt cibum, vel abbreviatur, vel tardatur digestionis causa.

Tertio fit putredo propter malas aeris constitutiones. videlicet cum ipse est pestilens, vel palustris, vel putrescentium in aqua rerû euaporatione inquinatus.

Quarto fit putredo, vel propter copiam,
hu-

humoris, vel ob crassitiem, vel visciditatem.

Accidit ergo obstructio, vel propter dictam prohibitam transpirationem. vel propter intempestiuos motus, & balneationes à cibo, vel propter in sole morā, vel propter calefacientia supra repletionem, vel propter negligentiam, & omissionem conferentium remedium ad stomachi, & hepatis languores, atque calorem immodicum, &c.

Putredo duplex communis toti, & partis. fit parti, vel propter imbecillitatem nativi caloris eius, vel propter vehemētiam caloris externi, acuti, vel dolorifici.

Ex singulis proportionatè humoribus putrescentibus proportionati exeunt vapores. Ex bile enim vapor est subtilis, fumosus. Ex sanguine subtilis tantum, ex phlegmate spissus, ex melancholia fumosus, & purulentus.

Et sunt etiam ex putrescentibus humoribus febres. putrescens enim cholera tertianam; sāguis synochum; pituita quotidianam; melancholia quartanam facit. sanguis semper continuam, alij vero humores, & continuas, & intermittentes parere indiscriminātim possunt. Hoc pacto scilicet. Nam putrescentibus intra venas humoribus continuas sine paroxysmorum discretione, extra venas vero intermittentes cum paroxysmorum discretione.

Nisi tamen cui est apostema, à cuius proluvie, & inquinamenti perpetuo elati vapores

res putridi cor ipsum perpetuo incendunt, faciuntque continuam.

Aliud adhuc obserua. Cum biliosa febris, & melancholica ad mundiciem perueniant sapissimè, sola tamen pituitosa ad hanc non peruenit, quin vero huius reliquæ sunt occultæ.

Causa cur in putredine extra venas febris quandoque non eradicetur, est, quia antequam finiatur, & dissoluatur putredo vna, succedit putredo alia, & hoc accidit, vel ratione copiae humorum, vel ratione vicinitatis foci.

Causa cur putredo intra venas facit continuam febrem, hæc est, quia non resoluitur putredo propter continuitatem venarum, & vna pars humoris putridi transfertur continuo ad partem aliam humoris putridi.

Causa cur paroxysmi febrium intermittentium sint inordinati multiplex est. Primo propter multitudinem, aut paucitatem humorum putrescentium.

Secundo propter crassitiem, aut tenuitatem ipsorum.

Tertio propter diuersam substantiam eorum cum transmutantur de vna specie in aliam.

Quarto propter errata ægroti, vel medici in victus ratione.

Quinto propter debilitatem, aut sensibilitatem languentis.

Paroxysmi febrium intermittentium, & ve
plu.

plurimum incipiunt cum horrore, rigore, aut frigeſactione, & terminantur cum ſudore. Et aliquādo non incipiunt cū iſtis, niſi aut propter frigiditatem humoris, aut propter acutiē, & mordacitatem eiſdem, qui mordet, & vellicat lacertos, aut propter profundationem, & concentrationem caloris in locum materiæ putreſcentis, aut propter debilitatem virtutis, aut propter frigiditatem aeris ambientis hyberni. Et cum ſit, ex mordicatione caliditatis horrore potius, nuncupationem meretur, quam frigeſactionis.

Cauſa ſudoris eſt caliditas humoris putridi, qui reſoluit humiditatem, & expellit foras per poros alioquin expeditos, & apertos.

Paroxyſmi, qui non eradicantur per ſudores, incipiunt vt plurimum cum frigeſactione, & hoc quidem accidit, vel propter debilitatem virtutis, vel propter oppreſſionem caloris innati.

Componuntur febres multis modis, ſed præcipuè ſic, vt paroxyſmi fiant cōtinui per ſubingreſſionem vnius ad alterum.

Paroxyſmi febrium interdum prorogantur, interdum breuiantur. Prorogatio accidit ob multas cauſas. Primo ob multitudinem materiæ putreſcentis.

Secundo ob craſſitiem. Tertio ob viſciditatem. Quarto ob quietem, & paucam ebullitionem; Quinto ob conſtipationem pororum.

De abbreviatione vero contraria ratione
discurre

Paroxyfmi rursus & properant, & tardantur. Tardantur multas ob causas. Primo ob paucitatem materiæ. Secundo propter crassitatem, qua tarde mouentur ad mineram putredinis, vt in quartana.

Properant autem, vel ob multitudinem humoris, puta phlegmatis cuiusque præter vitreum, vel ob tenuitatem humoris, puta cholerae.

Prauitas febrium ordine sic se habent. Primo malæ sunt simpliciter continuæ putredinem habentes intra venas. Secundo intermittentes, quarum materia coniuncta est extra venas corporis. Tertio quarum putredo est proxima cordi.

De signis febrium putridarum. Cap. II.

Primum signum est, quod semper præcurrat causa antecedens, & præsertim de signis primitiua.

Secundum est constrictio pulsus, atque anhelitus velox, aucto scilicet vsu expellendi fulgines

Tertium tactus vniuersi corporis est acris, & mordax, non blandus, & suauis, vt in ephemeris.

Quartum vt plurimum antecedit almelileu, id est dispositio quædam, cui admiscetur calidus

caliditas non perueniens ad tātum gradum, ut sit febris, sed est homini neutrum quid inter febrem, & non febrem, cui associatur lassitudo, pigritia, oscitatio frequens, dolor capitis, & id genus.

Quintum est coartatio pulsus, & paruitas, cuius causa dicta est supra.

Sextum est varietas temporum: licet hoc non discernatur in tertiana.

Septimum est defectus sudoris, & humectationis in primo paroxysmo. etenim ephemera semper declinat cum sudore, aut humectatione.

Octauum est longitudo augenti, & pulsus eleuatio in ipso.

Nonum, aut incipit cum rigore, & terminatur cum sudore, cum sit intermittens; vel ea non peruenit ad hæc, sed terminatur cum tempore cum sit continua.

Decimum est syndrome multa symptomatum grauiorum, ut sitis magna, dolor capitis, nigredo linguæ, inquietitudo, & diuersitas pulsus nunc ad magnitudinem, nunc ad paruitatem, ad debilitatem, & coarctationem, &c.

De signis febris continuæ. Cap. III.

Primum febris continuæ signum est magna pulsus diuersitas à naturali, neque ordinem habentis, neque æqualitatem.

Secundum signum est, quod paroxysmus
adhuc

adhuc non cessat post clapas 24. horas.

Tertium est assiduitas, & vehementia; augmentum vero minuitur quandoque, & augetur vice alia.

De ijs, in quibus conueniunt, aut differunt febres putridæ, Cap. IV.

Proprium est febris biliosæ, siue tertianæ, vt motum habeat de tertio in tertium, siue motus fuerit principij accessionis, vt in intermittente, siue motus fuerit principij exacerbationis, vt in continuis. Aduerte tamen, quod motus febris ardentis, quæ dicitur caupon, motum habet occultum.

Est prima tertiana febris acuta idest citæ terminationis propter subtilitatem materiæ. Secundo est mordax propter vehemenciam caloris. Tertio est salubris, & tuta, quia inter vnam accessionem, & alteram spatium intercedit 36. horarum; durat enim legitima eius accessio 12. horis.

Tertiana non pura diuturnior est, quam sic pura, quæ pura raro transit spatium 7. periodorum, quamuis non pura continua, quandoque finiatur in vna septimana. Hæc de febre biliosa siue continua, siue intermittente, siue pura, siue impura.

Proprium est febris sanguinæ, quæ in synochum putridam, & non putridam diuiditur, primo quidem esse continuam, Secundo ca-

lorem habere vehementē, & non exurentem. Tertio quandoque ad statum peruenire 4. dierum termino conclusam.

Proprium est febris phlegmaticæ siue quotidianæ, singulis diebus inuadere, & longiorem esse biliosa. Primo quidem propter crassitatem. Secundo propter frigiditatem. Tertio propter multitudinem.

Præterea est periculosa, primo quia spatiū quietis habet breue, quod non excedit 6. horas, durat enim eius accessio decem, & octo horis. Secundo, quia fert secum accidentia mala, ut est sycope, tremor cordis, inappetentia, &c.

Denique quotidiana continua similis est hecticæ; nisi quod pulsum non habet perpetuo durum, ut hectica, quandoque enim habet.

Adde, quod quanto minus est pura, breuior est, nisi adsit mistio melancholicæ.

Proprium quartanæ est, ut non sit acuta, sed longa ob frigiditatem humoris, & quæ pura est, durat breuiore spatio. verum non est periculosa tum propter quietem duorum dierum, tam quia non habet symptomatum vehementiā. Siue autem sit continua, siue intermittens, terminatur per vomitum, aut per secessum, aut per sudorem, aut per urinam, per quæ omnia ardens terminatur, si addas quoque, fluxum sanguinis per nares.

Aliud notæ, quod principium prorogatur
in

in tertiana, status in febre continente, declinatio in febre ardente, status, & declinatio in quotidiana.

Secundo nota, quod rarò inuenitur quartana continua, & quotidiana intermittentes.

Tertio nota, quod febres acutæ præcipue apostemata consequentes, malè curatæ convertuntur facile in hecticam propterea victu humectante, & refrigerante sunt curandæ etiam contra alias indicationes.

*De varijs signorum generibus circa febrem.
Cap. V.*

Multorum, quæ sunt in febribus, notitiæ nobis tradunt victus ratio, quæ præcessit, regio, ætas, temperatura pulsus, vrina, vomitus, egestio, fluxus sanguinis narium, rigor, & sudor, caloris acrimonia, paroxysmus, appetentia, sitis, respiratio, dolor capitis, vigilia, deliquium, inquietudo, &c. quæ possunt omnia reduci ad naturalia, non naturalia, & præter naturam.

Sed propria febrium accidentia, ex quibus certior earum est significatio, rite sunt quantitas, & qualitas febris, vt in textu.

Verum accidentia, quæ aliquas febrium differentias ostendunt, rite sunt punctio, horror, & mordicatio in principio tertianæ.

Sicut accidentia, quæ significant malitiam earum, sunt inquietudo, delirium, vigilia, &c.

Et

Et quæ significant cōditionem, sunt dispositiones vrinæ.

Adhuc habitus, & faciei aspectus humorū dispositiones ostendunt. Albus enim color, & subuiridis ad plumbum inclinans, frigiditatem humoris, paruitatemque caloris inæti significant.

Et facies velut excitati à somno significat repletionem magnam humorum, à quibus proinde multi eleuantur vapores.

Sed & subita faciei extenuatio, & narium squalor, caloris vehementiam, & resolutionē celerrimam propter pororum amplitudinem & motum in se ipsis, & desuetudinē arguunt.

Coadiuuantia ad cognoscendam speciem, genusq. febris sunt hæc.

Primum dispositio in febris acuitate, aut lenitate sua.

Secundum est, cum accidit à causis primitiuis, vel antecedentibus, & cum non accidit.

Tertium est adhzrentia cum finali tepore, vel sine tepore, si est continua: & eradicatione, si est intermittens.

Quartum est inuasio eius cum rigore, frigesactione, vel horripilatione, aut sine istis.

Quinta est declinatio eius, cum sudore paucō, aut multo.

Sexta est vita antea acta. Septima ætas. Octauo habitus. Nono tempus. Decimo ars, Vndecimo pulsus. Duodecimo vrina, vt hæc

30 *Deflorat. lib. de febr. Auic.*
capitulatim diſſeremus in tractatu particulari de febribus.

De rigore, frigeſactione & horrore.
Cap. VI.

Horror eſt diſpoſitio quædam ex frigore, & punſtione in cute, & muſculis facta, quam præcedit pigritia, & membrorum fraſtio.

Rigor eſt vehemens membrorum concuſſio, ac tremor in motibus, vt contra ipſum non poſſit homo ſe continere.

Et vehementiæ quidem eius cauſa prima eſt vehementia à virtutis expulſiue in muſculis, & viſcoſitas materiæ in ipſis contentæ.

Altera cauſa eſt humor frigidus præexiſtens in corpore, quatenus iam mouetur, & ſpargitur, quantitate multa, vel pauca à calore illum ſeparante, aut cauſa alia.

Talis autem humor ſic motus, ac ſparſus cum ad eſt phlegma vitreũ, nõ producit quædoque febrem, ſed mouetur ſtatis temporibus periodicè.

Tertia cauſa eſt ſubmerſio caloris propter cibum, & ſimilia.

Cauſa autem, cur rigor, & frigeſactio præcedant febrẽ, hæc eſt; quia humor crudus eſfunditur ad muſculos in primis, quorum ſenſus moleſtus eſt, & deinde tum primum ceſſat

fat, cum incipit putrefieri. Vel dic, quod præcedentiæ rigoris causa est humoris mordicatio præcipue falsi, nec non fortitudo expulsiuæ musculorum, &c. Vel dic, quod humoris mordicatio causa est, ut fugiat calor innatus intrò, & frigus dominetur:

Quarta rigoris causa est, quod confugit quidem calor ad interiora, ut ante dictum est, sed per internam collectionem apostematis: eo magis, quod in omni vigore sanguis intro confluit.

Sequuntur significationes aliquot per rigorem, & horrorem, &c.

Rigor atque horror quandoque in febribus continuus est salubris; nam indicatur materias in venis contentas virtute dominante extra pelli.

Verum tamen hæc requiruntur conditiones, ut nihil desit.

Prima, ut apparuerit in humoribus concoctio.

Secunda, rigor hic fiat in die critica.

Tertia sequatur conferentia, & tolerantia. Et hæc non accidunt, nisi virtute dominante. alioquin censendum est, hoc accidere propter solam humoris multitudinem, quod non vacat periculo. Et si rigorem sequitur casus virtutis, & prostratio caloris innati cum marasmo, mors prope est.

Horror est a debilioribus causis, quam rigor.

Com-

Commotio animæ , & periodi significant periodum.

Causa diuturnitatis febris quandoque est obstruatio viscerum, quare inquiratur, de hac.

Febris cum apparenre allevatione tunc cum lingua aret, & nigra est , sepulta iudicatur.

Complicata cum paralyfi febris hæc prius est curanda, deinde simul paralyfis. &c.

Abrasio capitis, non permittitur in febribus, eò quod cutis densatione vapores comprimuntur, quorum compressione febris augetur.

De scopis curandarum febrium putridarum in uniuersum. Cap. VII.

IN curatione febriū putridarū duplex Medico offertur indicatio, vna, quæ habetur ratione febris, quare necesse refrigerare, atq; humectare; Altera, quæ habetur ratione materiæ; quamobrem necesse est illam, vel digerere, vel euacuare.

Et digestio quidem materiæ crassæ est attenuatio, tenuis est incrassatio. Et comparando iam scopum curandæ febris, & digerendæ materiæ, aliquid ipsi contrarij sunt quantum ad executionem; etenim digestium, atque euacuatium omne calidum est, ut plurimum.

Ea igitur in ambiguitate sic statue. Occur-

ren-

rendū, ac satisfaciendū ei, quod magis est periculofum.

Iam vero febris est adeo vehemens quandoque; & acuta, vt prætermiffa digeftione neceffe fit illam oppugnare refrigerantibus maximis tunc in primis, cum virtus potens non est tolerare vacuationem. quod fi fuerit potens, confidenter tunc expelle humorem; neque ita refrigeres, vt prohibeas concoctionem.

Alterū igitur duor. vel virtus debilis est vigēte causa, vel viget virtus fimul, & causa. fi primum, alterandum est, & nutriendum ad vſque reparationem virtutis; qua iam repara tā; tunc ſcilicet est redeundū ad cauſam. Si ſecundum, vacuandum, & cibo parcendum.

Infrigidantia autem celebratis purgationibus, & euacuationibus ſtyptica ſint, & auſtera, vt ſunt Trochiſci berb. ſecus verò ante purgationem: quo tempore ſola conueniunt infrigidantia.

Porro ex dictis vides diuerſam eſſe curationem febris putridæ à curatione hæcticæ: quandoquidem hæcticæ curatio eſt alteratio tantum; putridæ vero eſt alteratio fimul, & euacuatio cauſæ.

Sed & alia differentia eſt. namque quod in putrida conuenit ſiue ægritudinis indicatione, ſiue cibationis neceſſitate, ex parte prodeſt virtuti, & ex parte nocet: prodeſt quidem, quia humores aggregando adiuvat, &

confert in hostem eius, qui est morbus.

Vnum autem velim scias, haud quaquam posse febrem curari, nisi ea probe noscatur. quare hanc cum non cognoueris, victus rationem cautius extenua; meminerisque tempore paroxysmi nihil mouere, neque alterare nisi ventre iam vacuo.

Alijs vero temporibus, vt recte euacues, ex pende dispositionem virtutis: & si plethoram inueneris sanguinis, vel aliorum humorum cum sanguine; cuius signum est vrina rubra crassa, non citrina, ignea: tunc venę sectionē prouidens administra, deinde lenita aluo, mānam exhibe in aqua hordei, aut aquam hordei, cum syr. acetoso. At si natura obediens euacuationi non fuerit, miscens cum eadem manna violaceum syr. sic vitium corriges.

Omnino autem pharmacum exhibenti tibi terminum tuto præfiges lenitionem simplicem ventris, non laboriosam solutionem: Vt propterea, quod ego facio, præstabilius sit aluum ducere crebris clysteribus acrioribus vel mitioribus, prout virtuti conuenit.

Et de mitibus quidem, communibus est clyster paratus ex oleo viol. succo sol. betę, vitello oui, & zaccharo rubro, & baurach. nitro.

Et si videns humorem repere ad ventriculum, nihil tardans vacuabis illum vomitorijs, quę magis agro sunt ex usu, vel ijs etiam consuetis, vt est oxyzaccharum cum aqua calida.

Et

Et si repit ad intestina, cuius signum est rugitus, & gurgulatio; tunc adhibe soluentia ventrem.

Cæterum si de somno quæras quid sentiam, cum ægro accidit: Respondeo alio tempore nocere, alio tempore conducere. Nocet quidem in principio accessionis, complicato præcipuè frigore, rigore, aut horrore, qui solent sæpe malum prorogare: namq; exprimunt materias eo tempore tendentes ad viscera, prohibentque coctionem humoris.

Iuuat vero perspicuè in declinatione, & fortasse non nocet in statu.

At de aquæ vsu quid dicendum? Respondeo concedendam alacriter, nisi vetet humoris cruditas aut crassities iam iam concoquenda, & nisi vetet frigiditas, aut debilitas viscerum, aut apostema, aut exangue temperamentum, aut contraria consuetudo, &c. Contra vero cum materia concocta est, corpus est carnosum, & calor innatus præualer, virtus est fortis, viscera sunt sana, & non frigida, neque non sunt assueta: aqua tunc nil melius, quæ concoquit choleram.

Si cum venæ sectio iuuare potest, alia tu curatione vteris, scias ægrotantem exonerandum non fore à superfluitatibus, quæ opprimunt.

Adhuc vero iuuat aqua naturam ad expellendum, vel per secessum, vel per vomitum, vel per urinam, vel per sudorem diuifim, aut

per has simul omnes vias coniunctim.

Et quantitas sane aquæ præbendæ est donec potans palleſcat, & rigeſcat, quæ fortaffe aſcenderit ad heminam vnâ, & dimidiam. Hinc alterum duorum fiet, vel enim ex febre vehementi fiet quotidiana remiſſa, vel confortata, & firmata natura quodcunque humorum eſt, vel multo ſudore, vel copioſa vrina, vel ſubductione ventris euacuabit, ac redibit ſanitas.

Quamquam autem nonnulla ſunt, quæ cōtraindicando prohibere aquam poſſunt: adhuc tamen commendatur ipſa, quod arefactis, ac maciei periculo, ex calore, ſiccitateque nimia impendenti reſiſtit. quare tunc aquam ne ſubtrahito: etenim abſceſſus, & cruditas, quæ liberaliorem frigidæ potum comitari poſſent, minora ſunt mala, quàm tabes, & extenuatio.

Abſtinebis autem ab aqua illum præcipuè, qui ſanus ab ea damnum reportare ſolitus ſit. De februm alteratione artiſcioſa huc uſque ſit dictum.

De digeſtione nunc, & euacuatione altero curationis capite pergamus dicere per quosdam velut aphoriſmos.

Porro ſcopus digeſtionis eſt matèriæ ſubſtantiam æquare ſic, vt ad expulſionem parata facile ſit. ſic tenue incræſſatur contra craſſam attenuatur, viſcidum vero quod eſt, inciditur.

Indigestam sane materiam in calido, frigidoque corpore vacuare, cogente nisi necessitate, non debes.

Fortasse enim aceruabitur humoris euacuatio: & fortasse nocet euacuatio concoctioni: & fortasse boni cum malo fiet admistio.

Per vrinam, ergo mouere, antequam humoris in ea concoctio apparuerit, importunum est, & difficile duas ob causas.

Cum materia plurima est, & mobilis de loco ad locum sic, vt moræ spatium ad concoctionem non detur; necessaria porro tunc eius est euacuatio. damna enim ex hac minora sunt, quam ex motu eius in parte Principis esse possunt.

Venæ sectio ad sanguinē absolute vacuandum cum sumitur: concoctionem eam non expectat, quam purgatio exigit: eadem enim non queritur, præter quam humoribus alijs exuperantibus.

Venæ sectio singulariter quandoque incipienti morbo conuenit: hoc autem elapso tempore non ita: & nocitura est alioquin, etiam cum hominis interitu, postquam viriū imbecillitas venit.

Humoris victoriam cum forte reformidas vacuatione, tunc vti satius est.

Si concoctus humor non est, hunc ne moueas quidem, nisi in principio, in statu plane ne moueas donec natura vincat, & concoquat: quod si mouet ipsa, aut mouit, tunc di-

mitte eam in operatione sua, & si non mouet ipsa, moue tu hora motus eius.

Huc facit illud D. Hippoc. 2. lib. Aph. 22. Concocta medicari oportet, atque mouere, non cruda, neque in principijs, modo non turgant: plurimum vero non turgent.

Euacuationem cum moliris, horam elige laboranti quietiorem, cumque intermiserit febris, aut cum eiusdem æstus sit remissior.

Per aluum ne duxeris, neque sanguinem e vena subtraxeris die paroxysmi. nimirum illud Hippoc. mente habens esse medicum naturæ tutorem, non perturbatorem.

Plerumque accidit, vt dandum sit pharmacum forte debile: forte quod soluat viscosum humorem; debile, quo deiciat ex eo non supra quam semel, aut bis.

Plurimum, ac simul totum euacuare cauet, ne virtus concidat, in cuius salute fit; atq; absoluitur omnis curatio.

Sanguinis missio meo consilio quantum fieri potest, vitetur. Si necessaria sit demum, melior est multiplicatio numeri, quam acervatio quantitatis.

Cum capitis dolor, febrisque coniunguntur, febrī debetur prior curatio: verum tamen tanti etiam momenti est dolor, vt inclinantem iam febrem ad augmentum reuocet. quo fit, vt hunc protinus sedare necessarium sit.

Laetens puer vbi febricitet, conuerte te,
sta.

statim ad rectificandum lac matris eius.

Vrina cum in febre apparuerit icterica, phlegmonem arguit internam.

De propria febricitantium cibatione.

Cap. VIII.

Febribus qui proprie conuenit, victus est humidus, maxime autem in ijs, quorum temperatura est humida, vt infantes pueri, & obæ si viri. Id quod fit tum, vt contraria contrarijs oppugnentur, vt similia similibus conseruentur.

Dum feces alui redditæ non fuerint, siccos natura non cibato.

Cibandi tempus in febribus est inclinante iam paroxysmo, vel ipso iam excusso: quod si is inciderit in horam hominis consuetam, dum sanus viuebat, optimum, hoc existima.

Ordo ciborum est à leuissimis, ac tenuissimis ad duriores, & crassiores donec ventum fit ad durissimos, & crassissimos.

Pisana febricitantibus cibus est omnium facile primus, & optimus: alimentum apponit, & glutinat, facile concoquitur, aluum lenit, & ciet, detergit, humectat, sitim sedat, & nulla parte incommodus, neque flatulentus.

Vt victum tenues, & quomodo, id te docebit status, & natura materiei, facultas item, naturæ hominis ad concoquendum, resol-

hendum, vacuandumque superfluum.

Primas ad vi&us tenuitatem morbi vigor habet, hoc enim tempore vehementius occupatur natura contra morbum pervincendum: quamobrem illi nouum circa cibos addere importunum, & intolerabile est.

Vi&um vt plene conferas, incrass&que virtus indicabit; tempus autem ad faciendū opportunum est id, quū natura non occupatur morbo depellendo, initium puta totius ægrotationis: ab eo gradatim tenuando.

Æstate parum, & sæpè cibare; hyeme multum, & rarius implere ægros oportet ad substantiæ, quæ sit utilis, resolutionem modum istorum referendo.

Omninò autem debilioribus præstat cibos offerre crebriores, & pauciores, quàm multos & semel.

Si virtus quidem non contraindicaret, tenuissimus exquisite vi&us omnium maxime probaretur. Sed ne deficiat, & succumbat natura dum morbū est expugnatura, propterea vi&u fouetur.

Sic dum virtutis casum vereris, subinde cibare festina.

Cibo abstinere non potest facile, tum cuius calor natiuus est valde multus, & validissimus; tum cuius est valde paucus, & imbecillimus. Quapropter famem senes, & pueri tolerare non possunt.

*De curatione febrium acutarum.**Cap. IX.*

Ouia quidem, & non contemnenda in curandis acutis febribus est observatio, ut assidue sorbillet æger, quod guttur humectum faciat, & conseruet.

Est aer, qui febricitanti perspiratur, frondibus nouellis arborum frigidarum, & irrotationibus alterandus.

Ex aceto lactuca vorata ad refrigerandum, & soporandum suprema est.

Capitis embrochæ ex perfrigerantibus, & humectantibus medicamentis, aptissima ad hoc genus febrium præsidia videntur.

Optimum commodissimaque embrocharum occasio est in acutis febribus, humorum affluxus biliosi. cognoscitur autem is ex affectibus vigiliarum, & exiccatione narium, partiumque superiorum.

Refrigerationem externè inducens præcipuè vehementer, caue, ne id perficias horæ sudoris, aut resolutionis: sic quippe prorogares facile morbum; quod malum est.

Licet quandoque tutior sit morbi longinquitas, quam acuties.

De febris biliosis. Cap. X.

Febbris biliosæ tres sunt species. Tertianæ continua, Tertianæ periodica, & causon. Tertianæ periodica adhuc duplex, pura scilicet, & non pura. Tertianæ non pura fit ex cōmissione, & vnitate bilis cum pituita. Sic differt ab hemitritico, quandoquidem hanc constituunt duæ materiæ separatæ, illam vero materia vna. præterquam quod in hemitritico sunt duo paroxysmi; in tertiana vero nõ pura paroxysmus est vnus.

Tertianæ quidem non pura adeò quandoque protrahitur, vt ad semestre perduret, affertaque corporis languorem, ac tumorem magnum lienis.

Causon quidem est de genere continuæ, quia differentia inter eius vehementiam, & eius teporem est fere insensibilis: accidentia verò eius sunt vehementia.

Causonis causa est, acuitas humoris, & multitudo in membris cordi proximis.

In tertiana vero periodica humor putrescens occupat carnem, & cutem: in continua vero tertiana idem putrescit in venis viscerum, quæ tamen à corde sunt distitæ.

De Tertiana absolute.

Paroxysmus Tertianæ incipit cum horrore, & punitione quasi ex acu.

Deinde producit rigorem reliquis omnibus grauiorem, licet eius vehementia cito sedetur.

Est rigor in Tertiana primis diebus vehementior, in postremis vero remissior: contrarium in quartana.

Tertiana cum recedit, sudores profert ampliores.

Tertianæ calor quò tangitur diutius, eò leuior percipitur.

Causonis contra quanto productior est tæsus, tanto acrior perferitur.

De Dignotione differentie Tertianæ puræ à non puræ. Cap. XI.

Pura Tertiana tenuitatem, & leuitatem præfert: producitque paroxysmus eiusdem ad 4. minimum horas, ad summum vero 12 quem terminum si excedit multum, putam non æstima. consuetus autem, ac frequentior eius cursus 7. est horarum.

Excalfit corpus per eam celeriter: obseruareque licet calorem eius in extremas partes procedere, quæ primum quidem sunt frigida.

Pura

Pura Tertianā, nisi aliquod per ægrotum, aut medicum committatur erratum, septem, non excedit periodos: soluitur autem quandoque propter materiæ tenuitatem paroxysmo vno, si vomitus hunc comitetur; aut fluxus alui criticus.

Apparet hac urinae concoctio tertia die, quarta, septima.

Rigor in principio, sudor copiosus in statu certa sunt signa puræ tertianæ.

Cum in non pura grauitas capitis magna fatigat hominem, prorogaturque insignitè rigor, producet quidem ipsa rationabili coniectura ad horam 23. aut 30. tepescet autem dum peruenerit ad 48.

Dat Tertianā non pura admodum lente concoctionem.

De Tertianæ continue dignotione, & curatione.
Cap. XII.

D Ignoscitur (ut dicam breui) continua Tertianā tum per vehementiam paroxysmorum in se ipsis, tum etiam per vehementiam symptomatum facta ad periodicam collocatione.

Ad eius quidem curationem in principio vel solutiuis vtere lenibus, ut thamarindis, manna calabra, &c.

Vel omnino abstinere non caret enim periculo, quamquam certe minori, quam in alijs febribus biliosis.

San-

Sanguinis emissionem si quando in hac moliris intra septimum periodum, simili consilio perface, ac si foret materia furiosa.

Plurimum in principio refrigerare non debes, nisi suspicio sit internæ inflammationis, aut timor etiam ne degeneret in causonē, aut continuam.

Intermissionem puræ cum forte non obseruas perspicuam, maturè tunc arripe soluendæ ventris occasionem.

A febris remissione deinceps asserre limphatum vinum ne dubites. Effractum enim ea commistione, & aluum ciet, & aquæ factum, vehiculum, refrigerandi, atque humectandi vehementius est occasio.

De Tertianæ non puræ curatione.

Variat non puræ Tertianæ curatio à puræ curatione ratione causarum. cū nō pura enim adiunctus est humor frigidus, nēpe pituita, quam oportet seorsum attendere.

Proinde non quotidie, sed alternis diebus nutriendus est æger, oibique sint, qui detergeant, & calefaciant modicè.

Puræ ad non puram affinitatem, & disparitatem oportet expendere, quicumque volet curationem v. triusque rectè perficere, distinguens discriminum momenta.

Vrinę cum apparent crassiores, sanguinem minuere tunc licet.

Febricitantes nō puta tertiana nihil æquē iunat, quam vomitus à cibo factus.

Clysterum vñs in principio magis approbo, quā solutiva omnia.

Absynthij decoctio in his affectibus valde conducibilis est: ventriculum enim roborat, & materias tenuat, digeritque.

De causonis curatione. Cap. XIV.

Est causon duplex: alter, qui ex simplici bile: alter qui fit ex bile, & pituita sic cōiunctis, vt fiat salsa pituita.

Vehementiora symptomata cum perpetuo causonem sequantur, quam tertiana; adhuc hæc acutior, breuiorque, quam illa.

Senes causone non afficiantur, nisi per raxō, cum autem in hanc incurrerint, facile ab eadem interimuntur. contra difficilius inde periclitantur infantes, resistētes scilicet summa eorum humiditate, atque obtundente putribilem calorem.

Soluitur causon plurimum vomitu spontaneo, vel alui fluxu, vel sudore, vel hæmorrhagia.

Sitiunt quidem dirē causone laborantes; proxime exhalāte circa pulmonē arida bile.

Calor causonis maior est visceribus; quā in habitu corporis. hinc minor est in hac artuum contractio, quā in febribus alijs.

Est causonis curandi ratio non alia, quam

puræ tertianæ , neque aliud intercedit , nisi quod maioris minorisq; ratione poscit enim causon sua natura, quæ calidior est, maiorem refrigerationem.

Propterea ad satietatem vsque potum offerre aquæ gelidæ licet . Quod si mentis alienatione febricitans , cuius alioqui lingua areret , & corpus iactatur ; affundere in guttur oportet, quatenus illâ hauriat , & demittat.

De febre sanguinea. Cap. XV.

Est & sanguine febris , dum calefit scilicet is, & ebullit: plurimum autem fit ipsa ex obstructione exhalationem præfocante caliditate.

Insuper inducitur ab alijs causis vehementioribus, quæ & ephemeris attribuuntur.

Sunt sanguinæ febris tres species; *Homotonos, Agmaistica, Paragmaistica.*

Scopus in hac curanda febre est sanguineis euacuatio plurima , & vsque ad Sycopem , si robustum nactus es corpus .

Verum tamen à sanguinis missione per hæc abstinebis. Cum crisis expectatur, cum instat concoctio, cum repletio nauseatiua hominem premit.

Accidit interdum , ut subducta sanguinis sarcina, vel fluxus ventris insequatur cholericus, vel item sudor; quem quidem extergere

continenter oportet, donec, sponte siccetur: fortassis autem per hunc æger restituetur.

De Febre pituitosa. Cap. XVI.

Febbris pnegmaticæ principium plurimum est XVIII. dierum.

Recessus autem ipsius intra XLIII. dies quibusdam intra LXIII. alijs finitur.

Iustissima sui generis est illa, quæ venit ad infebrecitationem, & quæ sudore copioso finitur; ex quibus arguitur & humoris tenuitas, & paucitas: item raritas corporis, & sim.

Proprium est pituitosæ febris os ventriculi male habere, cuius ratione fit syncope.

Febre sub ista ab humore orta vitreo, fit frigus, ab eo, quod non putruit, horror; ab eo quod iam putruit: maior autem est vis frigoris in periodis, qui sunt circa statum.

Eam, quæ ex pituita fit salsa, sequitur subinde horror; frigus verò non est in ea vehemens.

Tactus huiusce febris non est æqualis, sed varius hic atque illic, quemamodum viscosus, quod feruifaccta parte hac erumpit ampullas, parte vero alia non item.

Relinquunt post se febres istæ magnas viscerum obstructions, & si sudorem proferunt, hoc non exuberant. Porro signum, & passio ipsarum perpetua est, aut carentia; aut paucitas sudoris.

Deest

Deest his febribus sitis, nisi cum ab humore falso profecta fuerint.

Est in hoc genere febrium intermissio sex horarum; & ad infebricitationem non ducit prohibens id materia præ sui copia, crassitudine, viscositate.

De Febre Epiala, & Lipiria. Cap. XVII.

Febrium istarum commune est, ut tū calorem, tū frigus diuersis in partibus corporis obtineant; internè nimirum, & externè; prout occupata diuersa fuerint loca, diuersusque putrescat humor.

Epiala febris est ex phlegmate vitreo, quod sub interiora reconditū infrigidat eadē; rursus autem parte aliqua putrescens in exterioribus, eadem calefacit.

Lipiria verò febris est, quæ facit internè calorem, externè vero frigus. est autem quandoque à phlegmate, quandoque à cholera valde crassa.

De Febris pituitosæ curatione. Cap. XVIII.

Conueniunt cuique speciei phlegmaticæ inter initia ventris lenificatio, vomitio; vi&us attenuatio, materiarum incisio, diuretica.

Exacto febris triduo attenuare materiam incipias, ante quod tempus rite non mouebis

D

quic.

quicquam, & periculosum id cauebis.

Famem perferre, & super eam indormire, item super exerceri, res sunt omnes, quæ plurimum omnium conducunt.

Septima die iam elapsa attenuare victum, non debes: etenim & virtuti incommodat, & ori ventriculi dixta.

Alui lenis solutio in principiis iteranda, non est: præcipue cum humor peccat chole- ricus: corruptium enim est id temperamen- ti totius.

Vomitum tametsi ventriculi os debilitat, ad tollendum tamen affectum singulare præ- sidium est, & inter omnia primum.

Porro peropportunos est vomitus à septi- ma deinceps. Ab hoc enim tempore pericu- lum non est, ut ori ventriculi facessat nego- tium, & nimio eiusdem labore inflammatio- nem inducat.

Per initia necessarium huic feбри non est vnguētis vti resolutiuis, aut embrochis atte- nuantim rerum: etenim ipsa mollificāt visce- ra tepore suo humido.

Frictiones huic valde conducibiles putā; & quò crassior, viscosiorque fuerit humor, eo ampliores istæ conueniunt.

Inter particularia paroxysmi tempora fiat quidem vomitus in principio eiusdem: tunc enim factus resistit rigori, & frigori: adhuc si opus sit, siti occurrit æstuosa. Fiat autē vom- iteriū ipsum ex aqua fontis, in qua incoctum
suc-

fuerit raphanum , calida .

Vinum tenue in hac vtrique febre non prohibetur: quin & probatur etiam , tum quod calori confert innato , tum quod sudorem , prouocat.

Agaricus ex melle assumptus dr. i. vel etiam amplius, & tertia vnius parte diebus continuis plufculis febrem prorogari prohibebit.

Seminis vrticæ puluis ex melle assumptus à coctione mirabile ad febrem hanc destruendam auxilium perhibetur.

De Febre Quartana periodica. Cap. XIX.

Succedit plurimum Quartana febribus alijs putridis, quibus inerat eterogenea, materies humorum.

Insequitur præterea tumores lienis præter naturam. Denique & à causis alijs non naturalibus proficiscitur.

Porro ex his tutissima est, quæ à tumore viscerum non dependet. enimvero ad hydropem interdum, & interitum perducit.

Liberat quartana simplex ab Epilepsia, à Melancholia, & à spasmo.

Quartana, nisi erratum aliquod in vita, vel in medicatione committatur, annum vnum non excedit. Visa autem est, & quæ ad duodecimum vsque annum perdurarit.

Æstiuæ quartanæ breues, autûnales vero longæ D. inquit Hippocr.

Præcedit quartanæ calorem horror, & frigus cum dolore quodam ossium quasi contractiuo. strident tunc ægri dentibus; vsque adeo debilitatem incurrerunt.

Fit in quartanæ remissione sudor plurimus si ad phlegmaticam referatur. sitis autem in ea non est, nisi sit à melancholia adusta.

Quartanario cibus paroxysmi die, vel nullus, vel paucior esto. Quo etiam tempore, & ante cibum, & à cibo, denique præterquam in principio, & cruda existente materia, vomitus perpetuo laudatur, maxime verò si cum melancholico succo phlegma computrescit.

Si vero cum melancholia putrescente sanguinis item portio coniungatur; sanguinem quidem mittere tunc ne differas. Curabitur quippe sic facillime genus hoc quartanæ.

Est turbith, quàm agaricus in hac febre subducenda, præstantius.

Ante concoctionem humoris ne quid per os exhibeto: non theriacam, inquam, neque solutium: secus enim. vel quartanam duplaues, vel morbos alios aceruaueris, media præsertim hyeme.

De victu in Quartana. Cap. XX.

A Primis hebdomadis ad vsque tertiam tenuandus est quartanarijs victus, dummodo cum hoc perdurare possit virtus.

Cæterum conditiones quatuor inesse cibis debent.

Prima, vt non crudi sint, sed cruditatem præsecent etiam.

Secunda, vt non crassi, sed crassam materiam attenuantes.

Tertia, vt non adstringentes, sed aperientes, & ventrem acuentes id est aromatici.

Quarta, vt sanguinem gignant laudabilem.

De curatione Quartanæ continuæ. Cap. XXI

Est in Quartanæ genere sanguinis missio necessaria: quandoquidem est peccans humor in venis diffusus; habitu vero corporis externo minima portione diductus.

De Hæctica febre. Cap. XXII.

Sunt membris vniuersis humiditates diuersarum formarum: quarum aliæ continentur in venis, aliæ per partes singulas sunt diffusæ, vt ros, &c.

Humores porrò, qui in vasis reconduntur, dum peccant aliqua ratione materiam præ-

stant febribus putridis : qui vero extra vasa consistunt, materia sunt febrium putridarum.

Sunt autem modo dicti humores trium formarum.

Primus innominatus, qui à vasis quidem excidit, partes similes proxime nutriturus.

Secundus humor alimentaris, & insitus, qui dicitur græcè *ἐμψυτος* Gal. ros Auicennæ, quod roris modo per substantiam partium similarium confusus conspicitur, iamq; adiungitur ipsis, & apponitur.

Tertius carniformis dicitur: siquidem nihil aliud est, quam carnis, adipisq; substantia concretus, nimirum & perfecte assimilatus. Hic pro varia sui acceptione modo gluten, quod agglutinetur, modo cambium, quod cambiatur & immutetur, appellari consuevit.

Assimilatur primus oleo in lucernam effusum.

Secundus assimilatur oleo in ipsa ellychnij conchula comprehenso.

Tertius humor est, cui continuantur partes quotidie, de quo factum est ellychnium.

Porro ex tribus his exiccatis, & absumptis, triplex item gignitur hætica. Prima difficilis cognitionis, difficilisque curationis. Secunda facilis quidem cognitionis, sed omnino difficillime curationis. Tertia facilis item cognitionis, sed omnino impossibilis curationis.

Calor hepatis immodicus, & omnino qui-
cun-

cunque alius calor viscerum nimius causa est
hectica.

Quæ vel absorbit humores primi generis,
sicut cum consumitur oleum in lucerna, &
fit prima species hectica: Vel finit humidita-
tem secundi generis, sicut cum flamma ab-
sumit oleum apprehensum corpore ellychnij;
& fit secunda species hectica.

Est quidem hectica ex eo febrium genere,
quæ paroxysmis, & ipsorum spatijs non con-
notantur.

Sequitur interdum hectica diariam, inter-
dum etiam febres putridas, & abscessus. Ne-
que facile fieri posse videtur, vt gignatur he-
ctica per se ipsam.

Est calor hectica febris omnino æqualis
tum secundum membra corporis, tum secun-
dum tempora.

Verum tamen ingestis cibis augetur, & ce-
leriter tum ipse, tum pulsus: non aliter, quam
cum augetur flamma affusione olei in ligno
ignito.

Qui hectica correptus est, neque dolet, ne-
que calorem percipit extraneum, siquidem
inducta est crasis membro consentiens.

Lac asininū cū contrarijs sit aduersus hanc
febrem qualitatibus, expugnat optime illam:
Verum advertere oportet, ne cum eadem
coniuncta sit putrida: proximum huic est ca-
prinum; sed omnium optimum est mulie-
bre.

Balneum aquæ dulcis tepentis , in quo incoctæ fuerint herbæ refrigerantes , atque humectantes, à cibo sumptum in labro ligneo congruentissimum hanc febrî remedium est & optimum .

De febre pestilentiali.

Cap.XXIII.

Pestilentialium febrium causa prima , & proxima est, inspiratio aeris praua qualitates affecti.

Talis autem is fit per admisionem vaporum malorum , qui vel eleuantur à terris, vel è longinquo deferuntur à ventis ex fetidis, & cadauerosis locis.

Aer igitur in hunc modum alteratus , & coinquinatus per vias pulmonis peruenit ad cor . Ibi corrumpit temperiem spiritus nativam, quæ deinde putrescit , & acquirit calorem putredinalem, quo diffuso in vniuersum corpus fit febris, & illa quidem pestilentialis.

Hæc subinde populo, atque ijs, qui sunt ad illam apprehendendam expositi , communicatur.

Exposita verò sunt ea corpora , quæ malis scatent humoribus . Ea vero, quæ munda sunt, fortasse non afficiuntur à labe ista .

Febris hæc externe placida, internè turbulenta se declarat.

Huius quidem est conspicua caliditas , & in-

inflammatio vehemens, difficilis respiratio, fitis immodica, & linguæ ariditas Comitatur hanc quandoque nausea, & inappetentia, nisi si ratione aliqua præuertatur, mortis-
ra futura.

Præter hæc sunt alia in vrinis, egestionibus & sudoribus signa mala.

Accidit interdum, ut in his febribus neque ægrotus, neque Medicus calorem externè magnum percipiat: præterea non admodum à naturali variant pulsus, & vrina, & tamen est febris huius acuties perniciofa, quæ propter hæsitant in curandi ratione medentes etiam periti.

Plurimi, quorum anhelitus graue olet facile succumbunt: confirmata nimirum in corde putredine.

De curatione febrium pestilentialium.

Cap. XXIV.

Summa curationis istarum est exiccatio cum quidem emissionè sanguinis, cum alui solutione.

Mille quidem modis alterandus est aer ad frigidum.

Aqua gelida confertim pota maxime conducibilis est.

Pauca vero fortassis excitat magis feruorem.

Appetentia cum deijcitur, varia ratione

resouetur. Porro noui plurimos eorum, qui viriliter vincentes in seipsis appetentia languorem, naturam aluerunt, & morbo se absoluerunt.


Cibi sint oportet acetosi ; reprimentes, pauci.

Satis de Febris ex Auicenna.



59
M E T H O D I:
P A V L I T V C C A E
D E F E B R I B V S

Compilatio.



Tertiana simplicis brevis curatio.

Dieta.

Dieta in principio alteratiua, in statu, & in declinatione augmenti resumptiua. Alteratiua qualis ptisana colata, aut lac amygdalarum.

Potus aquæ hordei, vel aquæ communis multæ decoctionis qua dieta vti poteris mane, & sero, vsque ad tertium diem inclusivè.

Pharmacia.

Scopi.

DIgestio, Lenitio, Minoratio, Eradicatio
Lenitio eligenda, Eradicatio non nisi
urgente necessitate facienda.

Digestiua a&tu frigida in Aurora, die quietis, post 4. horas cibetur . In die paroxy smi prope declinationem sic pota .

Rec sy. de suc. ros. vnc i. de endiu. vnc. ÷
 aquæ vtriusque endiu. & bugl. an vnc. ÷ m.

In die paroxy smi idem digestiuus propinabitur loco potus cum pauca quãtitate aq. hord. aut aliorum conuenientium , cum quo indormire languens poterit quacunq; hora contigerit.

Post 4. horas cibetur.

Quod digestiuum, si sufficienter ventrem leniuerit, ænemati supersedendum. sin minus interea mane primæ diei quietis vterè huiusmodi ænemate lenituo.

Clyster lenit. Rec. aqu. decoctionis maluarum, betæ, violar. furs. fortiter expressæ cum pauco rhodomelle, & oleo communi.

Hac curandiratione vtere vsque ad tertium inclusue.

In quarto opus est lenitione; qua satius est vti per ænemata, quam per potiones. tu autè cōsidera num natura sit tenax, nam tunc fortiori clysmo vtendum est .

Clyster fortior Rec. aq. decoctionis, vt supra quantum sufficit , in qua dissolue Cassiæ tractæ vnc i. mell. viol. vnc. ii. ol viol. vnc. iii. sal. communis q. 5. fi. clysmus.

Eodem clystere vti poteris in sexta die, nisi tamen vrgeat necessitas leniēdi per os, quod raro tamen vsitatur.

In

In octaua si æqualiter procedant paroxysmi; & corpus sit plethoricum, minoreter materia, plus tamen leniendo, quam eradicando, vt ex cassia, aut manna, cum zucc. viol. & aq. fruct. & thamar. rhab. & diapr. simp. Nam eradicando periculum est, ne irritentur alij humores, & conuertantur in materiam morbi, vnde de pura fiat non pura, & de interpolata fiat continua.

Medicamentum ergo minoratiuum, aut lenitiuum sic potius eligatur,

Rec. pulp. cass. rec. extr. per fet. vnc. i. diacath. vnc. ÷ mis. fiant boli. Aut sic

Rec. p. cass. rec. ex. p. s. vnc. i. mannæ ele. vnc. dissol. cum aq. vt videbitur.

Vel ex manna tantum diss. cum aq. bugl. Vel ex cass. tantum. Vel ex cass. & zucc. viol. Vel ex cass. & diapr. simpl. Vel ex māna cum rhab. eligendo doses pro rerum conuenientia.

Facta conuenienti eductione cibetur languens resumptiuè ex contuso, aut ex pulla, parua.

Vinum esto valde dilutum.

Gibatio die paroxys. fiat semel, in die vero quietis, sed sero, parcius.

*De curatione binarum tertianarum purarum
interpolatarum. Cap. II.*

Conuenit hæc curatio cum præcedenti fere in omnibus. variatio tamen est in hora cibandi. Hic enim semper prope declinationem paroxyismi; ibi verò, ut retro visum est.

Amplius hic citius properamus abscindere causam ratione multitudinis materiæ. Non enim hic timemus, ne de vna fiant binæ, sit ut prius verebatur. quamuis veremur ne de interpolata fiat continua. Similis igitur diæta, similia digestiua, lenitiua, minoratiua, localia, vñctiones, electaria, &c.

*De curatione vnius tertianæ puræ continuæ.
Cap. III.*

Avic. præscribit eandem curationem, ac in interpolata: verum, quamuiseductio sit eiusdem causæ, tamen præsidia magis vsui sunt in continua.

Primum autem expectamus magis digestionem; in materia alioqui crudiore, & inep-
tiore.

Secundo plus infrigidamus ratione maioris caumatis: & hæc infrigidatio duplex, medicinalis, & cibalis. De cibis igitur eligas olera insipida; boraginem, cichorium, endi-
viam

uiam, lactucam, cucurbitam, pruna dulcia,
granata.

Aqua vero sit hordei, succ. granat. acidorū,
&c.

Tertio plus subtiliamus dietam statu iam
propiore.

Quarto plures prouocamus sudores, & vri-
nas.

Quinto plus lenimus, minus eradicamus
propter maiorem alui siccitatem.

Sexto plus phlebotomamus; siquidem cau-
sa antecedens, & coniuncta, vtraque est in
venis.

Dieta.

Prima die inedia plurimum utilis est.

In secunda electa hora conuolenti pe-
sana colata, aut lac amygd. optime coctum,
cum aq. hordei, vel aqua fontana multa de-
coctionis.

Vinum omne prohibetur.

Hæc tamen interea obseruanda sunt con-
stante virium vigore.

Digestiuum magis alteratiuum ad frigi-
dum esto de suc. viol. de suc. cichor. oxyzach.
syr. nymph. in dosi, vt diximus supra.

Exhibendum in fine status cum maiori
quãtitate aq. hord. quam in interpolata. Nec
tamen extinguiue nisi subsit vehemens incē-
dium, & fortis sit casus.

Leni-

Lenitium per inferiorem regionem secunda die, sit ergo.

Clyster ex mell. viol. oleo viol. cum decoctione herbarum frigidarum, quarum supra meminimus.

Quod si alius mollita non fuerit, tunc per os exhibetur cass. rec. extr. aut mānā, aut zacch. viol. atque etiā pulpa thamar. cum zacch. viol. componendo primo bolum cass. postea vero apozema mānā dissolutæ cum aq. buglo.

Phlebotomia si expediat (expedire autem potest, vel ratione causæ intra venas affusæ, vel ratione plethoræ) tunc facta prius lenitione per clyst. eā administra in pauca quantitate, & sæpius partita: nimirum propter dominium cholæræ præsentis.

Facta phlebotoma ad comprimendum cholæræ furorem, vel etiam ad conservandam virtutem, vtere digestivo supra descripto. Vel paucio zaccharo, cum aqua, vel aqua ipsa ex zaccharo soluto, vel iulep. viol.

Iam vero electa die artis quinta, quarta, vel sexta, vel octava quamvis in sexta raro, nisi timore septimæ diei proximæ; insuper, & electa qualitate medicamentum lenitiuorū & non calfacientium, videlicet ex his, cass. mānna zacch. viol. pulpa thamar. rhabar. diapru. simpl. diacath. Arnal. Triph. persic. cum decocto fructuū pectō. vtere in dosi secundū convenientiam x. rerum naturalium, & non naturalium.

Minoratiui forma fit hæc. Rec. aquarum buglo. melissæ, borag. endi. ana ad suff. in quibus dissolue pulp. cass. recent. extr. vnc i. mānæ ele. dr. ij pulpæ thamarind. dr. vij. rhabarb. opt. infusi in succo ros. correcti nō colati dr. i. m. fiat potus.

Pro pauperibus vero sic. Rec. deco. fruct. pe. quod sufficit, in quo disso. pulp. cass. recent. extra. dr. i. zacch. viol. vnc. i. ÷ diapr. simpl. dr. vij. diacath vnc. ÷ m. si. po.

Facta sufficienti vacuatione die sequenti mane exhibe zacc. ros. mox aq. hord. frig. vel hanc cum zacch. Quod si non exquisitè vacuatum sit;

Post 4. horas f. Clyst. lotius ex aqu. hord. iure pulli. vitell. ouorum, & zacch. rubro sine sale, m. vttere. si exquisita fuerit euacuatio cōtentus esto, sin minus alio cōmunis iuuamēti vttere.

Quibus omnibus abstineto in accessione, qua declinante potus aq. hord. cum zacch. restinātius, aut sy. Genti. sine ace. cum sy. de succo endi. cumque electuario, & potu restinātiuo.

Post 4. horas clyster lotius supra descriptus infunditor, & resumptiuè cibetur, & largius.

Post euacuationem vti poteris lenibus aperitiuis, & diaphoreticis. Si videris autem materiam alio inclinātem:

Tum quoque localibus ad lumbos ex vn-
E
guen-

guento ros. frigide & aliis huiusmodi præstos.

Si febris transferit terminum suum, iam non erit amplius pura. Ac tunc uti poteris digredientibus aperitiuis ante descriptis sub aurora, die teporis, sine potu restinctiuo. In die vero paroxysmi in declinatione, aut sine status utere potu restinctiuo ad prouocationem sudoris.

Non autem hic agimus de educatione causæ. porro suus locus est infra quâ de tertiana notha. Neque nunc tradimus de binis tertianis puris continuis. est scilicet istarum eadem pene curatio, nisi quod in binis tertianis continuis magis festinamus ad abscissionem causæ materialis.

De curatione vnius tertianæ non puræ deuenientis à cholera citrina, idest mista cum phlegmate dulci tenui. Cap. IV.

Dixta qualis in interpolata vsq; ad quartum exclusiue.

Digestium, quod Rec. sy. de succ. ros. & acetosi zaccharini cum aquis, ut supra. Non enim eget humor hic multa incrassatione.

Digestium hoc ipsa die paroxysmi loco potus cum pauca aq. hord. aut etiam sine ea; quandoquidem materia non est adeo calida.

Lenitium pro Clystere idem, quod descriptum.

scriptū est in curatione tertianæ puræ. exhibetur prima, & secunda die; cui addere poteris hodom. zaccharinum.

Lenitium vero per os, si expediat tuo iudicio, exhibetur die quarta cum aliqua minorandi ratione phlegmatis admisti. Vel ex pulpa cass. recent. extr. & Diacath. & simil. in for. boli. Vel ex cass. & zacch. viol. cū diapr. simpl. & decocto fruct. pect. vel ex māna tantum aucta dosi maiori, quam supra factum est.

Facta euacuatione cibetur æger resumptiue per potum oligophori leuisque vini etiamnum bene lymphati, mane die quietis: Vesperti vero ptisanā offer cum iure pulli aut lacte amygd. dulc. si ferant id vires.

Die vero paroxysmi alteratiue cibetur, sex, aut 8. horis ante aduentum ipsius.

Quod si contingeret vera mundities, & vires non ferrent tenuissimum victum, licebit ægrum cibari resumptiue.

Phlebot. cum tibi videbitur conuenire, vel forte ratione plethoræ, vel causæ antecedentis, facta lenitione ventris administrabitur primis diebus.

Facta minoratione administra localia notissima ad loca renum, ad cor, stomachum, cerebrum, & hepar.

Deinde residuis humoribus iterum exhibeto digestiua aperientia, & alterantia leuiter, quæ Rec. sy. Gentil. sine, aceto sy. de
E 2 suc.

suc. endiu. & aquar. capill. ven. & buglo. in dosi consueta, vel etiam cum eodem digestiuo exhibe simul elect. sem. comm. frig. cum aq. hord.

Post paroxysmum, si cetera conueniant, iniungere poteris potum restinctiuum.

His rite sic administratis oportunum erit uti diæta resumptiua die quietis, die vero paroxysmi diæta media.

Sed octaua, aut decima euacuetur humor iã concoctus medicamento, quod Rec. decocti fructuum suffic. in quo dissol. pulp. cass. recent. extr. per s. vnc. i. mănæ ele. vnc. ij. rhab. opt. infusi in suc. ros. nō cola. dr. i. spicæ paulum tripherae pers. aut diapruni solutiui in dosim huius, aut illius arbitrio tuo.

Vel sic Rec. aq. trium prædict. in quibus dissol. mănæ ele. vnc. ij. ÷ rhabar. op. infusi in suc. ros. dr. iij. pulpæ thamar. vnc. ÷ m. fi. po.

Vel Rec. elect. de suc. ros. vel Diapr. solut. cū cass. & zacch. viol. & decocto fruct. pector.

Die sequenti potetur æger aq. hord. aut zacch. ros. quemadm. supra.

Succedit Clyster lotius etiã, aut simplex ut fecimus ibi.

Perdurante vero febre propter phlegmatis admisti crassitiem, tunc iterum digeras materiam oportebit, potius cum sy. de rad. Mesu. & cum acetoso, & aq. supra recensitis.

Decimaquarta vero die, vel circiter iterũ eodem modo euacuetur materia. Verum

ut.

vtere rhab. inf. & colato cum forti express.
Præterquam quod laudarem decoctum cum
agar.& cum sale gem.

Si vero febris hæc contigerit hyeme, me-
dicamenti forma deligatur aptissima pillula-
laris.

Si cum febris fuerit continua, eadem vte-
ris curandi ratione, ac fecisti in interpolata,
dum ramen memineris illorum sex cano-
num ibi præfixorum.

*De curatione vnius tertianæ non puræ interpolatæ
famossæ deuenientis à commistione plegma-
tis. Cap. V.*

Dixta, & potus in principio, maxime ve-
ro die paroxysmi sit alteratiuus.

Digestium non alteratiuum ad frigidum,
& multo minus cum potu restinctiuo, sed sit.

Sy. acetos. zacch. pro basi, & de suc. end.
pro minori, aut de succo buglos. aut endiuia
vnc. i. ÷

Exhibendum æstate frigidum, & die paro-
xysmi principio declinationis.

Interim prima die Clyst. communis iuua-
menti, quale annotauimus in tertianæ puræ
curatione.

Sed die quietis esto clyster lenitius cum
pauco rhodom. & ol. communi, ol. vero viol.
abstineto, quod alioqui phlegma nutrirer.

Apparentibus vero signis digestionis ma-

teria minoranda, seu quarta, seu sexta, seu octava : denique medicamento in forma boli ex cass. diacath. Vel in forma potabili ex mānā, & similibus.

Quibus absolutis vtendum est aperitiuis diureticis, & sudorificis in potionē, maxime vero die paroxysmi adhibitis nō reſtinctiuis, qualis est aqua hord. cū electuario semin. cōmun. die, & hora supra notatis.

Et rursus eradicetur materia medicamento, quod Rec. aq. bugl. borag. end. añ. ad suff. vel decocto fruct. lenitiuorum ad suff. in qua diss. pulpæ cass. rec. ext. per set. vnc. i. rhab. opt. correcti perspicam infu. in suc. ros. & nō cola. vn. i. diapr. simpl. dr. vij. elect. de suc. ros. dr. iiij. agar. dr. i. salisgem. dr. i. m. fr. po.

Vel quod Rec. decocti vt supra: in quo diss. mānæ electæ Calabrię vnc. ij. rhab. op vt supra dr. i. diacath. dr. ij. triph. pers. pro acutie, si adest vnc. ÷ m. f. p.

Pro solutiuis, quoq; ad addi licebit diapr. solut. vel cathar. ros.

Item quod ad reliquias, digestiua prouocantia sudores, & vrinas, sed tamen leuia, qualia sunt sy. Genti. sine ace. & sy. de endiu. cum aquis, vt supra.

Aut vteris electuario sem. com. cum aqua hordei loco potus, licet nō multum reſtinct. præterquam tempore calido, & æstiuo.

Et tunc resumptiuę cibetur æger quietā die bis mane, & sero.

Totoque hoc tempore vti poteris clyst.
acutis, maxime in horrore pharmacorum, &
in materia parata per secessum ire, veluti ex
cass. rec. extr. cum agar. & salegem. rhodom.
ol. communi cum decoctione &c. Exhibe
vno die quietis.

Perdurante adhuc morbo decimoquarto,
aut circitet, æstate eodem solutio vteris, ta-
men coletur Rhab. cum forti expressione.

Localia eadem.

Aperitiua quoque eadem, &

Potus moderatus in die paroxysmi hora
declinationis.

Clysmus quoque sit idem.

Amplius procedente morbo deueniendum
ad digestiua fortiora, vt de radicibus Mesu.
& Bizantini cum aquis aperitiuis.

Medicamentum forte debile in forma pil-
lul, Rec. pill. de rhab. & agar troch. an. dr. ÷.
for. m pill. cum cath. ros.

Item pro apozemate iulebi viol. vnc ij. aq.
hord. vnc. iij. m. Exhibe post tres horas.

Loco pillul. de rhab. licebit vti rhab. tritura
in fusa. & loco iulepi pro magnatibus man-
na in eadem dosi.

Postridie regimen pharmacati.

Localia, quæ supra.

Diæta resumptiua mane, & sero non sine
alteratiuis, vt cõtusũ cum colatura ptisanæ,
ana, & m.

Qua ordinatione peracta succedũt his ape-
riua

ritiua fortiora, & diuretica sūt distanda, atq; interim

Digestiua, quæ supra sine potu multo.

Quod si cum hac febre mensis vnus latitudine complicata fuerit oppilatio lienis, atq; hepatis, sicut sæpe numero vsu venit, vt propterea generetur sanguis aquosus disponens ad cachexiam, aut ad hydropem: tunc vttere

Electuario diatrion santal. & diahodo Abba. abdomine applicatis aperitiuis, & alijs, de quibus infra.

Interdicendus nimius potus aquæ, necnō omnia impensè frigida quomodolibet assumpta.

Vomitus, vt videtur Auicennæ, magno opere conducit pranso, vel cæ nato duabus tamē legibus obseruatis; cui scilicet est consuetudo vomendi, & cum materiam natura transmiserit ad ventriculum; quod tamen per rato contingit. Termino hoc exacto alteratiua non sint amplius frigida, sed valde remissa, nisi tamen affectus esset acutus conuersiuus.

Febris hæc facili negotio protrahi potest in longum ratione phlegmatis crassi, præsertim in corpore disposito, atque etiam si successerit in Autumno ex reliquiis febriū acutarū æstiuarūq; quo casu rationi consentaneū est, vt complicantur oppilationes, & periculum immineat hæticæ, aut hydropis, nisi diligenter caueantur eadem, remedijs scilicet

aperitiuis, digestiuis, electuarijs, lenitiuis, localibusque consuetis, & diætæ tum vniuersali, tum particulari.

Insuper imminet periculum febris continuæ; cumque iam fermè confirmata fuerit oppilatio ieccinoris, quæ est periculosa; tum propter multitudinem, tum propter viscositatem.

Accidit quoque sæpissimè, vt cum hac febre complicetur alui tenacitas, nisi tamen obrepserit lienteria ex debili facta ventriculi retentiuæ.

Quo casu rursus redeundum esset ad medicamentum fortè debile in forma pillulari cū apozemate, cuius ante meminimus.

Diætæ sit resumptiuæ. Potus esto vini albi subtilis odorati non adeo lymphati, nec multum vinosi.

Cauendum tamen ne languens cibus obruatur plusquam par est: porrò solet eo tempore appetitiua vegetior esse, quam digestiua.

Cauendum etiam à tristitia, quæ per morbi longinquitatem plerumque solet infestare decumbentes.

*De curatione binarum tertianarum non purarum
intepolatarum. Cap. VI.*

Conuenit hæc curatio cum præcedenti in multis, vt diætæ, & digestiuis, & minoratiuis, & eradicatiuis.

Paroxyfmi sub hac febre possunt esse trium modorum: nimirum aut communicâtes, aut subintrantes, aut alternantes, vt dicemus in Opistographo de compositione febrium.

Febris hæc incipit plerumque à materia multa, quando fuerit ex se incipiens. in qua si animaduertes acutiem ex demonstrantibus signis, ipse non differas abscissionem causæ materialis.

Constituta igitur diætæ tenui incipe à minoratione causæ lenitiuo aucto in dosi iuxta diætamē decem rerum, videlicet naturalium, & præter naturam.

Clyster parabitur, qualis in tertiana notha. Nimirum nihil variatur in hac curatione, quam supra factum est: præter quam quod tempore educationis, quoniam hæ binæ febres indicant properandum esse magis ad educationem causæ materialis.

Igitur vtere medicina forti debili, quæ simul molitur difficilem eradicationem, & vires non labefactat, quippe semel eradicare, cū periculo virtutis nō expedit, verū euacuationem sæpe numero partiri multo satius est.

Vocatur hæc medicina ab Auic. subtilia-
tiua simul, & aggregatiua.

Ea est duplex, in quã ingrediuntur corpo-
ra medicinarum simplicium in substantia,
qualia sunt pillulæ de agar. pill. aggreg. pill.
de Rhabar. dosi tamen competenti. Poste-
rior, in quam ingrediuntur vires tantum me-
dicinarum, vt decoctiones, infusiones, non
autem colaturæ.

His vtimur in morbis chronicis, aut re-
ctius polychronicis, ea repetendo, si libet, sin-
gulis hebdomadis.

Insuper variatur hæc curatio secundum
varias permissiones humorum. bilis enim, &
cum tenui & cum crasso phlegmate commi-
sceri solet.

In utroque casu curabis, vti in duabus su-
perioribus capitibus annotatum est; Electæ
die artis, & cognitis signis, & motu materiæ.

Solet hæc febris succedere febribus mali-
gnis, & sæuis iam curatis sub finem æstatis,
& in principio autumnii cum debilitate vir-
tutis regitiuæ, & membrorum principum
potissimum hepatis regenerantis malos hu-
mores, & iam in periculo hydropis, & he-
cticæ.

Electuaria, & vnctiones, & localia, & dia-
ta particularis esto, qualem exponemus in
curatione phlegmaticæ,

*De curatione unius tertiana continuæ nothæ.
Cap. VII.*

Diæta apparentibus signis acutiei principio sit valde tenuis.

Requiritur in hac febre lenitio maior siue per os, siue per clyst. quam in interpolata: nimirum est huic maior calor, & siccitas.

Clyster qualis in tertiana pura continua, addito tamen rhodom. & agar. cum salegem. ratione phlegmatis.

Phlebotomia siquidem indicabitur, emolita prius aluo fiat ex hepatica, vel communi, potius partita, quam semel multa quantitate.

Plerumque vero plebotomia iuuat magis, quam pharmacia: nempe respicit phlebotomia magis vtramque causam.

Digestium materię proprium hoc esto. Rec. sy. de succo rosarum vnc. i. & de suc. endiu. vnc. ÷ aq. buglo. vnc. i. ÷

Lenitium per os ex aq cordiali cass. thamar. manna, aut zacch. viol. rhab. triphe. cōsucta dosi, quæ fuit à nobis alias dictata.

Dies artis erit apparente signo digestionis & si materia fuerit furens in quartana.

Quod si dederit inducias, & crisis non apparuerit, septima die.

In principio vero non expedit, quia supponimus febrem non esse de valde acutis;
imò

imò oportet prius expectare perfectam digestionem.

Vti poteris solutio descripto in curatione tertianæ puræ continuæ. addito in decoctum agaricū cū salegem. ratione phlegmatis.

Localia opportuna, & maxime stomachica administrantur, ut moris est.

Interea diætā semper esto resumptiva die quietiori, mox altera die partim resumptiva, partim alterativa, qualis est ptisana cum iure pulli.

*De curatione binarum tertianarum notarum
continuarum . Cap. VIII.*

IN hac febre festinandum est magis ad purgationem, quam in vna nothā continuā; siquidem in duplici coniungitur multitudo maior.

Mollita igitur aluo præstat sanguinem mittere partito potius, quam omnino semel multa quantitate.

Nimirum venæ sectio neutrum ob humorem conuenit, sed tamen ratione sequelæ talium humorum, qui in venis cum sanguine commiscentur, non est incongrua.

Quod si nulla esset necessitas phlebotomiæ tum diætā, lenitiua per clysteres, & digestiua puranda sunt, ut audisti nuper.

Quarta die nullo apparente signo iudicatio;

tionis (quamvis in hoc casu satius fuisset die secunda) per os exhibere lenitium aliquod, aut minoratium ex ante notatis in forma boli, aut in forma potabili dissolue mannam, vt bene nosti.

Quod si hæc febris se se ostenderit acutam, quamvis raro accadat, frænanti cholera, pituita; die secunda, vel quarta iuxta mensuram, & conditiones symptomatum vteris minoratio, cum rhab. & triph. persic. & sim.

Solutiua vero sunt electuaria de suc. ros. & Diapr. solut. & sim. adhibenda cum præmeditatione pro dispositione, ac viribus ægro-
rantis.

Et si verò, febris hæc, quæ sit per duos humores putrescentes intra venas in duabus mineris facientes duplicem motum: ratione multitudinis videri potest acuta, quoniam tamen hæc multitudo partita est, propterea non inducet acutiem, & læua symptomata, & eo magis, quod humorum putredo longe diffusa est à corde.

Adhuc vero perdurante febre digeretur materia partim alterantibus, partim aperientibus, modo & tempore qui maximè videantur accommodati.

In declinatione vero status vtendum electuario sem. omnium frigid. cum potu restituito, si tantum inflammatio subsit magna, & maxime in fine hebdomadæ, quæ tamen,

inflammatio raro fit, nisi sit in causa phlegma
baurachium idest nitrosum nominatum, quod
quidem efficere solet malitiam.

Valet autem vsus electuarij ad prouocan-
dos sudores, qui facile contingere possunt do-
minante cholera prę phlegmate.

Quod si oportuerit iterum tentare purga-
tionem, pręstanda est eadem die artis medijs
eradicatiuis non violentis, aut infestantibus
corpus, sed prope familiaribus, iuxta coniu-
gationem 6. rerum non naturalium.

Iam vero suas accessiones longius pro-
trahente febre, & nihil imminuta eiusdem vi-
argumentari licebit esse vitium ex materie
multitudine, tum vero ex erroribus commis-
sis ab infirmo, qui facile labefactare valent
hepatis facultatem, & pręinde contrahere
cachexias ex oppilatione in poris, & venis;
adeoque ex sanguine iam aquoso generan-
dum futurum hydropem.

Quap: opter maxima cum diligentia ro-
borandę sunt virtutes, & aceruatio prauo-
rum succorum summo opere cauenda.

Id quod commode perfici poterit medica-
mento forti debili crebrius exhibito, nec noa
victu conuenienti.

*De curatione febris Causonis, seu ardentis.**Cap. I X.*

Intentiones curatiuæ quatuor. Prima in regimine sex rerum non naturalium, & præcipuè in cibo, & potu.

Secunda in digestionem materiæ.

Tertia in abscissione causæ materialis.

Quarta in remissione suorum accidentium.

Dixta sit fere non gradus iusti cibi, sed tenuissima, primis præsertim diebus.

Digestium ex oxyzac. sy. de nymph. sy. acetofo, sy. de acido citrij, cum aqua cord. die minoris afflictionis, hora quietiori; die vero maioris afflictionis in fine status in locum potus esto.

Prima die Clyst. lenitiuus, qui Rec. rasuræ cucurb. par. 2. suc. fol. siclæ part. i. in quibus disso pulpæ cass. recent. extr. dr. vij. mell. viol. dr. ii. ol. viol. dr. iij. salisgem. dr. ÷ m.

Quidam prima, aut secunda die exhibent lenitiuum per os, quod Rec. mannam elect. Calab. cassiam, thamar. & sim. quarta vero purgabis corpus electiue.

Si accidentia causonis sint valde leuia, quarta die mouebis eradicatiue præmissa, sanguinis missiones si materia cum sanguine mista sit: alioquin abstinendum, ne furiat cholera de magis.

Interea cor tuendum à malignis vaporibus per hoc, quod Rec. sy. de acido citri vnc. ÷ pulu. diamarg. frig. dra. ÷ m. ante cibum potui da.

Epithemata cordialia, & theriacam resolutam aqua namphe thoraci dilue.

Pulueres item contra lumbricos inde ventriculo.

Hæc dum aduenetit dies artis, qua die electiue vt educas, Rec. flor. bugl. borag. viol. p. i. pulpæ thamar. vnc. ÷ prunos numero 10. passul. ziziphorū ana vnc. ÷ si. deco. secundū art. in suff. quantitate aq. acetosellæ sic, vt sit restibilis lib. ÷ in col. diff. mānæ Cal. ele. vnc. ij. rhabar. opt. infusi in suc. ros. & nō col. serup. iij. triph. pers. vnc. ÷ m. Hoc etiam exhibebitur & secundò, si necessitas urgeat.

Postridie regimen pharmacati, sed si in aurora accessio subreperit, abstinedum tunc est à potu: sed in declinationem differendus potus restinctiuus.

Item est stomachus confortandus.

Alius clystere lauandus iure pulli vitellis ouorum, & zacch. non adeo rubro.

His actis si residuum materiæ sit, repetendum rursus est digestiuū, puta hoc, quod Rec. sy. de rad. Genti. sine ace. sy. de suc. endiu. cum aqu. cordi. m. Detur in aurora, si non sit accessio, si vero sit, differendum in declinationem status; vbi sitis sit clamosa, cum electuaio, quod paratur ex quatuor sem. com frig.

potus restin&tius ægrotum manet.

Quantum ad remissionem accidentium, primo si sint vigilæ, seu dolor capitis, curanda sunt hæc somnificis, non omissis etiam, papaueribus oxyrhodinum autem in fronte, temporibus: & naribus esto ex ol. viol. rosato omphacite, populeo, & pauco aceto cum aq. ros. sed caute tamen ne lethargum improvidus accerfas.

Si sitis urgeat crebris hanc lotionibus gutturis ex aq. hord. frig. aut aq. infus. pulpæ thamar. aut vino aquoso compesces.

Si ariditas horreat linguæ, vel nigredo, discuties hanc humectantibus, & abstergentibus: ergo fiant lotiones ex aq. hord. aut pupatellæ ex semi. psyllii, & portul. cōtutorum, quæ pupatella in eadem aquam infusa confricetur.

De curatione febris sanguineæ.

Cap. XX.

HÆc curatio perficitur sex intentionibus. Prima est euacuatio. Secunda subtiliū incrassatio. Tertia in frigidatio. Quarta mundificatio. Quinta digestio. Sexta resolutio.

Pro prima fiat sanguinis emissio repetita.

Pro secunda administra sanguinis incrassantia, ut lactuca, Portul. cucurb. vel syr. ex eisdem.

Pro

Pro tertia intētionē cibi sint citruli, lactu-
cucurb. & omnia olera insipida. Potus re-
stinātiuus.

Pro quarta intentione Cassia, manna, pul-
pa thamar. & sim.

Pro quinta, cum est synocha putris, vt in
alijs humoribus, sic est digerendum.

Sexta intentio completur diaphoreticis,
post quam tamen facta est phlebotomia le-
nitio, eradicatio, mūdificatio, in frigidatio, &
æquatio, & omnino in declinatione.

At vero diætā sit apprime tenuis, sicut in
causone.

Si vero synocha sit putris, paulo amplius
in qualitatem, & putredinem intendendū
mens est.

De curatione febris phlegmaticæ.

Curatio febris phlegmaticæ tribus intē-
tionibus continetur. Prima quidem le-
nificatione, & vomitu. Secunda incisione, &
subtiliatione. Tertia vrinæ prouocatione, &
diureticorum vsu.

Quantum ad lenificationem. Hæc inclu-
dit minoratiua, vt decoctiones, & infusiones
Agar. Turbith, & similium.

Vomitorium, autem primo leue sit, deinde
acre, materia vero iam digesta diuretica
sunt administranda, atque hæc de tertia in-
tentione:

Quantum ad secundam intentionem vtē-
dum syr. de radic. Gentilis cum aceto . quo
facto purganda materia medicamentis ipsis
in substantia , non in virtute tantum . Hæc
autem in toto augmento . In statu vero pri-
mo resumptiuè cibabimus, & electiue solue-
mus. In æstate sic; Rec. decocti fruct. leniti-
uorum, in cuius colat. suffic. dissol. pulpæ, cas-
siæ recent. extr. Agar. dr. iij. salisg. dr. ÷ rhab,
optimi dr. i. Diaphæn. vnc. ÷ fiat pot.

Post hæc tutius vti poterimus diureticis
fortioribus, & iterum partim digerimus, par-
tim euacuamus.

Digestinum sit sy. de rad. Mes. cum aquis
appropriatis, & electuarium 4. sem. commu.

Post aliquot dies iterum intendas abscis-
sionem causæ materialis electuario pillulari,
quod Rec. pillu. aggreg. Agar. troch. & rheib.
an. dr. ÷ formentur pillulæ cum cathart. ros.
& post 2. horas detur Apoz. quod supra no-
taui.

Localia fiant pro stomacho roborando.

Tertio non dubitandum humores digeri
per syr. bizantinum de radic. Mesu. de eupat.
cum aqua melissæ, &c. deinde corpus expur-
gandum medicamento forti debili, idest cum
Agatico, Turbith, & sim:

Diæta sit citra omnem humiditatem ad-
uersis oppilationibus, quæ semper huic fe-
brium generationi comites fuere: proinde

iun-

inungenda regio splenis, stomachi, iecinoris propriis aperientibus.

Hic adis si residuum quid manserit, regimine leuandum particulari, & clysteribus ex rhodom. Agar. salegem. & hieris vtrisque.

Si firma iecinori subsit obstructio, vino infusionis rhabarb. colati corrigetur.

Stomachi vero regio ceroto variisque galliæ fouebitur.

Adhuc vteris electuario, quod Rec. pulu. trium santal. dr. i. pulu. Diarrhodon dr. ij. 4. sem. com. frig. vnc. i. zacch. albi clarificati in aqua capill. ven. vt fiant elect. in mors. Dosis vnc. ÷ in singulos vsus.

De curatione febris quartane.

SY. specifici cuiusque humoris quartanam inducentis. si melancholia naturalis subsit, Rec. sy. de suc. lupul. & de suc. fumar. simpl. & de endiu.

Si sit cum chol. adusta, valet syr. viol. de suc. cichor.

Si sit cum repletionem sanguinis, non est parcendum phlebotomiæ.

Si quartana sit ex se incipies, competit & phlebotomia ex vena cõmuni, deinde si necesse sit iterum ex Saluatella.

His autẽ præcedant alui lenitio per clyst. rem, ex decoct. herbarum commun. cum cassia, rhodom. ol. puro. post 4. vero paroxys-

mos iterum lenias per os (humorem quartanariū proprie non attingendo) siue cassia, siue manna, zacch. violato Diacath. & aq. fructuum incoctorum.

Si vero vergat humor ad superiora, vomitus est prouocandus hora paroxysmi.

His iam actis denuo materia digerēda est, & partim aperitiuo, partim alteratiuo deducenda.

Dixta sit contraria causæ, media .s. qualitate, vt est hordeatum in iure pulli. Die paroxysmi cibo abstineat, & vomitum prouocet humorum.

Postridie cibus esto resumptiuus, Vesperi alteratiuus.

Posthæc ex vsu Clyster est ex agar. salege. rhodom. simpl. cass. & hiera si velis valentior rem.

Interim lenitiua, quæ debentur, non excedant ordinem consuetum.

Si quartana per hebdomadas, & menses procedere videatur, aduenienti quadragesima die tentabitur abscissio causæ primum in forma potabili, Rec. flor. cord. follicul. seneg polypodij, Thymi & epythymi, passul. q. s. fiat deco. fortis fortisq; expressio in col. suff. dissol. pulpæ cass. recenter extr. vnc. i. aut suc. viol. vnc. ij. rhab. infusi in parte dictæ decoctionis non colari & r. i. conse. Hamech vnc. ÷ aut diacath. ad dr. vij. mi. fiat pot.

Ab his si persistat humor, vomitus fortis
pro-

prouocandus, & diuretica valentia . Adhuc autem tertio materia digeratur , & soluatur non forti simpliciter medicamento, sed forti debili , nec in forma pillulari , sed potabili, quale nosti .

Hæc, si quartana per se fuerit incipiens. Si vero successerit alijs febribus non à lenitione , neque à phlebotomia nos exordiemur, sed à digerentibus, & aperitiuis, & à dicta resumptiua.

Sy. autem esto: qui, Rec. sy. de rad. Mesu. vel Gentil. sy. de suc. lupul. aut fumar.

Post aliquot vero hebdomadas absceindenda causa : sique sit hyems, in forma pillulari, Rec. pill. de fumoter. rhab. opt. & agar. troch. an. dr. — deinde propinetur ægroto

Concinnatum Apozema ex manna , aut sacch. violato, cum aq. hordei, &c

Quod si post exactum mensem persistat quartanarius fomes, materia digeratur, & medicamento formæ potabilis ante dictatæ depellatur: postmodum applicentur necessaria localia. & iterum digeratur materia per aperientia , & prouocantia leniora, quale digestiuium est de rad. cum emulsione 4. sem. commun. frigid.

Post duas hebdomadas expurges corpus cathartico sub forma pillulari, quod ante posuimus in curatione quartanæ successiuæ.

Vltima digestiua sunt sy. de thymo, deq; epithymo, de sy. fumar. maiori, & de radic.

Mesu. Bizantinus cum aqu. capill. vener. & scolopendrij. vltima perpurgatio sic ex pill. de lapide armeno, &c:

Et quoniã adiunguntur sepe numero quartanę succedēti graues obstructions hepatis, lienis, ventriculi; mane decoctũ offeratur thymi, & epith. polypodij, sol. senæ passul. Agar: &c. in aqua casei, vel simili.

Interim inungatur abdomen ex oleis ap. ritiuis. sic Rec. ole. vtr. lilij de cappar. amygd. amar & dulc. ol. anethi, an. vnc. ÷ succi cyclaminis, & herbę lingue canis depuratorum an. vnc. i. suc. rad. filicis, & cappar. an dr. iij. cerę q. s. mi. si. vng. quo diluatur tota mollitudo ventris mane vespereque forti manu fricante, cui superfusioni folium braficę calidum superdetur, & deligetur.

Ad hæc utilis est infusum rhab. dr. ii. in albo generoso. uero de tertio in tertium ad vnc. iij. aut 4. vtatur theriaca magna, vel mithridatio.

De curatione febris besticæ.

Diatæ vesperi alteratiua, mane resumptiua. Prioris generis sunt ptisana colata, nõ colata, cum lacte amygd. decocta mica panis cum lacte. decoctio cucurbitę in eodem lacte, bugl. borag. cichor. cum eodem lacte.

Caro testudinis cochlearum terrestrium, cancrorum fluuiialium, ranarum aquaticarũ.

Re-

Resūptiua prima sunt ptisana colata cum iure pulli, vel non colata. Posthæc vero aues parue terrestres. Tertio pulli gallinacei, &c. Quarto contasum pector. Gallinæ, aut Caponum. Quinto oua sorbilia. Sexto testes gal-
lorum. Septimo iura consumptarum gallina-
rum, aut caponum.

◦ Vinum sit album aquosum.

◦ Debētur hæc hectica simplici post solam lenitionem. Compositæ vero post purgatio-
nem.

◦ In cibum, & alteratiuum exhibent Medi-
ci lac, siue caprinum, siue asiniū, vel etiā
humanum, prout magis minusque horret
hæc æger: sumendum ab vbere si fieri possit,
quantitate lib. 7. ordine, & modo consueto.

Si hoc stomacho graue sit, hordei liquor
præbendus, aut ptisana colata cum pauco
zaccharo.

◦ Præparatione, & digestionem humorum nō
æget æger, nisi cum hectica coniungatur
putrida febris. Pro sy. tamen est violac. iuiu-
binus, granat. dulc. apill. vener. & aqu. hor-
dei.

◦ Medicinalia, quibus vtimur sunt, lenissi-
ma, vt cassia, manna, zaccharum viol. diapr.
simplex vsque ad diacath. si modo sit alius
adstricta, & corpus caco-chymum, & præmis-
si fuerint clysteres.

Hæc igitur lenitiua non erit ab re post
aliquot hebdomadas sæpe repetere pro com-
ple-

plexione patientis, ad superfluitates excrementicias educendas.

His actis nil melius balneis aquę dulcis. in labro vulgo tina pro siccitate madefaciēda.

Probatur item elect. hac forma, Rec. 4. seminum frigid. vnc. i. sem. papau. albi, semin. coti an. dr. ij. nucl. pine. amygd. dul. Pystaciorum, pulpæ passul. ana vnc. i. pulpam pector. eaponis assati num. i. pistentur omnia, & secundum artem cum sacch. albissimo in aqu. bugl. quota suff. fiat elect. in mors. & offeratur ieiuno mane vnc. i. cum aq. Cochlearum ter restr. vel testudin. aut cancrorum fluuial. potest etiam confici elect. cum pulpa Cochlearum minorum, vel testudinū vel cancrorum fluuial. aut omnium iunctim, aut singularium.

Vnguentum ad renes valde alteratiuum, Rec. ol. nymphæ, ol. semin. cucurbitarū, ol. viol. ol. ros. omph. ana vnc. i. lorum decies vel aqu. ros. ex caph. endiu. Adde ceroti albi vnc. i. ceræ albæ q. s. & sanguinis testudinis modicum, fiat lento igne cerotum.

Hoc diebus singulis illine spinam dorsi.

Epithemata pro iecinore fiant ex succ. solani, cichor. cum paucō aceto, & aq. rosarum.

Ad hæc vtimur puluere capitali pro capite roborando, ac tragea pro stomacho, quæ vulgaria sunt.

De curatione febris pestilentis.

Primo quoque tempore fiat phlebotomia.

Postero die statim eradicanda materia electivè tota hoc medicamento.

Rec. florū cord. florū fumar. ana pug. 2.
pulp. thamar. vnc. ÷ Agar. dr. iij. salisg. dr. ij.
fiat decoctio in aqu. cord. & in suff. col. diss.
pulpe cass. recēter extr. vnc. i. māne Calabræ
vnc. ij. rhab. opt. infusi in suc. ros. vigorati
& colati, dr. iij. semin citrij contusi, sem. A-
lexandrini, Dicta. albi contusi, ana dr. ÷ sy. de
acido citri vnc. i. triphe, pers. vnc. ÷ m. fiat
potus.

Purgatione habita porrige perpetuo ante
cibum diamargar. frig. cū elect. de gem. aur
sim. Localia applicentur etiam à principio,
& cibi sunt resumptivi.

Pulvis experimento comprobatus contra
malignitatem Rec. Imperatoriz, biscortæ
torment. gentianę, herbæ carlinæ dictæ, radi.
aristolochiz longæ ana modicum, croci mo-
mentum, fiat pulv. dosis est aureus cum vino
odorato, aut succo acidi citrij, aut aqua ace-
tos. contineantur simul per tres horas, po-
stea fiat epithema cordiale, & hora vna ante
cibum detur pulvis contra lumbricos, qui
continet hæc;

Rec.

℞ Rec. sem. citri, sem. Alexandrini, sem. portul. dictamui albi, cornu cerui vsti ana dra. i. puluerentur, & m. dosi dram. i. cum aqua gram. i. vel portul. aut cum sy. de acido citri cum dicta aqua postmodum cibetur his sc. quæ gustando acidulum referunt saporem.

Clysteres sunt leues, nisi materiæ vergant ad superiora, qui motus fortibus est reuocandus.

℞ Si lethargus, aut phrenitis inuaserint, curentur hæc prout artis est in proprio suo capite tradendæ.

Similiter si pestificia, aut alia exathemata maligna suborta sint.

Si febris vero post 14. diem non det inducias, immo post septimū, immo post quartū (quoniam est ex valde acutis) digeratur materia syr. acetoso, vel syr. acido citrij, & de succ. bugl. cum aqua accommodatis.

Et si iterum fuerit opus educere materiam electiue, educatur, sed lenius tamen quemadmodum dictum est.

Inter cætera vero fiat aeris ambiētis commutatio ad puriorem, etiam cum vestimentis.

Hæc satis sunt ad curationem pestilentis febris.

Ad præcautionem vero vtimur pillul. Aui. gen. ex aloe, myrrha, & croco. addunt alij agar, bol. arm. alij vtuntur theriaca. Alij

caricas, rutam, iuglandis nudem. Alii sy. de acido citrii. Alii sy. de succ. acetos. aut de ribes cum pulueribus, vt dixit, contra lumbricos.

F I N I S.

**LAVS DEO, AC B. M. V.
ET D. LVCAE.**



PRAEFATIV NCVLA

Ad contractam morborum interiorum
therapiam Neapolitanam.

Hippocrates venerabilis noster doctor suo nos exemplo docuit in toto propemodum opere curationum epidemicarum, ut capita duntaxat earum sint adnotanda memoriae gratia. Neque enim in demonstrationibus, aut rationibus occupatos esse nos expedit, qui nihil in vita vacantes assidue vacamus innumerorum aegrotantium officijs. Ausus est carpere Dionysius Longinus in libro de grandi dicendi genere, Coi nostri Scriptoris aphorismorum primum, quod hic esset conscriptus asyndetis, & quasi lapidibus sine cemento non coherentibus verbis. Verum neque Rhetor aliqui gravis, nec eum imitatus Petrus Victorius in Phalereum, qui dixit amatam viro compositionem duram in sententijs suis edendis: agnouerunt necessarium. Hippocratis aeticismum ab optimo senescitu.

studiosè cultum eo consilio ; quod in
arte alioquin infinita reddere pressam,
& adstrictam toto satageret animo prag-
matias infinitudinem.

Ad hunc nos modum per quasdam
quasi clausulas, & per interpunctas no-
tas medendarum interioris corporis af-
fectionum exempla dedimus ; tum, quia
complectentibus has interdum scripto
nobis ocij satis nun fuit ; tum quia non
alia pariter vtendi ratio conuenerit his,
qui pugillares, & enchiridion me dendi
volent.



96
AD MORBOS
INTER NOS.

✿ ✿
ET PRIMVM.

Ad Phrenitidem remedia.

A Er frigidus si non sit natura, paretur arte
ex frondibus frigidis, &c.

Seçtio basilicæ dexteri brachij, doctrina
Gal. 1. Aphor. 23.

Syr. de portul. de papau. & de inf. ros. cum
aq. nymph. nam valent ad conciliandum
somnia.

Oxyrhodina ex ol. ros. omphac. parte 1.
aqu. ros. part. 2. & aceto pauco; atque primo
quoque tempore, & prima die; postea

Clyster esto, Rec. cast. traç. vnc. i ol. viol. &
mel. viol. ana vnc. iij. cum decocto materia-
rum & herbarum vsualium m.

Seçtio cephalicæ ex sinistro brachio se-
cunda die, & tertia.

Seçtio venæ frontis ad vnc. iij. sanguinis;
vel iij.

Aqua paretur ex hordeo pro potu.

Pharmacum quarta die Rec. flor. cor. p. i.
tham.

tham.vnc. ÷ si.dec.in aqu.nymph. in colat.
 diff.mannæ ele.Calabræ, aut succi viol. vnc.
 iij. Rhab. opt.vigor. dra.i ÷ inf.in vncus iij.
 suc.ros.perf.Triph.perf.dra.i. & non col.fiat
 potus.

Cucurbitulæ scarificatoriæ.

Secunda die caput abradendum, & eidem
 affundendū guttatim stillicid. ꝓ Rec.fl.viol.
 flo.nymph.an.m.lactu.mandrag.hyose an.p.i.
 cap.papau.numero ij.decoq.in suf.quantita-
 te aqu. f. embrochæ ad futuram coron. tepi-
 dæ si æstate, calidæ si hyeme; mane, & sero
 vſitandæ ad duos dies.

Capiti appone post stillic. pannos lineos
 madefactos in ol.ros.omph.

Odorifera, quæ vocant. Rec.aq. myrt.nym-
 ph.ros.rubrarum ana vncias iv.aceti ros.vnc.
 ÷ flor.viol.& ſantal.omnium, ana dr.ij.nym-
 ph. p.i.in vafe vitreo vtitor odorans.

Aquæ ſillatitiæ ex lactucis mane, & sero
 vſitandæ prandio, & cæna ad attemperandâ
 bilem.

Fotus gallorum viuorum mane, & sero per
 vnicam diem; altera vero catulorū lactant.in
 vita diſſectorum, vel poſtremo ranarum
 eodem modo foto capite; quod ad alias par-
 tes frondibus lactucæ.

Syr. de papau. aſſumendus per os cum
 ſy.de nymph.& requie Nic.& dummodo fe-
 rant id vires, vt ere philonio rom. nam alias
 non commendantur narcotica, ſi imbecilli-

tas sit virium, aut saltem in pauca quantitate.

Vnguentum popul. ad tempora languentis, vel Oxyrhod. Valentiora hoc modo, Rec. aquæ nymph. suc. lact. ana lib. ÷ aqu. ros. vncias i. v. aceti ros. vnc. i. m.

Balnea in brachijs, & pedibus ex decoctio olei ingredientium in stillatitia superius annotata in brachijs, & pedibus.

Experti sunt etiam pepones aquaticæ. in ipso capite.

Ad Lethargum remedia

Sectio venæ mediæ, vel ratiōe sanguinis, vel inflammationis, tamen.

Clystere præmisso ex diaph. diacat. vel hoc modo, Rec. hier. picr. vnciā ÷ cass. tr. vnc. ÷ ol. amygd. dul. & mel. ros. ana vnc. iij. m.

Syr. de inf. ros. de suc. borag. & rhodom. ex zac. ana vnciam ÷ Aqu. borag. vel melis. vel beto. vnc. iij.

In tertia die secunda est vena cephal. sinistri lateris, & postea

Medicamentum in forma pillul. i. ex pil. cocc. arab. de agar. & rhab. vig si aderit febris in ætate maxime inuenili, cumque etiā pill. fact. potest fieri massa ex succ. ros. pers. mox apozema. Rec. sy. de inf. ros. pers. ex cum aq. beto. & melis. syr. quoque addi preest de g. inf. ros. rub.

Quod

Quod si deglutire has non potest, sic in
for. potabili hoc modo, Rec. fl. cor. p. i. stęcha
dos, sampf. beto. ana p. i. agar. troc. sine sale
gem. dr. i. ÷ fiat d. in aqua beto. in col. dis.
syr. quinque inf. ros. pers. vnc. v. de 9. inf. vnc.
ij. m. & fiat p.

Postea abrafo capite fofus fiat ex his, Rec.
Anod. omnium ana p. i. dec. in suf. quant.
aqu. bet. & spongijs vtitor, & absterge in fi
nem caput, deinde pannos madefactos in
ol. com. & amygd. dulcium calidos appone
parti affe&æ per duos, dies & ipso eodem
tempore optime fieri possunt in fronte fofus.

Oxyrhod. hoc modo, Rec. ol. ros. & comm.
ana vnc. iij. aqu. ros. lib. i. acet. ros. vnc. iij. m.
Sternutatoria.

Rec. pulu. nigel. euph. piper. cast. ana dr. ij.
fiat pupatella, quæ immittatur intra nares.

Eodem tempore propina Syr. ad confir
mandum cerebrum, & discutiendam matē
riam in ipso.

Rec. syr. de inf. ros. rub. incompl. syr. de
stęch. iux art. ana vnc. ÷ pulu. castor. &
conf. diambæ ana dra. ÷ m.

Possumus quoque vti theriaca ad dra. i. cū
aqu. bet. vel vtitor dissol. cum suc. rutæ ad le
niendum.

Vn&iones circa primas vertebra parabi
ex ol. nuc. mosc. ex lachr. & balsam. videlicet
Rec. ol. nuc. mosc. ex lachr. & bals. ana dr. ÷,
ol. amygd. dulc. vnc. ÷ m.

Hinc ad duos dies catuli lactātes per medium incisi admonendi mane, & sero supra caput: quod postea abluatur ol. chamęm. priuatim.

Interim sternutatoria, & vnctiōes non intermittantur.

Galli item admouendi vel quater interdum eodem modo, quo catelli.

Capilli euellendi ad apertionem pororum, & discussionem superfluatorum.

Perdurāte malo Embrochæ, Rec. chamęm. meliol. fenigr. sem. lini, sampf. beto. serpil. stęchad. & ros. in compl. an. p. i. bull. in lib. v. aq. beto. ad consumpt. tertię partis, & facta colat. seruetur pro stillicidio, quo vtimur, & calido fotu per spongas

Cucurbitulę scarificatę

Fotus ex suc. betę, sampf. mercur. beton. cum Agar. quę omnia decoq; hauriat is nari-bus, postmodũ astringendo nares remoretur.

Masticatoria ex semine sinapis, nasturt. cum melle ad vnc. ij. detineantur sub palato, vel alio modo vtimur masticatorijs cũ prædictis, & pyretro, quę expurgant optime cerebrum.

Hirudines in venis sedis, & ligaturę, & cauteria circa secundam, & tertiam vertebram cervicis

Postremo vtantur partes cerebri exteriores cũ sartagine, vel cum vesicatoriis ad fustigam coronalem. qualia sunt pulu. cartha-

mi, & seminis sinap. cum melle, vel cum aceto acerrimo. Vel fiat cauteriolum ferro ignito ad futuram coronalem.

Ad Vertiginem per consensum remedia

Sectio basilicæ dexteri cubiti.

Syr. de oxym. simp. & rhodom. ex sacch. cum aqua beton. & cichor.

Medicam. Rec. Agar. sine fale gem. dr. iv. fl. cor. p. i. senæ vnc. ÷ fiat d. in aqua beton. & in col. diss. sy de suc. viol. vel mann. vnci. iv. Rhab. sine spica dra. i. ÷ inf. in vnc. iij. succ. ros. pers. non col. diaph. vnc. ÷ m.

Cauteria in crure dextero externe, & statim decoctum lig. sancti cum sarza, Rec. lig. sancti, & rad. sarzæ minut. incisæ ana vnc. ij. inf. in 6. lib. aque font. s. d. s. a. ad conf. tertiz par. aquæ. Adde sen. or. cum follic. vnc. i fl. ~~stech. samp. beto.~~ borag. buglos. cichor. sumiter. & lupul. ana p. i. semin. pæoniæ m. ÷ f. col. seruetur pro syr. cuius dosis sit lib. ÷ exhibe calidum mane, & prouoca sudorem.

Aqua sit huiusmodi, Rec. lig. sancti, & sarzæ ana vnc. i. fiat deco. modo, & tempore indicatis in xv. lib. ad conf. tertiz partis.

Licet addis sub finem coriand. præp. vnc. ÷ cinnam dr. ii.

Pillulæ mastich. post cibum ad dr. i. Vel syr. de stæch. & de inf. ros. & endiu. cū diâbra, vel cum electuario pliris archonton mane

Hinc ad duos dies catuli lactātes per medium incisi admonendi mane, & sero supra caput: quod postea abluatur ol. chamęm. priuatim.

Interim sternutatoria, & vnciones non intermittantur.

Galli item admouendi vel quater interdium eodem modo, quo catelli.

Capilli euellendi ad apertionem pororum, & discussionem superfluum.

Perdurāte malo Embrochę, Rec. chamęm. meliol. fenigr. sem. lini, sampf. beto. serpil. stęchad. & ros. in compl. an. p. i. bull. in lib. v. aq. beto. ad consumpt. tertię partis, & facta collat. seruetur pro stillicidio, quo vtimur, & calido fotu per spongas

Cucurbitulę scarificatę

Fotus ex suc. betę, sampf. mercur. beton. cum Agar. quę omnia decoq; hauriat is naris, postmodũ astringendo nares remoretur.

Masticatoria ex semine sinapis, nasturt. cum melle ad vnc. ij. detineantur sub palato, vel alio modo vtimur masticatorijs cũ prædictis, & pyretro, quę expurgant optime cerebrum.

Hirudines in venis sedis, & ligaturę, & cauteria circa secundam, & tertiam vertebra m. ceruicis

Postremo vtantur partes cerebri exteriores cũ sartagine, vel cum veficatoriis ad furorem coronalem. qualia sunt pulu. cartha-

mi, & seminis sinap. cum melle, vel cum aceto acerrimo. Vel fiat cauteriolum ferro ignito ad futuram coronalem.

Ad Vertiginem per consensum remedia

Sectio basilicæ dexteri cubiti.

Syr. de oxym. simp. & rhodom. ex sacch. cum aqua beton. & cichor.

Medicam. Rec. Agar. sine sale gem. dr. iv. fl. cor. p. i. senæ vnc. ÷ fiat d. in aqua beton. & in col. diss. sy de suc. viol. vel mann. vnci. iv. Rhab. sine spica dra. i. ÷ inf. in vnc. iij. succ. ros. pers. non col. diaph. vnc. ÷ m.

Cauteria in crure dextero externe, & statim decoctum lig. sancti cum sarza, Rec. lig. sancti, & rad. sarzæ minut. incisæ ana vnc. ij. inf. in 6. lib. aque font. f. d. s. a. ad cons. tertiæ par. aquæ. Adde sen. or. cum follic. vnc. i fl. stæch. samp. beto. borag. buglos cichor. sumiter. & lupul. ana p. i. semin præoniæ m. ÷ f. col. seruetur pro syr. cuius dosis sit lib. ÷ exhibe calidum mane, & prouoca sudorem.

Aqua sit huiusmodi, Rec. lig. sancti, & sarzæ ana vnc. i. fiat deco. modo, & tempore indicatis in xv. lib. ad cons. tertiæ partis.

Licet addis sub finem coriand. præp. vnc. ÷ cinnam dr. ii.

Pillulæ mastich. post cibum ad dr. i. Vel syr. de stæch. & de inf. ros. & endiu. cū diābra, vel cum electuario pliris archonton mane

hyeme oxym. sic scyllit.

Ad Vertiginem per essentiam

S Omnis brevis esto, talis & motus.
 Sectio venæ mediæ dexteri cubiti.

Pharm. Rec. pill. cocc. Arab. & Agar. tro-
 chis. ana dra i. form. pill. 5. cum suc. ros. rubr.

In forma potus; Rec. syr. de inf. ros. rubr.
 & de suc. ros. pers. ana vncias iij. cum aqua
 betonicæ m.

Cauterium in sinistro brachio.

Decoctum lig. indi sine sarza; quo assump-
 to iterū purgetur corpus, m. decocto ligni sit
 ad vncias iij. corticis vero ad vnc. i.

Balnea. vt imur sudatorio Triculi, & Sulpha-
 taria, quæ sūt Puteolis. his vero nō cōtingēti-
 bus, Rec. sulph. cū ros. incom. coniectis in
 ignemumat homo fumū ex illis, verum o-
 perto capite lenita multo prius aluo.

Emplastū in futura coron. quod R. sem n.
 pron. rad. beto. macis. cort. thuris, mastich.
 maior. rosar. incom. zinzib. ana vnc. ÷ ca-
 rioph. & gra. parad. dr. i. cucub. dr. ÷ terebin.
 ad suf. deduc ad emplastrum in tela exteriori
 riparte pone viscus quercinum.

Interpellatis vicibus pillulæ sine custod.
 quales sunt pill. arab. & mastich. assumendæ
 post cēnam.

lisdem temporibus dato myrabolanos cō-
 ditos, primum incipiens 2 citrinis, secundo

à cheb. tertio ab embl. quarto dato pill. superius annotatas. Et si myrobolani conditi nō extēt exhibeto syr. de suc. ros. in compl. cū diambra, vel cum diamoscho dulci, vel plir. archon. sine moscho.

Vnctiōes ceruicis ex oleo nard. de spica, de costo irino de hyperico, nucis mosc. vel balsami.

Vtrisque temporibus affige empl. in forma circulari perlitum ex mastiche.

Ad Cephalagiam

Primū ænemata ex hiera piera, & melle despumato, ex hiera logod. ana vnciā ÷ cum oleo chamæmelino, vel Chamæmeli decoctione.

Friciones asperæ; mox cucurbitulæ sine scarificatione in causa calida.

Oxyrhod. ex aqu. ros. & aceto ros. ex causa vero frigida ex oleo chamæm. & oleo beton. cum aceto ros. tale siquidem expellit frigiditatem.

In intemperie calida syr. de inf. ros. de nymphæa, & de papau. cæ nato iam homini exhibeto.

In causa frigida syr. de beton. de inf. ros. de stachade: diābra cū pulvere semin. coriand. quæ omnia misceri possunt tabellis hoc modo,

Zacch. rosar. rubr. in compl. vnc. iii. confect.

sect. diambra pulu. cordial. præpar. ana dr. i. feminis pzon. dra. ij. sacch. albi dissol. in aqua beton. m. fiat electuar.

Sacculi circa futuram coron. Rec. samp. suchi, ros. incompl. & beton. ana drach. i. ÷ mastich. & cort. thur. ana dr. ij. carioph. dr. ÷ sc. m. pzon. & r. i. omnia ruditer conterantur, & fiat duo sacculi

Si fuerit hemicrania præsehte humore in parte dextera vicio iecoris, vel in sinistra causa alienis;

Seçtio venæ in parte dextera iecorariæ, in sinistra mediæ siue communis, Galen. de sanguinis missioe cap. 14. postea syr. de inf. ros. de succo cichor. & borag. cum aqua beton. mane, per tres dies offer. postea sectio altera venæ cephalicæ eiusdem lateris.

Medicamentū purgans hoc esto, Rec. seña orient cum follic. & Agar. ana dra i. fiat decoctio in aqua beton. in col. diss. sy. ros. solut. vnc. iij de 9 inf. ros. rubr. vnc. iij. Diaphæn. vnciam ÷ postea

Emplast. ex mastiche cum lacte muliebri temporibus affigendum. Sed dolore affligente magis vtere cum opio, cum syr. de papau. de nymph. cum requie; Nic. vel Philon. Roma. sed his tamen caute

Irrigato præterea locum succo lactucæ, & solani, si materia sit calida.

Vteris etiam cucurbitulis inscarificatis.

Ad Dolorem totius cerebri

SI fuerint presentibus humoribus dolores, sectio iecorariæ. Si fuerit vitium a lue venerea cura causam.

Medicamentum expurgans interne corpus.

Stillicidium ex decoct. ros. viol. borag. florum nymph. lactucæ, solani hepaticæ in suff. quantitate aquæ, circa futuram coronalem, fiant embrochiæ derafo capite: deinde appone pannos linteos ex oleo viol. tum ad dictam futuram, tum ad frontem: mox

Cū oxyrhodino misce quod Rec. succorū lactu. & solani ana lib. ÷ aquæ ros. & nymph. ana vncias iiij. olei ros. & olei semin. papau. ana vnc. iii. acet. ros. vnc. i. m.

Linimentum ad vtraque tempora ex vnguento populeo.

In materia frigida stillicidia sint hæc, Rec. 4 Anody. flor. stæchad. sampsu. beton. serpil. ros. rubr. ana m. i. lauendulæ p. i. galangæ dr. ij. decoq; in suff. aqua beton. calidis vtitor, postea pannis madefactis in oleo chamæmel. fove partem.

Syr. propinentur calidi, vt sy. de beton. de de inf ros. cum diambra, diamoscho, & pliris archondon.

Olea quoque calida ad tempora, & circa cervicem, qualia sunt de nuç. mosch. & bal-
sami

sami de carabe, deque carioph. destillata.

Empl. ad futuras, vt ante diximus in curatione vertiginis.

Sudatorium Trituli, & Sulphataria postremo solent accommoda esse sauo depellendo dolori.

Cauteriolum brachio sinistro. quod si fuerit diu firmatus dolor, vt fiat iam cephalca, frugiferum erit decoctum ligni Indici, de quo supra.

Ad Melancholiam

PRima die sectio venæ basil. dexteri cub. sed prius aluo lenita pro clystere.

Syr. de papau. de nymph. & de inf. ros. cū aqua nymph.

Catharticum paretur ex pill. de lapide Lazuli, de sumit. & Agar. an. dr. ii. form. pillu. cum suc. ros. rubr. postea vero

Potus ex syr. de Domini Augustini, & syr. de suc. viol. ana vnc. ij. aquæ nymph. quod suff. m.

Potus ad 9. dies ex aqua lactu. destil. & stillicidium ad caput ex frigidis.

Balnea aquæ tepidæ dulcia dicta præmissa alui mollitione.

Emplastrum ab his affigendum est ventriculo.

Ioannis de Prochyta, vel totus ex absynth. quod ytrumque applicitum retineri potest

est in balneo, ne ventriculus aqua dilaxetur
in balneis duratio 9. dies hora vna.

Aegrotans si femina sit, vterus in balneo
præcludendus est.

Postquam balneo factum est satis, omni-
bus modis humecta corpus præcepto Galeni
3. de loc. aff. & primum lacte asinino ad 40.
dies.

Incoquendæ pullis radices borag. bugl. &
endiu. Hirudines affigendæ venis infimæ se-
dis.

Ad Melancholiam hypochondriacam

Primum sectio basil. dexteri cubiti lenita
prius aluo.

Syr. de borag. rhodom. ex zaccharo, de
radic. Gentilis sine aceto cum aqua melif-
sz.

Medicamentum purg. Rec. Agar. troch.
dr. i. flo. cord. p. i. fennæ or. cum follic vnc. ÷
fiat decoctio in aqua meliss. & in colat. suffi-
ciēti dis. Rhab. opt. vigo. dr. i. inf. in parte præ-
dictæ deco. ad suff. syr. de quique inf. ros. pers.
& syr. Domini Augustini ana vnc. ii. Diaph.
vnc. ÷ & cum colatura fiat potus.

Decoctum chinæ, Rec. chinæ præp. secun-
dum art. vnc. ÷ inf. in aqua son. ad lib. ii. per
24. horas: redde sub fine decoctum ad dimi-
dium affusæ aquæ, fiat cola. pro syr. de quo po-
tes in dies calidam lib. ÷

Aqua

fami de carabe, deque carioph. destillata.

Empl. ad futuras, vt ante diximus in curatione vertiginis.

Sudatorium Trituli, & Sulphataria postremo solent accommoda esse sauo depellendo dolori.

Cauteriolum brachio sinistro. quod si fuerit diu firmatus dolor, vt fiat iam cephalca, frugiferum erit decoctum ligni Indici, de quo supra.

Ad Melancholiam

PRima die sectio venæ basil. dexteri cub. sed prius aluo lenita pro clystere.

Syr. de papau. de nymph. & de inf. ros. cū aqua nymph.

Catharticum paretur ex pill. de lapide Lazuli, de sumit. & Agar. an. dr. ii. form. pillu. cum suc. ros. rubr. postea vero

Potus ex syr. de Domini Augustini, & syr. de suc. viol. ana vnc. ij. aquæ nymph. quod suff. m.

Potus ad 9. dies ex aqua lactu. destil. & stillicidium ad caput ex frigidis.

Balnea aquæ tepidæ dulcia dicta præmissa alui mollitione.

Emplastrum ab his affigendum est ventriculo.

Ioannis de Prochyta, vel totus ex absynth. quod utrumque applicitum retineri potest

est in balneo, ne ventriculus aqua dilaxetur
in balneis duratio 9. dies hora vna.

Aegrotans si femina sit, vterus in balneo
præcludendus est.

Postquam balneo factum est satis, omni-
bus modis humecta corpus præcepto Galeni
3. de loc. aff. & primum lacte asinino ad 40.
dies.

Incoquendæ pullis radices borag. bugl. &
endiu. Hirudines affigendæ venis infimæ se-
dis.

Ad Melancholiam hypochondriacam

Primum sectio basil. dexteri cubiti lenita
prius aluo.

Syr. de borag. rhodom. ex zaccharo, de
radic. Gentilis sine aceto cum aqua melif-
sz.

Medicamentum purg. Rec. Agar. troch.
dr. i. flo. cord. p. i. sennæ or. cum follic vnc. ÷
fiat decoctio in aqua meliss. & in colat. suffi-
ciēti dis. Rhab. opt. vigo. dr. i. inf. in parte præ-
dictæ deco. ad suff. syr. de quique inf. ros. pers.
& syr. Domini Augustini ana vnc. ii. Diaph.
vnc. ÷ & cum colatura fiat potus.

Decoctum chinæ, Rec. chinæ præp. secun-
dum art. vnc. ÷ inf. in aqua fon. ad lib. ii. per
24. horas: redde sub fine decoctum ad dimi-
dium affusæ aquæ, fiat cola. pro syr. de quo po-
tes in dies calidam lib. ÷.

Aqua

Aqua ex eadem radice, Rec. Chinæ vnciā ÷ infunde in viii. lib. aq. fontis decoctionem producito ad conf. tertię partis aquę coletur & seruetur pro potu.

Syr. eductius ex senā orient. Tertio quoque die ad vncias ii. vel quod satius est, syr. magistralis, qui Rec. Chinæ præpar. vnc. ii. inf. in lib. vi. aquę fontis per 24. horas deco. ad consumpt. dimidię aquę. inter hæc adde flor. borag. viol. sumit. lupul. endiu. fumar. sco lopendrij, seu cetrac. capill. vener. stæchad. sampsu. beton. cichor. ana p. i. foliorum sennæ ori. vnc. i. glycyrrh. modicum cōtusæ vnc. ÷ sem. anys. & fenic. ana dr. i. absynt. p. ÷ rhab. vigo. subt. puluer. dr. ii. fiat col. cum sorti express. quę aromatizētur imposito ligno aloes cum santal. omnibus ad dra. ii. denique adde zacch. ad suffi. vt fiat syr. longus de quo poter ægrotus vnc. iiii. in dies 22. mane calide.

Potus aquę decoctæ Chinæ.

Sanguinis emissio ex vena saluatella infirmæ manus sinistræ, & affige venis sedis hiru. dines quarto post die.

Clysteres incocti capitis veruenis, Rec. caput veruecis numero i. florum chamæmeli pariet. mercur. ana p. i. fenigr. p. ii. caricæ succulentas numero 12. sem. anysi, & cumini ana dra. i ÷ in fine decoctionis senæ ori. cum sollic. dra. iii. hi clysteres vsitandi sunt sapè addito melle despu. & zaccharo rubro ana vaciis iii. quandoque bis plusculi s die
bus

bus aluo sicciore, postea vero facta vacuatione illinc abdomen oleo de absynth destillato, &c.

Diasena assumpta ex vino odorato, vel iulep. de cinnam. ad dra. i. cum aqua de cinnam. destillato ad vnc. ii.

Ad Epilepsiam

Epilepsia, aut per essentiam, aut per consensum, aut ex affectione viscerum, ac raro per consensum ex articulis remotioribus ad cerebrum fit. Galen. lib. 3. de loc. aff. cap. 7.

Futura Epilepsie per essentiam preseruat

Sanguinis emissio de saphena ex utroque pede.

Quoniam habent accessiones suas presertim in plenilunio, tempestiuè occurrunt

Clysteres fortes, Rec. hieræ logad. & Diaphen. ana vnciâ ÷ Agar. troch. & plurimum contriti dr. i. mell. despum. & olei chamæm. ana vncia iii. cum pulli iure

Sy. præparâtes de stæchade, de inf. ros. arid. de beton. & si qui sunt alij.

Medicamentum purgans, Rec. pill. de lap. lazuli, pill. de Agar. troch. pill. Arab. ana dra. ii. form. pill. 7.

Apozema, Rec. syr. Domini Augustini de
no:

nouem inf. ros. rubr. ana vnc. ii. aquæ beton. vnc. iiii. & fiat apoz. à quo postridie eruptorium sinistro brachio.

Icterpollatz pill de hiera sero demittendæ.

Alias vero confectiones diambraz, vel olei cum balsami flauum cum s. r. de inf. ros. incompl. rubrarum.

Emplastrum capitale ad futuram coronalem.

Decoctum ligni Guaiacam imposita chamædri, quam iuam arteticam vocant, & calamento maiore.

Potus ex eodem ligno.

Remedia naturalia sudatorium Trituli, vel sudatorium Sancti Germani in crypta Agnani, vel aer medicatus Sulphatariz.

Ad præsentem Epilepsiam

Clyster, Rec. vt retro dictum est. sed potiores, sunt balani, seu suppositoria.

Rec. hyerz Logodion, pulu. hieræ Galeni Agar. troch. ana dr. ii. pulpæ colocynt. dr. ÷ sal. gem. dr. ii. mell. desp. ad suff. & fiat supp. cum filo tenui prolixiusculo.

Friciones in tibijs, & sæmoribus latè. si femella sit, etiam abstrahendi sunt pili de pube, & affigendæ tibijs tria dolorifica comæmenta.

1 Cucurbitulæ torrida cum flamma quatenus persentiatur fructuosus dolor.

2 Ali-

Aliquot sunt accendendæ ceræ facule
e quibus obliq; demissæ guttulę pingues spa-
ulas exustulent ad euocandum huc humo-
rem exitialem.

Ligaturæ ad extremos arctus arctissimæ.

Sternutatoria ex pip. nigro nigella, eu-
horb ana dra. ii. in tela rara paretur sternal-
atorium, vel intrudatur huc puluis ptarmi-
us.

Lenitiones ad tempora ex ruta cum mi-
hid. calido.

Vnctiones per totam spinalem medul. cū
is oleis, Rec. ole. costini irini, de hype-
ric. de spica de lumbr. ana dr. ÷ ol. nuc. mos-
chatae dr. i. m.

Ore detineantur hi syr. Rec. sy. de stæch. de
inf. ros. ana vnciā i ÷ pulu. castor. dra. i. m. si-
ne aqua.

Frictiones sunt faciendæ brachijs.

Os aperiendum violenter clauē chirurgi-
ca, vel communi.

Ad Epilepsiam per consensum

HÆc vel ventriculi, vel totius corpo-
ris vitio fit.

Ad summam enim agitur hoc, vel illo
consentiente, videlicet vtero, semine.

Sy. Rec. de inf. ros. oxym. simp. rhodomeli.
ex zaccharo ana vncia ÷ aq. beto. vncias iii.
misce.

Medicamentum purg. Rec. pill. de hiera-
pill.

pill. mastiches, & cocciarum ana dr. ii. Agar.
troch. dr. i. cum cathart. ros. form. pill. 7.

Apozema ex syr. Domini Augustini, sy. de
nouem inf. ros. rubr. cum aqua cord. ali.

Friktiones ad ceruices, & dorsi spinam,
e nuce myristica bis, aut ter hebdom. facien-
da mane ante cibum.

Granum mastiches assumendum, & man-
dendum.

Oxym. stillatitium.

Emplastrum vtriusq; Gall. pro stomacho
præmissio vsu decoctionis ligni sancti, quæad-
modum ante descripsi.

Balnea succellarij ad ventriculum. Quod
si non est naturale, sed exterum, arte parabi-
tur ad hunc modum.

Rec. cort. citrii, & foliorum ipsius, absyn-
thii vtriusque menthæ, & ros. rubr. ana p. ij.
carioph. dra. i. cinnam. dra. ii. simul bull. in
in sufficienti quantitate vini rubri generosi
intinctis spongiis fove ventriculum.

Quem confirmabis postmodum

Rec. pelu. vtriusque menthæ, & ros. rubr.
ana dra. ii. garioph. dra. i. cinnam. & masti-
ch. ana dra. i. cum oleo mastich. & cera pauca
fiat linimentum.

Confectio diamoschi cum vino, & myro-
bal. conditis cheb. citr. aut embl. si mor-
bus quidem per essentiã sit, à cæna. Si vero sit
per ventriculi consensum mane te manet
ante prandium ingerendum, per consen-
sum

sum accidat insultus vteri carentis beneficio
menſium in ſæminis, aut ſeminis effumantis
in viris, tum

Cauterium infigito parti cruris internæ,
ſeu maus externæ, vt moris eſt Vrbe Roma.

Ad dolorem dentium

IN pueris illinitio gingiuarum ex cerebro
leporino, & ſacch. & eas bone confrices
digito: deſectu cerebri leporis vtaris pulli
gallinacei interempti in vita, cuius cerebro
mox immiſce ſaccharum.

In oſiniſce ſyr. de viol. & de cann.

Dens Lupi adiuuat à proprietate fricatus
ad dentes, vel candela ceræ albæ, quæ manſa,
aut ore verſata ſedat dolorem.

In Adultis medicamenta aſtringentia, &
conglutinantia, qualia ſunt lauatoria, quæ

Rec. ligni indici decoq; ad conſumpt. ter-
tiæ partis. adde aluminis rochæ aduſti drach.
iij. carioph. dra. i. ÷ balauſt malic. ana p. i. lē-
tiſci, & ſalui ana p. i. ÷ ſeruetur colatura pro
lauacro.

Vnguenta, Rec. Aloes præpar. dra. i. boli
arm. orient. corall. omnium, ſanguinis dra-
con. maſtiçh. ana dr. i. ÷ rhodom. & ſy. myrt.
ana part. æqual. cum quibus admiſce pul-
ueres, & ſecundum art. ad modum conſeruæ
diſtentum appone noctu ſuper gingiuas, &
deſuper lintæum ſubtile.

H

Bal-

Balneum Succellarij.

Caricis assis, & apertis insperge saccharū iterum calfactas appone.

Olea distillata ex carioph.

Philonium persicum ad stuporem inducendum, sed cautè opij causa.

Venæ sectio ad reuulsionem.

Causa existente interna acetum scyllitic. calidum, vel radix pyrethri topica.

Lauacrum decocti in vino hoc modo, Re. carioph. & piper. ana dr. $\frac{1}{2}$ ros. incompl. & saluie an. p. i malicor. & balauft. & lentisci an. p. i. alum. rochæ vsti dra. ii. bull. in vino generoso, & vtitor.

Corroborantia, vt diambra purgato corpore, & sanguine iam emissio.

Remedia ad dentes albificandos Rec. malic. præpar. in aqua ros. dra i. bull. in vino rubro. adde in decoctione asari, acori, & corall. rubr. mastich. boli arm. or. ana dra. i $\frac{1}{2}$ & facta decoctione vtere.

Deinde accipe pulu. conchyl. adustorum tenuissime tritorum pone in cuspide radicis maluarum, & affrica bene.

Vel aqua destillata, Rec. malic. balauft. conorum cupres. Gallar. plantag & portul. aca p. i pulu. terræ sigill. boli arm. orient. corall. omnium santal. omnium, & sanguinis drac. ana dra. iii. macerentur dies tres in aqua plantag ad lib. vi. destill. in alembico vitreo: vtere ad abstergendas gingiuas dolore vexatas.

Apo;

Apoplexia curatio

N Vm viuat æger, sic exploratur. si inficiat
speculum spiritus, vel si mouetur pelli-
cula cæpæ in ore, vel si mouetur aqua in va-
se imposito supra vmbilicum.

Si corpus erit validum, secerur vena inter
ad vnciolas duas sanguinis, quæ si cõfert,
petatur præuia protestatione . nam assumi-
tur languens fermè pro mortuo.

Frictiones, ligaturæ, cucurbitulæ scarificat.
Aduratur caput ignito ferramento.

Æger moueatur potius quam iaceat.
Non sentienti fiat cauterium in sutura sagitt-
ali, vel in collo, quod est minus periculo-
sum.

Vesicatoria in supremis scoptulis, idest spa-
tulis, hoc modo, Rec. pulu. canthar. & semi.
sinap. ana dr. ii. cum aceto acerrimo, & pau-
co melle, sed primum in loco illo admini-
strentur cucurbitæ cum scarificatu. Deinde
dicta vesicatoria, & sinapismi siue scarifi-
cationes in sutura coron. & sagitt. hoc modo,
Rec. sem. sinap. cum melle cum aceto parti
imponatur.

Sternutatoria quæ supra.

Ad Catarrhum

C Atarrhus, vel Raucedo, vel Grauedo, vel Coriza tertio de causis sympt. cap. 4 & à Schola Salernit. priuatis versibus facile distinguuntur, Raucedo à causa calida, vel frigida; Grauedo vero cum est à causa calida febris, & capitis dolor in promptu sunt. tunc fiat:

Venæ sectio dextri cubiti interni.

Lambitium ex syr. de cann. granat. dulc. viol. iuiub. postera vero die fiat

Sectio cephalicæ: postea.

Syr. de cann. & de infros. ana vnc. i. aquæ cichor. vnc. iii. m.

Tabellæ ex diacodio.

Friktiones per totum corpus, &

Cucurbitulæ sine scarificatu.

Clysteres trahentes à cerebro ex medicamentis hisce compositis, vt ex hierapicra, ex oleo viol. melle viol. & castorij puluisculo.

Gargarismi refrigerâtes, humectantes, abstergentes, Rec. malæ, viol. hordei corticibus integris an pugil. i. passul. sine granis carfc. pingui. & iuiub. ana pugill. i. bulliant in sufficienti quantitate aquæ fontis, & factæ colat. sumitur libra i. cui addatur syr. viol. & iuiub. quæ græci zuzipha dixerunt.

Fomenta ad nares ex decoctione hordei. Secundo ex his, quæ diximus in gargarismis addita in illis multa portione olei amygd. dul. recens.

Li.

Linamentum intra nares ex oleo amygd. dulc. recenti, & calido. Sed his omnibus parum iuuantibus vtendum est medicamine ex purgante simul, & refrigerante, quale est syr. de suc. viol. & syr. ros. solut. & de nouem inf. ros. rubr.

In materia vero frigida

Clyst. calidiores, Rec. Diaph. & hieræ picræ ana vnc. ÷ Agar. troch. tenuissime contriti drach. i. mellis despum. & ol. chamæm. ana vnc. ii. cum decoctione communi m.

Frictiones, &

Cucurbitulæ.

Syr. de stæch. & de inf. ros. & iur. art. eticæ ana vnc. ÷ aqua beton. vnc. iii.

Tabellæ. Rec. zacchari ros. rubr. vnc. iiii. conf. diambæ, pulu. corall. præpar. ana dr. i. sem. præon. dra. ÷ zacchari albi dissoluti in aquæ beton. quod suff. fiant tab. quæ teneantur in ore.

Suffumigia circa nares ex decoctione sampsuc. stæchad. beton. caric. ping. & passul. ana pugil. i. bull. in suff. portione aquæ beton. de qua sume lib. i. in quam adijcito mell. ros. vnc. iiii. quo etiam vtitor pro gargarismo.

Vtimur præterea pulegio in pannolino, vel serico, cum pauca sampsuchi portione, fiat odoramentum.

Sacculus in sutura coronali. R. 4. Anodyn. sampsuchi, beton. florum stæchad. & ros. in-

compl.ana pugill.i.ex omnibus ruditer triti
fiat facculus sericus ad expurgandum cere
brum.

Mistura,maxime si subest tussis,de loch de
pino,& diacodio teneatur in ore.Sic quoque
pillulæ dictæ bechicæ sub lingua teneantur.

Rec. Amyli,dragacanthæ ana vnc. ÷ cum
ol.amygd.dulc.recēter expresso sufficienti.m.

Item vtendum est manna dissoluta in aqu.
hordei calida,vt fieri solet in morbo gallico
cum materia est rebellis naturæ : tunc cure
tur tanquam morbus Gallicus, cum decoct.
spartæ,siue ligni sancti.

Si aderit periculum destillationis, Caute
rium in brachio sinistro,& vsus sudatorij.

Ad Anginam

Distinguendum num sit vera, vel quæ est
ex luxatione,quæ dicitur la Serra, quæ
visitur in pueris:quæ curatur ab ostetricibus
officio manus,quo facto agglutinatur empla
strum capitale ad locum affectum,vel ad su
turam coronalem inspergatur-

Puluisculus , qui Rec. ros.rubr.incompl.
cort.thuris,mastich.sem.pæon.carioph.sam
psuchi ana part.æqual: prius trita mox lacte
commassentur,& capiti imponatur mixtura.

Vsus balsami flauī,cum inf.ros.rubr.

Syr.valentes,vsu lenitionis sunt de cann.
de granat.dulc.

San

anguinis emissio statim facienda libera-
si ferant vires. nempe morbus est acutus.
lenita prius aluo.

lyst. ex cassia ol. viol. rhodom. & diacath.
enæ sectio repetita in dextro cubito in-
o.

yr. de suc. borag & violarum, cum aqua
ill. vener.

ualescente morbo, vel perdurante ter-
ecetur vena cephalica dextri cubiti. Si
non cedit, quarto vena pertundatur, quæ
iacet linguæ.

nunctiones ex oleo amygd. dulc. in collo
sertim anteriore.

argarismi. Rec zacch. ros. rubr. vnc. ii. diss.
ib. ii. aqu. hord. factæ colaturæ adde aceti
vnc. ii. fiat garg.

assumendus in dies gargarism. fortis, qui
syr. de inf. ros. arid. & de portul. ana vnc.
aqu. portul. & aquæ plantaginis, ana lib. i.
ros. vnc. ii.

omenta ex 4. anody. decoctis in aqua.
re per spongas. Postea inunge particu-
butyro, & oleo amygd. dul.

ambitiuū ex manna diss. in aqua hordei:
e vero manna. sy. est viol. vel granat. dul.
le cann. ana partes æqu.

Tertia die gargarismi valentioris virtutis
caricarum ping. passul. exacinarum
ib. capill. vener. maluæ, & viol. ana pugil.
ill. in suff. quantitate aqu. fontis, in lib. ii.

diffolue rhodom. ex zacchar. vnc. ii. fiat gargar in statu morbi.

His medicamentum succedit lenit. quale est de sy suc. viol. de infus. ros. pers. aut manna, aut Cassia, quod si deglutire non detur:

Empl. parte externa. Rec. pulp. Cass. recen. extr. per fet. vnc i. æsypi humidæ vnc. — nidi hirūd. dr. iii. fiat empl. pro gula, quod extendatur in tela angusta. tenendum per duos dies, in quo remiscenda est posca cum cineribus hirund. ad dra. iii

Gargar. ex lact. caprino, vel asinino tepido. Utimur etiam moris, quæ det oportunitas temporis, & perroselinis frictis cū ol. amygdul. in statu tamen.

Pulvis item benefacit stercoreis Canis cū modico zaccharo, fistula insufflatus ad fauces interiores.

Post statum deueniendum est ad exiccationem partis affectæ.

Ideo Rec. pulu. carabes dr. ii. iniice in carbones, cuius suffitum excipiat ore ad aperto decumbens.

Cucurbitulæ scarificatæ.

Communis hæc curatio, tum legitimæ, tum illegitimæ anginæ.

Ad Ophthalmiam

V Enę sectio in ophthalmiâ solennis est, & ut plurimum facitatur dextero cubito,

bito, deinde repellitur defluxus in oculū panis madefactis ex lacte femellæ, & aqu. ros. alb. lenita prius aluo per clysterem ex Cass. ol. viol. & melle viol.

Postridie iterū fiat venę sectio alterius brachij cephalicæ.

Sy. de inf. ros. de cich. & de endi. cū aq. sēn.

Est & reprimens medicamentū albumen oui recentis bene agitatū in aqu. ros. albarum, quod cum resederit spinosos retūdet oculi dolores.

Tertia die vteris compositiore oui remedio quod Rec. album oui quassatū in mort. cum aqu. ros. & sēnic. pauca. in hanc infunde pupatellam, qua conclusum sit sacch. ros. granulosū & tuthia præpar. ana dr. i. exprime intra palpebras oculi.

Quarta die purga corpus pharmaco, quod Rec. florum cord. pugill. i. Agar. troch. dr. i. fiat decoct. in aqu. sēnic. in qua per colata diff. syr. ros. solut. vnc. iii. zacchari viol. vel mannae ele. corp. & syr. de nouem inf. ros. rubrar. vnc. ii. mane offer. in potum.

In forma vero boli, Rec. pulpæ cass. rec. extr. per set. vnc. i. conf. Hamec. vn. ÷ agar. troch. dr. i. cum sacch. suffic. misce. Quod si crassior hæreat corpore materia pillulare catharticum, Rec. pill. lucis pill. arab. & agar. troch. ana dr. i. cum aqu. sēnic. form. pillulæ.

Vtimur etiam butyro recenti cum tuthia loco ex aqu. ros. alb. quo illinātur oculorum
cum

tum anguli tum palpebræ .

In progressu valet aqu. chælid. euphras, & fœnic. destill. præsertim cū ophthalmia peruenit ex sāguine. quum vero aliunde laudat Gal. fœnū gr. decoctū in aq. fœniculi prius ex puluere bene deterfi.

Si diutis ophthalmia perduret testula siue osse sepia tempestiuè licebit vti cum tuthia præpar. & zacch. cand. ana partib. æquis.

Vtimur quoque aqu. sociali, cuius descrip. tradit Altimarus in cap. de suffusione.

Hirudines ad posteriorem aurium partem licet refragari videatur Hippocr. lib. de aere, aquis, & locis.

Canterium collo ficcis in regionibus; in humidis vero brachio defigatur.

Ad dolores aurium

Sectio venæ dextri cubiti, si materia calida sit.

Syr. de inf. ros. de suc. cichor. cum aqua lupul.

Secunda die si dolor fatiget, secetur iterum vena cephalica eiusdem lateris.

In auriculas vero infundatur lac muliebre tepidulum, vel ol. amygd. dulc. vel ol. e luteis ouorum.

Fomenta præpar. ex anod. quæ bull. in ol. applicando per spongas.

Decoct. caue ne subeat in cōchā auriculæ
Quar-

Quarta die medicamentum ex manna, vel syr. viol. dis. in aqu. de. 5. inf. ros. pers. si sit maiuscula febris impone rhabar. & senam.

Perdurante dolore, cataplas. ad auriculas ex farin hord. cū lacte ol. ros. cūque uitellis ouorum in linteo distende.

Adhuc vero progrediente succis vtitor lactucæ, & sim. pulu. castor. insuffla, ne male grauetur cerebrum.

Adipes Coturnicis, vel Vulpis cum saccharo laudatissimæ sunt.

Cum syr. de papau. de nymph. de inf. ros. offerre poteris myroba citrin. & chebul. conditas à cæna: nam valide reprimunt defluxiones, & irruptiones humorum.

Apparente apostemate purgatiuum aliquod medic. illius puris, quale laridū est dulce dilutum ex aqu. ros. nam belle aperit, & digerit. Verum tamen intingatur laridum ol. amygd. dul. & cubet ægrotus eodem latere, quò depurgetur pus.

Marina est concha, Pinna magna dicta, vulgo nostro lana pinna: ab cuius inferiore parte in amplam latitudinem extenditur bisus, idest delicatissima, & mollissima lana, seu lanago serica. Huius modica pars digito conuoluta, & filo dependens intus auriculam anteriorem demittitur: auxilio credita nobili aduersus aurium dolores, & e longinquo trahendi vim habere.

In materia vero frigida syr. de inf. ros. rhod.
dom.

dom. è zaccharo, & oxymeli simplex cum aqua beton.

Pro pharmaco dentur pillulæ cocc. arab. agari. trochi, vel etiam pill. aggreg. cum cathar. ros. vel syr. de stæchad.

Apozema ex syr. ros. pers. & de sy. 9. infus. ros. rubr. cum aqua. beton.

Topica ex ol. amygd. amar. cum pauxillo larido siuillo. Olesu, in quo decocta sit sampsucus sicca hoc modo, Rec. florû chamæm. melil. sænugr. & sem. lini, samps. beton. florû stæchad. ros. incompl. rubr. melis & furs. q. s. duo ex hac mistura sacculi calidi applicandi.

Immittimus quoque modicum corticem raphani hortensis edulis, vel gossypium imbutum odorato moscho.

Item olea de Castor. quod est mirabile, & momentum olei de carioph. destillato.

Ad Suffusionem

Suffusionis quidem species est duplex, incipiens, & confirmata.

Incipiens curatur sanguinis reuulsione ex media dexteri brachij, &

Syr. corrob. & incid. oxym. simpl. compos.

Pillul. arab. cum suc. sænic. m. & fiat massa pro medicamento præcedente mox.

Apoz. ex syr. de inf. ros. rubr. cum manna; vel zaccharo viol. vel syr. ros. sol.

Puluis, Rec. pulu. rutchiæ prepar. zacchari

san.

candi. rosati, & testulæ siue ossis sepie ana dr.
i. in oculos insperge. Eodem tempore vtend-
um est decocto sennigr. senniculi, eupator. &
chælidon. an. part. æqual. fiat lauacrum pro
oculo.

Balneum item naturale, vt baln. senniculi,
quod est Puteolos.

Sed & præscriptis pul. adde viride æris dr.
i. vel Rec. mell. destill. suc. limon. parui eu-
phras. chælid. plantag. an. vn. ÷ ceræ parum
fiat vnguen. immittendum in angulum in-
ternum, & externum.

Aqua socialis ab Altim. de scripta de rosæ
Anglicæ libro.

Syr. de stæchade, de inf. ros. in compl. cum
diambra.

Mirobal. conditi à cæna delibandi inter-
polatis vicibus.

Hirudines affigantur post auriculam affe-
cti loci, vel oppositi.

Cantherium interiori bracchio secundum
oculi rectitudinem.

Decoctum ligni, & spart. pariliæ.

Sudatorium Trituli, vel Sulphataria.

In confirmata ophthalmia fonticulus in-
nocra expilis equinis mane, & vesperi distra-
hendis. Sanies autem vino diluenda, vel in-
sutura coron. cum empl. in serico chermi-
quo.

Parotidarum curatio

Parotides à duab. sunt causis, vel ratione crisis, vt in febr. vel symptomate, vel alia ex causa frigida sine febr. Sic variam recipiunt curationem, quæ sunt videlicet.

Quæ sunt a crisi leniter curantur ad maturationem perductæ. mat. firmata pauca resoluētibus. & si corpus fuerit robustum primo

Secabis venam ex eodem latere, & circa partem affectam.

Ol. amygd. dulc. cum butyro, ol. chamæ. fovebis autem partē affectam 4. anody. quod si prosequitur dolor:

Secabis iterum venam eiusdem lateris cephalicam, & tum adhibe ad partem.

Catapl. quod Rec. far. hordei p. i. lact. caprini, butyri recent. ol. ros. omph. ana vnc. iiii. vitellos ouorum numero duos, micæ panis quantum exigitur: impone parti.

Signis apparentib. concoctionis maturantia, & suppurantia. Rec. malua, althæa. farin. frumēti ana m. ii. caricæ ping. numero 7. panis azyymi, assungia suillæ rancidioris vnc. ii. croci dr. i. omnia reducantur in mortario ad form. emplasti, quod distende in tela in partē affectam accommodandum.

Maturatione perfecta vomica pertundatur, non phlebotomo quidem, aut ferramento frigido, sed ignito.

Si

Si vrgeant symptomata, quæ sunt quidem vt plurimum dolor grauatiuus, durities, & febris comitata: sub hisce casibus emitte bis, imò etiam ter sanguinẽ nedum semel, quippe quod imminet peric. suffocationis. Primo ex vena communi. Secundo ex cephal. eiusdem lateris. Tertio ex vena, quæ subiacet linguæ. interim propina medicamentum purgans secundum humoris peccantis exigentiam.

Facta prius præparat. cum syr. exinde fiat potus.

Quarto anodyn. in hydræleo, & pars illa lenienda axung. gallin. cum ol. amygd. dulc. vel oleo. ros. cum butyro recenti.

Corroborantia cerebri per syr. de inf. ros. diambam, & simil.

Emplast. alias dictum.

Apertio parotidarum quamuis immaturarum non raro leuat, sed eo casu præmitte protestationem, & præmisso pharmaco purga corpus.

Med. purg. ex reb. attrahentibus à capite, sic Rec. Agarici troch. dra. iiii. sennæ cum follic. vnc. i. flor. cord. p. i. decoq. in aqu. beto. diss. in suff. colat. syr. ros. ros. vnc. ii. de nouem inf. ros. rubr. vnc. ii. Diacath. Arna. vnc. ÷ m. fiat potus.

Vel in forma pillulari, Rec. pill. hieræ pill. arab. agar. troch. ana dra. i. form. pill. num. 7. cum cathar. ros.

Apoz. Rec. syr. de nouem inf. ros. rubr. vnc.

vnc.ii.& de quinque ros.perf.vnc.i.cum aq.
beton.fiat potus.

Ad Peripneumoniam

IN materia crassa mittatur sanguis ratione febris & inflamm.internæ.

Syr.de cann.de viol.de suc.cichor. & de granat.dulc.cum aqu.cichor.facta præparatione propinetur.

Med.purgans, ex sacch.violato, vel cassia cum aqu.hord.sufficienti.

Possunt & exhiberi succus malorum punicatorum, seu granatorum, & ptisana cum saccharo.

Ol.amygd.dulc.butyr. rec. non falsi exterius adhibendum.

Cataplasma. ex fari. fab. & hord. ana part. æquales, butyri recentis.ol amygd.dulc. & viol.ana vnc.i.ceræ modicum, fiat linim. in parte affecta.

Interius māna dissol.ex aqu. hord. vel ore tantillum cassiæ recent.extr.per set.quæ cass. diu teneatur eo, quod lambendo refrigerat maxime pulmones.

In Hispania desigunt cucurb.& scarif.in thorace, sed latius est in dorso: neque enim, reptant inde tot arteriæ, quot in pectore: & tunc si etiam est opus, secetur vena ex altero brachio.

Sub materia frigida, & permista ex Gal. 2.
ad

ad Glauc. cap. i. vena secetur vberiori sanguinis modo ex altero brachio.

Syr. de hyssopo, de prassio, de glycyrrhiza cum aq. capill. vener.

Medicam. ex decocto Agar. troch. sol. senæ cum flor. cord. in aq. beton. in quo diss. syr. D. Augustini, vel sy. ros. solut. vel manna, vel cassia.

Loco lambitini interius ol. amyg. dulc. recent. cum sacch. vel sorbillatim da. sy. de glycyrrhiza, sy. capill. vener. &c.

Si morbus diuturnior sit, R. syr. de hyssopo, & prassio cum loch de pulm. vulpis, vel loch. fani, vel Diacod. vel aq. mulsam confectam ad bibendum ex aq. & melle cum modico hyssopi, vel aqua confecta ex iuiub. vuis pass. cum caricis, cum capill. vener. & glycyrrh. in potum.

Exterius vtaris ol. chamem. & amyg. dulc. cum adipe anserino, vel butyro, vel pingued. viruli.

Fomenta sint hæc. Rec. malua, alth. parum senigr. senæ, flor. chamem. cass. & capill. ven. a. p. ij. caric. ping. pass. sine nucleis, iuiub. febest. hord. an. m. ÷ hyssopi p. ij. bull. in hydrelæo ad consump. 3. partis ex facto decocto fomenta fiant ad pectus ex spongijs.

Non cedete malo fonticulus in brachio sinistro.

Quidam empyricus exhibuit cuidam ol. nitri, qui mortuus est.

Ad Syncopen

Syncope præfenti frictiones toto corpore sunt inculcandæ.

Symptomatico, per inanitionem superiorum partium deliquio; fuscitato, ligaturæ pedum digitis asperiores adstringantur, frictiones verò fœmoribus, & tibijs agitentur.

Si defectus animi venerit à profusione sanguinis ex utero, vel è venis sedis, frictiones brachijs acerrimè inducantur, & digiti manuum peruellantur.

Resumptiua, vel restauratiua, quale est vinum odoratum, vt Gal. 12. meth. 4. & 6. nec non 1. ad Glauco. c. 14. In frigida syncope merum vernacium, aut protropum lacryma dicta: & præsertim si vini genus hoc sit adstringens.

Vomitibus commendatur.

Lypothymia, quæ sæpe fit propter consensum stomachi, neruulo 6. paris cerebri remordentem humorem grauitè ferente: vomitione prompta reuocatur. qui vomitus excitatur, seu panno oleo tincto, seu digitis in olim missis, vel sy. aceto. aqua diluto, tepidoque potu. non autem licet valentioribus alijs intendi reiectatum, ne fiat attractio. Qua demum expurgatione facta deueniens ad

Clysterè, qui Rec. Cas. vnc. i. Diacath. vnc. ÷. Olam. y. dulc. & Rhodom. an vnc. iiii. m. fiat

fiat enema. secus agetur res per suppositoria.

Ex ore vero assumptis erunt

Sy. è succo granatorum dulc. acerborum.

Confect. de hyac. cum sy. de pomis, & de
suc. borag. ex viu est; vel

Syr. de suc. cichor. cum pulu. margar. præ-
par. vel diamarg. frig. vel electuar. de gemmis
sine speciebus, vel elect. regum, vel lapid. Be-
zahar. ex modico vino albo veteri odorato.

Illitus extra os ventriculi ex ol. rosac.
amyg. dulc. & sim.

Clyst. sine quotidiani ex Cass. ol. viol. dis-
soluta in decocto maluar. & althear. lactuear.
violarum, hordei in aqua pura.

Ad Asthma.

M Alum hoc, si per consensum est iecino-
ris, vel lienis, non aliam agnoscit, quæ
curationem istorum cõmunem. Si vero per
essentiam hominem compræhenderit iam diu
senem, curatu difficile monet Hippoc.

Iuuenes vero sectione venæ dexteri cubi-
ti leuabuntur.

Syrup. humores præpara de glycyrrhiza
de cannis. capill. ven. de zyziphis, de hyssop.
de stæchade. dilues aqua hordei, vel con-
simili. Calidis vttere, tum à prandio, tum à
cæna.

Medic. purg. Rec. flor. cord. p. i. sebest.
quar. pass. sine vinacijs, hordei sine corticib.

capill. ven. ana p. i. caricas ping. num. 4. fol. fenæ or. vnc. ÷ Agar. troch. dr. i. fiat decoctū in aq. capill. ven. & in colat. dissol. syr. de quinque infus. ros. persic. vnc. iiii. mānæ elec. corp. aut sacchari violat. vnc. iii. Diaph. vnc. ÷ misce, & fiat potus.

In for. vero pillulari Rec. pill. de agar. pulu. hieræ. Gal. & Aggreg. ana dr. i. form. pill. cum cathart. ros. n. 7. & inaurentur.

In forma vero boli. Rec. Cas. rec. extr. per setam vnc. i. diaphen. vnc. ÷ pulu. hieræ Gal. agar. troch. & pulu. glycyrrhizæ ana dr. i. cum saccharo fiant boli.

Post hæc exhibe ius consummatum vulgo vocatum cum fursure paratum hoc modo.

In iure pulli, decoque. pug. i. fursuris in tela rara deligatum: elixatione completa fiat expressio, exhibe mane calidiusculum. loco iuris est malsa.

Item offer oleum ex amygd. dulc. recens insperso modico saccharo cand. viol. & pulu. glycyrrhizæ, fiet ex his lambitium.

Aqua, potissimum hyberno tempore fiet parabitur. Rec. Rad. glycyrrh. ruditer contuse vnc. ÷ passul. sine granis, ziziphorum, hordei mundi, capill. ven. ana p. i. caricas ping. n. 6. hyssopi p. i. bull. in lib. 12. aq. font. ad consumpt. 6. partis aq. add. in fine mell. opt. vnc. i. facta decoctio secundum artem, & coacta seruetur pro potu.

Lam.

Lambitiua calidiora. Rec. sy. capill. ven. de hyssopo, de glycyrrh. ana vnc. i. loch. sani vnc. \div m.

Pillul. bechic. in tabellis interdiu, & noctu delibentur sic paratae.

Rec. diacod. in tabellis, & loch sani sacch. granulofi, seu candi quantum videbitur, dissolue in aqua hordei, confice tabellas. secundum Artem.

Per mensē exhibeatur cassia, si sit æstas, si vero sit hyems, terebinthina, quæ est mirabilis vis sic parata.

Rec. terebinthinæ decies lotæ ex aq. decoct. maluæ, hord. & glycyrrh. vnc. \div m. sub aurora quatuor post horas cibandus æger transuoret bolos in ouo, vel in neuola dicta madefacta vino, vel si commodius videbitur in oleo amygd. dulc. calidiusculo. Caute uero boli exhibeantur, ne inuiscentur pili. quod si alioqui contingat inunge, sing. bolos ol. amygd. dulc. uel puro communi.

Si non fuerint hæc satis, insiste decocto falsæ, uel ligni guaiacini cum floribus, & fruct. pect. ut in descriptione aquæ prædictæ.

Empl. capitale affigendum ex aspero panno prius intricatę futurę coronali, quatenus poris intimę substantiæ rarefactis subeat facile medicamenti virtus, quemadmodum enucleauit Aetius. Inungendus uero thorax ung. pectorali Mesuæ.

Postremò excitetur fonticulus in brachio

sinistro, & mittendus est æger ad sulphatariã Puteolanam.

Ad Palpitationem cordis.

Periculosior est palpitatio, quæ ventriculos agit at cordis, & pericardij. Causæ flatus, vel humor ad modum crassus, &c.

Sanguinis emissio ex vena interna cubiti manifestam afferet vtilitatem, autore Gal. 1. de loc. affc. 2.

Syr. endiu. de pom. de suc. borag. & rhodom. ex zacch. ana vnc. ÷ aq. meliss. vnc. iii.

Medic. in for. pot. Rec. Agar. troch. dra. i. fol. senæ orient. vnc. ÷ flor. cord. p. i. decoq. ex aqua senic. & in col. diss. syr. ros. solut. & sy. D. August. ana vnc. iii. Diaphen. vnc. ÷ m.

In forma vero pillul. Rec. Pill. de lap. lazuli, & pill. aggreg. & pill. de hiera ana dram. i. form. pill. cum syr. de stach. n. 7.

In forma vero boli, Rec. pulu. hieræ Gal. & Agar. troch. ana dr. i. Dragacanth. vnc. ÷ cū sacch. f. boli.

Epithemata cordialia, Rec. Ros. incompl. cort. citri; florum aurantiorum, & viol. ana p. i. basilici dr. i. granorum parad. sem. eruc. ana dr. ii. ligni aloes, pulu. diamarg. frig. ana dr. i. aq. namphæ, ros. rub. an. l. i. vini vernacij lib. ÷ decies applica ad cor panno rubro: mox affricetur ol. magni Ducis Florentiæ, alias vero fiat embrocha parti ex aqua namphæ

phe cum pulu. boli arme.mista.

Aliud è simplicibus,quę discutiunt flatum,
& augment vitalem vigorem, Rec.diamoschi
dulg.& amari ana dr.i.aq.namphę, vel opti-
mo vino modico dilutum offer. vel offer.
confe&.diambreę, vel de Hyac. eodem mo-
do, vel Lap.Bezahar.gr.5. vel 6. vel conf. Al-
cherm.ad dr.i.vel iulepi de cinnam.dr.i. vel
ol.anyfor.destillatum cum sacch. confe&um
in tabellis; frange tessellam ore detinendam.
potest & addi ol.senic. destill.

Linimenta cordis ex ol.de cinnam.destill.
ol.vero de pulegio destillatum in grauiori-
bus casibus permittitur aliquando.

His non conferentibus,sectio fiat Salua-
tellę sinistrę manus,&c.

Hirudines ad sedem affigendę.

Cauter.in sinist.brach.reuellet ab affecta
parte confluxum.

Reuellit etiam, & euacuat morbi materiã
orientalis senz deco&um in iure pulli inter-
polatis,diebus octies repetendam,vel totidem
diebus sumat.

Syrup. magistrale, quod Rec. rad. chinę
concisę vnc.i.Infunde in lib.vi.aq. font. per
24.hor.fiat deco&.ad cõsumpt.semisis aquę
adde senz orient.vnc.i.epith. dr.ii. polypod.
querc.dr.iii.flo.borag.viol.fumit.cichor.en-
diu.ana p.i.anyfor.senic.ana dr. 2.fol.meliss.
glycyrrh. ruditer concusę vnc.÷ fiat dec.
sec. art. expressus succus aromatizetur ex

ligno aloes ad dr.i. Santal.omnium dra.iiii.
cum zaccharo sufficienti, fiat sy. longus: Cu-
ius assumat vnc.iiii.in singulos vsus, æstate
bis hebdomada, hyeme vero quotidie.

Ad Pleuritidem.

FOmenta partis affectæ ex anodyn. in co-
ctis aq. font. expressis modice spongijs
administra.

Embrochæ pariter, & inunctiones ex ol.
amyg.dulc.

Sy.de cann.de suc.endiu. & gran.dulcium
cum aq.capill.ven.& aq.borag.â mali exor-
dio statim.

Venæ sectio ex opposita parte lateris do-
lentis, & rursus ex eodem latere de iecorar.
bis si mali vis exigat, & consent vires.

Quarta die medic.quod Rec.flor.cord.p.i.
zyziphor.sebest.capill.ven.passul.sine vinac.
hord.mûd. an.p.i.sol.sen.orien.vnc.÷ deco-
que in aq.hordei, vel capill.ven. & in colar.
disso. zacch. viol. vel mannæ ele. Calabræ
vnc.iii.Rhab.rigor.per spicam inf.in vnc.iii
succ. ros. pers. triph. pers. dra. i. & non
colati.m.

Febre persistente cum validiore inflam-
matione, abstine à Rhabarbaro, & senna, sed
imponito temperatiora, præsertim cassiam,
rec.extra.per setam cû puluisculo glycyrrh.
& zacch.granulosi è violarum syrupo, forma
boli

boli deuoret mane bolos, & prandium remo-
retur quatuor ab assumptione horas.

Cruda apparente pleuritide deueniendum
est ad Anodyna decocta in hydrelęo per spō-
gias, vel in vesica suilla calida applicanda;
particulę dolenti.

Sy. lenientes sunt de glycyrrhiza, capill.
ven. violat. præterea manna dissol. ex aq. hor-
dei, vel decocto huiusmodi, quod

Rec. Caric. ping. pass. sine gran. zyziph. mē-
dorum ana p. i. hordei mun. p. ÷ glycyrrh. ru-
diter contusę dr. iiii. capill. ven. p. i. bulliane
sec. art. in lib. vi. aquę font. ad consumpt. ter-
tię partis, & facta colat. seruetur pro lam-
bitiuo mane, & vesperi, quod est matura-
tium.

Loch sanum, itē & Diacod. in tab. zacch.
cand. & pill. bechicę recen. singula diu sunt
ore retinenda.

Vnctiões amygd. dulc. chamęm. axungię
gallinę, & butyri.

Decoctum hordei cum pauca glycyrrh.

Aqua mulsa cum est materia reddita cras-
sa. Item oxymeli simplex mox scylliticum,
verum hoc hyeme.

Externę vero inunctiões ex adipe vitul.
quę desumitur ex cruribus vituli, vel vnguē-
ta Dialthęę, vel vng. pector. cum mucilagi-
nib. Vel saponę, quę Rec. amyli, & zacch.
cand. cōtriti ana vnc. ÷ ol. amygd. dulc. recēt.
vnc. iiii. ad modum saponis deducto. vtitor
pau-

paulatim in horas, quod medicam. dicitur vulgo Alofa.

Potest & æger delingere cassiam recenter è fistula extractam.

Non omitto pulveres anodynos demittēdos in stomachum, ex aq. mulsa, vel vino. ex his est

Limatura dentis porcini, quæ iuuat verius in pleuritide notha. In quam etiam melius insperguntur cortices talorum suillorum assi, & cum cymino contriti parte prius inuncta ex ol. anethino.

Sed si materia non fuerit expurgata, sed ad suppurationem versa curatio huiusmodi cōmunis manet empyematis, de qua nos paulo post agemus.

Phthisis Curatio.

PRima die sy. præbito de zyziphis, de granat. dulc. de cann. & capill. ven. quia scopus est præcipuus ad facilitandum sputū, & ne generetur putrida febris, in prōptu sit

Aqua pectoralis confecta ex zyziphis, carne passularum, & hordeo, seu mauiis aqua mulsa ex Hippocratis ritu.

Quarto die pharmacum, quod Rec. flor. cord. p. i. hord. mund. sebest. passul. sine granis capill. vener. & zyziph. ana p. i. fiat dec. in aq. hord. & in colat. dissol. sy. de v. inf. ros. pers. & manzæ corp. aut zacch. viol. ana vnc. iii. m.

In

In forma vero boli, Rec. Cass. nou. extr. per
setam vnc. ii. Agat. troch. dra. iiii. vel dra. ii.
cum sacch. exquisito: bolo v ante prandium
horis vtitor.

Lac Asininum hoc modo præparatum ordi-
natur. Asella dies aliquot lactucis, hord. sur-
fure, endiuia, boragine, cichor. nutritur, sic
alita deducatur ante lectū decumbētis. dein-
de præcalfactis vberibus educ lac, quod ebi-
bat languens ad vnc. iiii. à quo iam assumpto
quiescat æger, & per 4 horas vigilet vsque
prandium, post hæc augere, meminerit dosin
singulis diebus vsq; ad vnc. vi. prosequuturus
eandem mensuram 20. diebus.

Exinde vero totidem alteris 20. diebus lac
caprinum eodem præscripto repetat, si celi
temperies vere, & autumnō consentiat.

Cum senserit æger acidum ore, vel stoma-
cho sapore, loco zacchari immisceto Rho-
domeli zuccarinum, quo rursus acedinem
non moderante, tunc à lacte abstineto, sed
eius loco fuerint

Sy. magistrales, qui Rec. Carnium testudin.
lib. 3. cancos fluuiatiles. n. 12. bull. in vi. lib.
aq. font. ad consump. mediet. adde in dec. en-
diu. borag. cichor. buglos. hord. mundi, &
pass. sine granis, capill. ven. sebest. ana p. 3.
factæ fortiter expressioni adde sacchari du-
plum: habebis. sy. longum, de quo sumat vnc.
iiii. singulis diebus mane binis hebdomadis,
aut circiter languens.

Elect.

Elect. eiusdem intētionis est hoc, Rec. carnis testud. elixæ vnc.iiii. semin.portul. sem. malux, sem. lactucae ana dr.i. pulu. glycyrrh. & lapid. hematitisa ana drach.ii. sacch. albi dissoluti in aq. capill. vener. sufficienti. fiant tabellæ.

Aqua superest ex angue ceruono dicto, cuius carnes abscissa cauda, & capite destillantur in vitro, quod dicitur vulgo retorta cum simplicibus pectoralibus, quorum ante meminimus, quibus & volens adijcere possis carnes testudinis, aut cancrorum fluuiatilium.

Vsus mannae, & cassiae.

Cauterium in brachio sinistro.

Ad Empyema:

SI febris adest, curetur vti pleuritis. Si sine febre, decoctum ligni sancti, sed corpore prius expurgato per catharticum, quod ante descripsimus in phthisi.

Sanguinis emissio ex vena interna dextri cubiti.

Decoctum autem ligni guaiacini est hoc, quod Rec. ligni sancti vnc.iii. corticum eiusdem, sol. sen. orie. ana vnc.i. capill. ven. hord. mundi, sebest. pulpæ passular. zyziph. ana p.i. ÷ florum cord. stēchad. sampuchi, betonicae ana p.i. infus. per 24. hor. in lib. vi. aq. font. decoque ad consumpt. duarum part. aq.

facta

facta colatura seruetur pro potu, cuius dos,
sit lib. ÷

Pro potu, Rec. eiusdem ligni sancti vnc. i.
infunde in aqua lib. 15. aq. font. decoq. eodē
modo, & ratione secundum artem ad con-
sumptionē tertiæ part. aquæ: adde in fine gly-
cyrrhizæ ruditer contusæ, & semin. cori. præ-
par. ana vnc. i. cinnam. elect. dr. vi. facta cola-
tura seruetur pro potu, quo vtitor dieb. 40. cū
diæta ex rebus stypticis, qualis est caro assa,
amylus parum torref. pulmentū cū saccharo
confectum.

Si sit empyema per destillationem, caute-
rium occurret dextero brachio excauatū.

Quo ipso tempore terebinth. decies lota
ex aqua hyssopi singulari est vsui deterfionis.

Ad Tussim.

Primo videndum est, quæ sit causa tussis
i. num hæc sit ex destillatione, vel num
sit intra thoracem ipsum, & num sit per cō-
sensum, aut per essentiam.

Si ex destillatione sectio venæ mediz dex-
tri cubiti interni. interim

Syr. esto de infus. ros. cichor. borag. ana
vnc. ÷ aq. lupul. vnc. iii. m.

Medic. Rec. Agar. troch. dra. i. fol. senæ
vnc. i. flor. cord. p. i. fiat dec. in aq. betonicæ
in colat: disso. sacch. viol. vnc. iii. m.

Vel in forma pill. Rec. pill. cocc. & agar.
troch.

troch.ana dr.i.form.pill.7.cum cathar.ros.

Cauterium bracch.dextero,vel sinistro.

*Syr.reprimentes destillationem à capite
sunt de infus.ros.de papau. de cichorio cum
pulu.corallior.præpar.& apparere coctione*

Emplast imposito capiti cephalicum.

*Interpellatis vicibus Cass.bolus cū pulu.
glycyrrh.& cinnamomi.*

Decoctum lig.sancti.

*Sudationes Trituli,quæ sunt ad myrteta
Puteolorum.*

*Tussis vbi est per essentiam in thorace, re-
media profuerint, quæ & empyemati sunt
communia.*

*Si tussis antiqua sit, exhibe languenti flor.
sulphuris tenuissime triti in ovo sorbili ma-
ne per 10 dies drach.ii.÷*

Ad Sputum sanguinis.

Q Vando phthoe per tussim est vitio tho-
racis,sectio statim internæ venæ dex-
teri cubiti celebranda crebra, & pauca san-
guinis portione, idest ad vnc.i. reprimendo
per interualla cursum sang.idest identidem
aperiendo, & occludendo.

*Syr.myrtinus,de portul.de ros.siccis ana
vnc.i pulu.boli arm.orient. corall. rubr. &
terræ sigill.ana dr.i.fiat lambitium.*

*Syr.præparâtes curationem sunt de cy-
donijs,de myrthi,baccis,herbæ acetosæ, de
por:*

portul. cum aq. plantag. & portul.

Per æstatem de succ. plantag. & portul.
quam portulacam mandi licet eodem yſu
paulatim.

In maxima vero ſanguinis euacuatione
contineat æger aquam potiffimum cisternæ
frigida ore.

In potu vero quotidie cystername aquã
ſeramentis candentibus ſæpe numero me-
dicatam.

Altera etiamnũ & tertia ſanguinis emis-
ſio ex altero bracchio, ſi ſanguis non com-
peſcatur.

Cibi perpetuo ſint incrassantes, vt pedum
vituli, & veruecis, & oriza.

Si ſanguis ceſſet quidem, ſed non omni ex
parte, ſubdito

Medic. quod Rec. flor. cord. p. i. fiat dec. in
aq. plantag. & in ſuff. colat. diſſo. Rhab. opt.
ſpica vigor. dr. iiii. infuſi in dr. iii. aq. de 5. inf.
roſ. rubr. aut in ſucco roſ. rubr. & non colati,
miſce fiat potus.

Abſtinendũ eſt hic à thamarindis, vt pote
quæ pectori nocent, & ſuperſedendum eſt
herbæ acetosæ, vt quæ excitat tuſſim.

Sub noctem ſaccharum cum bolo arme-
nica tenuiſſime trita præ manibus eſto.

Quod eſt capitis vitio ſputum cruentum
Fonticulo in vtrolibet bracchio potiffi-
mum auertitur.

Elect. Rec. ſacch. roſati vetuſti ꝑnc. iii.
ſem.

sem. lactuæ portul. bol.arm. orient. corall. rubr. ana dr. ÷ lapid. hæmat. dr. i. zacch. albi dissoluti in aqua plantag. quota satis sit, m. parentur ex his electuaria sec. Art.

Quæ interdium demitter æger cum aq. chalybeata, vel aq. plantaginis.

Præter autem adstringentia reprimunt, & incrassantia, qualia sunt iuscula decoctionum extremè pedum vituli, vel veruecis cum farrib. torrefactis, quod genus hauriat, mane quatuor ante cibum horis.

Inunctiones ex ol. myrt. cydon, & viol. tota testudine pectoris.

Si periculum impendeat phthisis, vel empyematis curationem præueni, quam iam nos ad auertendum affectum vtrumque congeffimus.

Si symptomatica vero sanguinis fluxio sit è naribus, prima occurrit venæ sectio. Mox aliqua reprimentia, tum in fronte, tum in gula, qualis est aq. plantag.

Rec. aq. plantag. & nymphææ ana lib. ÷ aq. ros. rubr. lib. ÷ ol. ros. omph. vnc. iii. pulu. boli arm. orient. & terræ sigill. ana drach. ii. misce.

Aliquando miscebis aquæ cisternæ cum aceto proluc nares, quam & æger ore contineat, & manibus frigidam affundat.

Ad hæc cum pulu. boli arm. orient. terræ sigill. ana drach. ii. cumq; pilis leporinis minutim concisis albumen oui conuassatum

ad

admodum collyrij compone, mox huius aliquam partem, quæ medium amygdali nucleum æquet in nares hæmorrhagia mudentem inde, ac detine digito pressius adstrictum, ut acquiescat tandem fluxus, quem & suppressum vidimus insufflato arido fimo rudibilis iumentis.

Cucurbitulæ hypochondrijs defixæ sic: ut si sanguis ægrotanti erumpat è nare dextra cucurbitula applicetur hypochondrio dextero, si vero contra accommodetur sinistro.

Ligaturæ pedibus, & cruribus adstringantur, à brachijs verò satius est abstineri, nè cōfertim adrepentis humoris fiat attractio.

Sanguinis emissio, si vis extrema coegerit, ad quartam vsque vicem repetitor.

Ad vomitum, & nauseam.

FOmenta stomachi ex absynthio, mentha, & vino odorato, vel per panē assum irroratū aspergine meri generosi crassioris, & cinnam. mastich. caryophyll. curiosè contritis.

Clysteres subtrahiui ex hiera picra. Diaphen. electuar. de succo rosar. aut benedictæ cum oleo chamemel. & melle despum. & dissol. in decoctione diuretica, vel in decoctione ex anodynis.

Medic. purg. Rec. pillul. mastich. pill. aggreg. & pulu. hieræ ana drac. i. form. pill. 7.
K cum

cum cathar. ros. sed forma boli, Rec. Traga-
canthæ vnc. ÷ pulu hieræ Galeni dr. iiii. cum
sacch. fiant boli.

Sacculi stomachici madefacti in vernacio
vino calido sæpe appliciti stomacho.

Emplastrum Io. de Proch. vel vtriusq; gal-
liæ per aliquot dies detinendum exteriore,
ac posteriore parte ventriculi.

Balneum de subueni homini spongijs ad-
hibitum calide.

Si balneum obfuerit ægrotati intemperiei
calidæ iecinoris ergò, commuta cum Suc-
cellario.

Materia biliosa committente nauseabundū
affectum, protinus ex aqua tepida, & syr. ace-
toso, vel aceto ipso, vomitum arte monstra-
tum ne dubites inculcare.

Syr. oxysacch. de granat. medij saporis,
quales recte vocaueris acerbidulces, muzos
Arabistæ dixere.

Clysteres ex cassia Diacathol. rhodom. &
melle viol. & ol. amygd. dulc. & ol. viol. cum
decoctione communi.

Medic. purgans, Rec. pulp. cass. rec. extr.
vnc. i. rhabar. opt. vigor. parum nutriti succo
ros. rubr. dra. ii. specierum hieræ Gale. dra. i.
cum sacch. suff. conflentur boli.

Illitus externi vētriculi, Rec. pulu. vtriusq;
menthæ, ros. rubr. & myrti ana dr. ii. mastich.
corall. rubr. ana dra. i. cinnam. elect. dr. ii. ca-
ryoph. dra. i. ol. mastich. & cydon. ana dra. ii.
ceræ

ceræ, puſillum confice linimentum.

Sy. congruunt de ſucco ribes, de agreſta, de ſorbis, miua cydoniorum, ſy. herbæ acetofæ, vel de portul. vel myrtinus.

Post cibum vtimur diacydonite.

Ex his eſt emplaſt. omne ſtomachicum ex oleo nardino extenſum in aluta deſcriptis ſuperioris ventriculi terminis.

Quod ſi vere vomitus eſt, qui vexet hominem, ſymptomaticus, cucurbita maiuſcula deſixa parti, quæ reſpōdet ori ventriculi, certam promittit opem.

Ad Cardialgiā.

Preſente cardialgia, vomitus conſulto prouocatur ex his adiumentis, quæ modo recenſuimus.

Si vitio fiat humoris, ſyr. dictus oxyzacch. aut ſyr. granat. muzorum, aut terra ſigill. & bolus armenia orient. cum ſyr. de acido citrii, ſementella, vel corall. ad dra. i. vel pulu. ſem. citrii, vel theriacæ dr. i.

Particulam vero ventriculi ſuperiorem fomento roborabis abſynthij. & mentæ, quæ reporem adſciuerint ex percalſacta igne tegula.

Clyſt. ex lacte caprino, vel aſinino, & ſucco ſalicis cum ſacch. & ſemine canapis, ſiquidem inde lumbrici ſepe mali effectores parte relicta ventris altiore, ad inteſtini prin-

cipium alle&ti dulciario se recipiunt.

Proficiunt & semina portul.beton. bras-
sicæ ad dr.i.cum aq.acetosa,vel portul.

Illitus amarorum vnguinum ventriculi
parte tum superiore,tum etiam in fundo. Sic
oleum de thure destillatum lumbricos vnice
rumpit. Adhuc aliud est præstabile com-
mentum:

Auratio pomo primum excauato immitta-
tur fellis taurini rutæ, aloes, & theriacæ ve-
teris ana dr.i.allii nucleum mundum vnum,
croci dra. ʒ m.cum acido aurantij,quod ca-
lidis affetur fauillis. Qua elixatione peracta
ventriculi, tum os supernum,tum fundum
inunge. Vbi vero copia nõ sit aurantiorũ, ea
simplicia bull.in oleo communi.

Clysteres mitigantes bilis acrimoniam,&
furorem,non effugient cassiam,ol.violatum,
mel violatũ,diacath.& decoctionẽ cõmunẽ.

Contra vero si materia sit crassa,Clysteres
ex vsu sunt incisui,& deterui.

Sy.de cortic.citrij oxym.simp.oxym.scil-
lit.cum iulep.de cinnam. vel cum aqua stil-
laticia de cinnam.dupla portione,nam utrũ-
libet os ventriculi restaurat.

Vel syr.de menta,vel conf.de cinnam.cõ-
fekt.de Hyacinth.vel de Alcherm.ad dr.i. ex
vino flauo bono.

Clyst. Rec.hieræ picræ Diaphen. aut Be-
nedi. aut elect. de suc. ros. ana vnc. ʒ Agar.
troch. tenuissime triti dra.i. specierum hic-

ra Gale. dra. ii. mellis despum. ol. chamemeli
ana ꝑnc. iii. cum decoctione diuretica.

Cardialgiam cauens futuram ex præsentī
non discussa materia de ventriculo, superse-
de venæ sectioni, sed præpara primum hu-
mores syr. ante descriptis, mox eijce medi-
camento non vehementi, ne attrahatur ad
ventric. acris materia, dandumque rhabar-
correctum suc. ros. pers. cum aliqua portione
mannæ. si vacet febris, licet non vacet ma-
teria crassa, & viscosa, decoctio sit Agar. cum
flor. cord. & sena orient. in colat. dissol. syr.
solut. August. Niphi, ac deacath. Arnaldi, vel
sim. forma vero boli

Rec. Diacath. Arnal. dra. vii. pulu. hieræ
Gale. & Agar. troch. ana dr. i. Diaprun. ꝑnc. ÷
cum sacch. fiant boli.

Sacculi, Rec. absynth. vtr. mēthæ ros. rubr.
cort. citrij ana ꝑ. i. ligni aloes, dictamni albi
mastich. & cinnam. ana dra. iiii. caryophyll.
dra. ii. ex omnibus crasso modo contritis pa-
rentur sacculi iii. quorū duo madefaciēdi sūt
in vino vernacio, vel succo cydon. vicibus
alternis. i. vt nūc unus, nunc alter seruiat pro
madefactione, & fomēto illo vini, vel suc. cy-
don. Tertius imponetur stomacho languenti
ficcus.

Si non facient hæc satis, Emplasta supplē,
quæ consentur ex Empl. Ioannis de Proch.
& emplast. vtriusque galliæ ana ꝑnc. ÷ di-
stendantur in aluta. vtimur his empla-
stis

stis vicibus interpellatis.

Insuper pill. mastich. ad dra. i. vtere antecenam.

Si flatuosa sit cardialgia, vinum conducit, sin minus haud benefacturum puta.

Insequitur hanc affectionem sudor diaphoreticus vt plurimum, qui cum sit à viriū iactura magna, cohibendus est illitu crebro totius spinæ dorsi ex ol. myrtino, vel rosato omphac. vel ol. de semin. cucurbitæ recenter expresso. Singulare vero est corpus hinc, & inde indefinentibus ventilare flagellis, vt pori constipentur.

Quibus artibus vbi non cedat insolentia morbi, sunt infricandæ partes vndecunque ex vino odorato, in quo debullitæ sint rosæ in compl. frondes, & cortic. citrij cinnam. & caryophy. ex quo decocto, vel irrigentur omnes ad vnguem extimæ partes, vel opulentus æger demittatur in labrum, quod receperit medicatum hoc late merum, quippe mirabiliter iuuabit calore suo.

Exhibeto quoq. rosatam nouellam ore demittendam ad dra. ii. ex vino odorato, vel iure pulli cannella tincto.

Ad Singultum.

Singultus ex inanitione discutietur rebus, & nutrientibus, & adstringentibus, in quibus est ol. amygd. dulc. cum sacch. quod pau-

paulatim combibatur recens expressum: sic etiam manna dissol. in aq. hord.

Confect. de hyacintho.

Sunt è cibis oua sorbilia, testes gallorum, hepata gallinaru. Itē pistū pullæ, vinum generosum.

Singultus ex repletionē, & offartu multæ materiæ pituitosæ profugabitur vomitorio, ex aq. tepida, & syr. acetos. vel oxymel. scyllit. aut simpl. ad vnc. i.

Mane decoctum agar. ex aqua tepida ad hunc modum.

Rec. agar. troch. drach. i. bull. in aqua pura, adde oxym. simpl. vnc. ii. paretur vomitorium, quod est mirabile ad materiam illam crassam expellendam.

Syr. consequentes de mentha, de stech. & syr. de cinnam.

Sacch. quoq; ex flore marino alias anthos dicto.

Confectio quoq; Hyacinth. & Alcherm. vel de cinnam.

Medic. aliquāto validiusculū, R. Diacath. Arn. dra. vii. Agar. troch. specierum hieræ Gale. ana dra. i. Diaphē. vnc. ÷ cum sacch. fiant boli.

In potu vero sic, Rec. Agar. troch. dra. i. sol. sen. orient. vnc. ÷ fiat decoct. in aq. beton. & in col. diss. sy. Niphi. & rosati solut. ana vnc. iii. Diaphē. vnc. ÷ m.

Inunctiones ventris ex ol. destil. ex absynt.

oleo de spica, vel mastich. vel ex caryophyllis. tandem.

Emplastū vtriusq; galliæ, & Io. de Prochyra, seu composita, seu seorsim administrata.

Si ex materia acri imbibita tunicis ventriculi præsto sit

Vomitorium, quod supra posui.

Paulatim resorbeantur syr malorum granatorum, iulepum viol. vel rosatum dissoluta in aq. melissæ.

Pharmacum purgans, Rec. Tormentil. dr. ii. flor. cord. p. i. thamarindor. & sol. sen. orient. ana vnc. ÷ fiat decoct. in aq. scorfon. in suffici colatura disso. mannæ ele. corpor. vel sacchar. viol. vnc. iii. triph. pers. Rhab. vigor. dr. i. ÷ infusi in vnc. iii. suc. ros. pers. & non colati m. pro potu.

Succi granatorum malorum, vel suc. citrij, vel suc. limonis, vel syr. de acido citri, vel cū vino albo bono paratis succis admisce, trita hæc, quæ subsequuntur.

R. pulu. boli armen. orient. marga. præp. & seminum citrij ana dr. i. m.

Sic & lapis Bezahar ad gr. v. vel vii.

Extrinfecus vero fatus ex absynt. & mentha, vel alias sacculi leuiiores, qui Rec. vtriusque menthæ ros. in compl. cort. citrij, & absynt. ana p. ii. santal. omnium, & corall. rubr. ana dra. i. contere grosso modo, vnde fiant 2. sacculi solenni forma pro stomacho, qui sacculi madefiant in aq. ros. rubr. vel succo

cy-

cydon.& calidi applicentur.

Inunctiones ex ol.amyg.dulc.ol.nuc. mo-
schata, adipe gallinæ.

Cataplasma, R. Carnis cydon.lib. . bull.in
suff.quantitate succi cydon.& aq.ros.rubr.f.
ad modum vnguenti, extend in tela rara, de-
super pone puluerum santal.omnium, & co-
rall.rubr.ana dra.i.fiat cataplasma, quod ap-
plicetur circa ventriculum.

Cum vero sit ex Apopl.epilep.vel percus-
sione capitis, curabuntur hi singuli, quem-
acmodum fieri consuevit in illis.

Ad Cittam, & Picam.

Affectus hi sunt vtero gerentibus, quibus
exhibenda sunt omnia, quæ mouerint
appetentiam. nam secus hæ perderent fætum.
Quod si tetrum aliquod suspiceris stomacho
præsens, de hoc exonerando cura prima esto.
quod facies aqua tepida, & aceto, si validis
sit renibus prægnans: nam si lumbis, idest ho-
rum musculis sit malæ firmis, aqua suffecerit
calidiuscula.

Syr. incidentes æstate sunt oxyzacch. syr.
de gran.ex acerbo dulcib. hyeme vero sunt
oxymeli, & rhodomeli simplex, & rhodomeli
cum zaccharo temperatum.

Conseruæ de cortic.citrij, & de toto ci-
trio. digniores vero & peregrinæ myrobolani
sunt cuiusq; generis conditæ,

Fomenta ex decoctione foliorum , & corticum citrij cinnam. caryoph.

Vtriusq; menthæ, & consimil. ex vino per spong. vtere.

Fotus, & illitus ex ol. nucis, verbi causa, moschata; & lentisc. & absynth. non tantum ad ventriculum, sed & ad vteri latitudinem.

Carnes offer bene saginatorum animalium, vt succulentis remedio sint ad equandæ melancholicæ siccitatis, & intemperantiæ. Vinum ergo sit dulce, qui medius est saporum. & cum opus est aceto ad resouendum stomachum, & appetitum, illud sit ex incotta multa vua passa modificatum.

Clysteres acres, vt superflua, & aliena trahant ad partes inferiores.

Syr. refrigerantes oxyzacch. simpl. de acido citrij; violarum cum aqu. beton. vel melissæ.

Medic. purg. ex cass. pulu. hieræ Gal. diacath. si materia subsit calida biliosa m. rhabar; si frigida sit agar. tam in potu, quam in bolo. At suc. ros. pers. m. corroborantibus, quæ supra sunt annotata.

Oris torturæ remedia.

AVxilia secundum Galenum adhibenda sunt particulae resolutæ, non autem membro conuulso, non quia muscoli retra-
han-

hantur semper ad illud principium, à quo sunt.

Experientia quoque comprobatum auxilium in parte conuulsa augere conuulsionē.

Ad resolutam igitur sacculi ex quatuor anod.

Infusiones vero ex ol.amy.dul.& chamem.

Si causa sit multus sang. tunc emittatur ex eiusdem lateris, quæ per rectitudinem est, vena comm. quod latus si forte fortuna sit infirmum, & oblæsum, interdum ex opposito licebit.

Syr.de beton.de suc.borag.de inf.ros. cum aq.beton.vel melissæ.

Medic.purg.ex pill.arabic.cocc.& pill. si ne quibus, & ex agar.troch.cum sy.de stach. form.pill. 7.

In for.potab.Rec.flor.cord. p.i. agar. troch dra.i. foliorum sen. orient.vnc. — fiat decoct.in aq.beton.& in col.diff.syr.D August. & ros.solut.ana vnc.iii. & de 9.inf.ros.rubr, vnc.iiii misce.

Vnctiones ad partem affectam ex ol. de lumbr.ol.nardini, ol.de spica.

Confect.Diambræ, & syr.de stach. & de inf.ros.rubr.incompl.m. proportionali dosi. Propositis quoque syr. admisce frustulum ossis cranij humani, vel pulli equini, quod pyramidis figura sub verticis est futura.

Sinapismi. Rec. semen sinapis contusum cum melle sufficienti m.

Vnctiões valentiores ex ol. ros. lumbricar. ro. ol. vulp. ol. de hyperic. vel de spica, vel de chrysomelis ana vnc. i. m.

Vng. succedit de althæa cum aq. vitæ.

Emplast. capitale, quod supra descripsi.

Frictiones asperiores.

Cucurbitulæ in dorso, & reliquo corpore, in principio quidem sine scarific.

Si pertinacior perstet morbus; maxime si inueteratus, decocti adhibe sarzæ, & ligni guaiacæ. quod vsitandum est per 20. dies cum optima victus ratione. nec non Aqua sit ex iisdem simplicibus peregrinis, & semine anysi parando.

Naturalia remedia sudatorium trituli, sulphataria, sudationes Aniani.

Ad Lumbricos.

SVmenda per os semen sanctum ad dra. i. cum sy. de acido citrii, vel semen citrii, vel sem. brass. vel semen portul. vel pulu. boli arm. orient. vel terræ sigillatæ, vel corall. rub. ad dr. i. quæ omnia possunt imponi syr. de acido citrii, aut cū vino albo, uel aqua agrimonie hauri. Quod si complicitus sit alui fluor tenerioribus in

Salsamenti forma, Rec. Vtr. menthæ absynth. rosar. rubr. farinæ lupin. ana p. i. Aloes dictamni albi, fellis tauri, ana dr. i. cinnam. & mastich. ana dra. ii. micam panis parum tor;

refa&ā m. & fiat falfamen. ex aceto fortiffimo, extendatur in tela, pone in parte tam antica, quam poftica ventriculi, hoc eft tum in enſi formi, tum in respondente ſpinali medulla, & vtrobiq; detine medicamen per vnam horam, & repete per 3. aut 4. vices, vel

Rec. pomum aurantium, ex ea ſummitatem, in cauum impone aloes, theriac. opt. dictam. albi ſuc. rutæ ana dra. i. alij nucleum ſupponantur calidis ſauillis, affata omnia miſce cum ſucco citrij, quo liniantur tum cor, tum os, funduſque ſtomachi, tertio carpus vterq; bracchiorum, & deniq; omnia corporis extrema.

Deſectu mali aurei bulliantur in ol. comuni illa omnia.

In alui fluore Salfamentum alio modo, Rec. cydon. deco&. in ſuc. endiu. vel in vino vernacio an par. æqual. anterius, & poſterius apponantur oris ventriculi.

Vnguentum, quod eſt valentiſſimum ad expulſionem lumbricorum. Rec. pulu. maſtich. pulu. vtr. mēthæ, abſynt. & roſ. immaturarum ana dra. i. cinnam. dictam. albi corall. rubr. aloes ana dra. ii. cariophyll. dra. i. ol. abſynt. maſtich. ana dr. i. ceræ portiunculam, fiat ceratum molle.

Oleum dictum de S. Seuerino Neap. oleum eſt de mentha magiſtrale.

Oleum de thure deſtillatum eſt certe ſingulare.

Nos quoque damus ore assumendum momentum sulphuris cum succo rutæ, tempore potissimum hyberno, quod est exploratum.

Vinum de absynth. mistum cum succo limonum, cumq; succo sonchi.

Item vtuntur succo menthæ cum succo limon.

Clyst. ex lacte cum suc. frond. arboris persicæ, sem. canapis addito. cremor misceatur cum lacte caprino, aut asinino, cum sacch. fiat enema. potest quoque conflare cum iure pulli, cumq; sacch. & melle despum. vel cum rhodomelle.

His non iuuantibus confectio sit ex rhab. & suc. citrij, vel sy. de acido citri.

In adultis præparandi sunt humores, sy. de mentha, vel oxym. simpl. vel scyllit. vel decoct. citrij, vel de portulac. temperandū aliquid de aceto cum aq. gramin. vel portulacæ.

Med. purg. Rec. dictam. albi, & torment. ana dra. ii. flor. cord. p. i. sol. sen. orient. vnc. ÷ fiat deco. in aq. gramin. & in colat. diss. sy. D. Augustini vnc. iii. Diaphen. vnc. ÷ triph. persicæ, & rhab. vigorati ana dra. ii. infusi in vnc. iii. suc. ros. pers. non colati m.

Vsus theriacæ mane assumptæ ad dr. i. cum conf. de Hyacin. vel lapid. Bezahar. vel Mithrid. aut boli arm. vel terræ sigill. cum suc. limonij.

Vntiones ex prius dictis vnguentis, & samentis.

In

In Ascaridum casu, Clyst. supradicti: nam illi generantur in intestinis crassioribus.

Vinum absynt. interpellatis vicibus mane exhibitum.

Vfus rhab. ad dra. i. per 8. dies, vel Rec. sem. citrij, portul. acetos. brassic. corall. sem. sampsuchi dictam. albi, ligni aloes, rhabar. vigorati ana dr. i. contrita misce.

De hocce puluisculo dr. i. sepiusculè sumat æger ex vino gratum halante, vel ex succo citrii. vel limonii, vel ex aq. melissæ, vel graminis, vel acetosæ.

Ad Celiacam, Diarrheam, & Lyenteriam.

SI cruditas præsens non est ventriculo, sed humor acris, & calidus est in causa; sanguinis emissio ex vena interna dextri cubiti.

Sy. præp. Rec. syr. de ribe, & miua cydon. syr. de acetos. de portul. ana vnc. ÷ aq. acetos. & port. ana dr. i. ÷

Compressium, quod dicitur, medic. Rec. myrobal. citrin. cheb. & ind. ana dra. ii. torment. dra. i. thamar. vnc. ÷ in aq. acetosæ decoq. & in col. diss. sacch. viol. aut mannæ de corp. unc. iii. triph. persicæ, & rhabar. opt. sine spica ana dra. i. ÷ infusi in unc. iii. aq. de nouem infus. ros. rubr. & non colati m. fiat potus.

Fomēta ad uētric. ex absynthio percalfacto, dū irroratur halituosum rubrū vinū: quod fieri

si licet ab initio statim ante medicam. purg.
& a fomento refouendus est uentriculus ex
oleo mastich. & ol. cydon. ante prandium, &
cenam: quo utroq; tempore sorbeat syr. de
ribis, & miux cydon.

In pistum pectusculum assatæ pullæ co-
quus aquam infundat myrti, vel aq. ros. rubr.
uel acetosæ, uel succi omphaci; , & summo
mane præbibat sorpticum, qui succus est ex-
pressus ex assa pulla.

Fomenta vero, & sacculi aromatici sunt
assidue inculcandi uentriculo superiori tum
antico situ, tum respondente postico.

Similique ratione sunt inculcanda stoma-
cho, & intestinis roborantia, quæ proposui-
mus in uomitus curatione, in qua inueneris,
& emplastra morbis hisce communia.

Potus esto uini rubri adstringētis, & aquæ
chalibeatæ, vel cisternæ cum myrobalanis
incoctis.

Clyst. quotidianus ex oleo ros. omphacite,
& olei cydon. ana unc. iii. adipis ueruecini
unc. ii. utellos ouorum duos.

Confect. Micletæ dra. iii cum iure pulli fiat
enema, uel R.

Decoct. in iure pulli, Rec. balaust. malic.
myrti, baccar. ros. rubr. plantag. & acetos.
ana p. ii. poma cupressi parum confusa n. iii.
bull. in iure gallinæ sufficiente: colat. utimur
pro clystere, cuius decocto commisceas, licet
& lac chalibeatum, siue asininum, siue ca-

prinum, necnon succum plantag. aut centi-
nodia, quæ famigerata est fluores alui so-
pire.

Syr. ante cibum myrtinus, de sorbis im-
maturis cum pulu boli arm orient. aut terra
figill. aut corall. rubr. vel si impendio vis ad-
stringere cum trochiscis de carabe, vel de
spodio ana dr. i.

Philonium quoque Romanum, aut Persi-
cum dra. i. dissol. in aq. plantag. op j solius er-
gò pro mirabili styptirio habetur.

His omnibus si non se summittit malum,
præmissio compressiuo, quod Rec. rhab. tor-
ref. nutriti in succ. ros. rubr. vel cydon. decur-
ras ad

Decoctum rad. china, vel in syr. quidem
paratum, vel in simplicem aquæ potionem.

Ad Famem caninam.

Vomitibus æstate prouoca per oxyzacch.
hyeme vero aq. tepida.

Syr. præp. de cortic. citrij, oxym. & rho-
dom. ex sacch. cum aq. betonica, vel aq. me-
lissa.

Medic. pillul. Rec. pill. aggreg. mastich. cū
pulu. hieræ Gal. ex 7. rebus, vel cum agar.
fiant catapocia ex cathart. rosato, vel alias
esto

Bolus, quæ R. tragac. & Diaph, cum iisdem
pulu. hieræ Galeni.

L

Po.

Potus vero fiat cum dec. sen. orien. & agar. misce in colat. syr. ros solut. & Augustini, & Diaphen. noris portionibus.

Cibaria, pingua, & oleosa, quò ferinæ fiat appetentiæ modus.

Hippocrati famem vini potio soluit, quod vinum Gal. interpretatur dulce.

Pill. mastich. & de aloe, quæ interpellatis vicibus exhibeantur pauca dosi ante cenam.

Hyeme mane oxymeli scyllit. æstate simplex, vel syr. de oxyzacch. vel syr. de cortic. citrij, quum scilicet concoctio non sit ventriculo, vel iulep. de cinnamomo, vel syr. myrtinus.

Myrobalani conditæ præcipuè chebulæ, & emblicæ vorandæ cum haustu vini meri.

Concoquentia ex ol. de absynth. destill. vel de spica, vel nardino cum paucò Bals. vel ol. nucis moschatæ.

Emplastrum lo. de Prochyta, vel vtriusque galliæ.

Enemata vero talia sunt, Rec. Diaph. & Bened. ana dra. ÷ cum decoct. comm.

Interdum adde Agar. tenuiter puluerati dra. i.

Tabellæ ex aromatico ros. cum vino odorato.

Extero vero corporis habitu balneum succellarij spongijs ad ventriculum applicandi.

Decoct. ligni sancti, quod corroborat sic
ce;

cerebrum, vt ventriculū.

Ex remedijs reliquis naturalibus sudatorium S. Germani, quod est in Crypta Aniani corroborans æquè, ac euacuans.

Ad Dolorem colicum, & iliacum.

SI materia doloris fuerit flatu infundatur continuo

Clyster. ex oleo chamęm. vel rutaceo, vel ipso rutę succo; si vero fuerit ex causa sicca paretur ex ol. puro, & butyro, fiantque alia pleraque præscripta in curatione melancholia; ex præsentis vero pituitę causa paretur materia clysteris ex Benedicta, & Diaphęn. ol chamęm. melle despumato, & paucō oleo anethino cum decoct. diuretica, vel 4. anodyn. infundatur autem hic idem mane, & vesp̄ri.

Ex decocto 4. anodynorum in hydrelęo receptorum expressas duplices alterne spongię, vel plenas eodem ipso decocto vesicas vaccinas applicito parti dolenti.

Clyster ex capite veruecis exempto cerebro, & contritis vndique ossibus, decoctisq; carnibus ex aqua, donec vtręque sint resoluta, additis in fine decoctionis semin. fęniculi, flor. chamęm, fol. betę, & parietar. ana p. i. semin. ayl. dra. i. caricis pinguib. nu. 12. fol. senę orient ꝑnc. ÷ factam fortem materię totius expressi, nem infunde per oricularium cly-

sterem mane, & vesperi.

Syr. calefacientes, discutientes, & omninò præparantes materiam in ventriculo sunt sy. de cortic. citrij, rhodomeli saccharium, & iulep. de cinnam. cum aqua senic. aut melisse statim à prima die: deindè si nihil emoueat dolor, festina ad

Medicamentum purgans inter calefaciēs, & refrigerans medium, quod

Rec. Cassiæ iantum extr. vnc. ii. Diaphen. vnc. ÷ pulū. hierz, & cinnam ana dra. i.

Adhuc vero vi compellente doloris poculum offer olei amygd. dulc. cum saccharo, & adhibe

Fomenta ex hydrelęo, quod receperit chammem. meliloti senigr. apij, senic. betæ, pariet. q. s. In quod etiā vberimum decoctum fieri potest in fessu, itemque descensus ad

Balneum ex hydrelęo absolutum. ex interioribus vero remedijs primum est

Ius Galli sic parati. Gallum veterem, & vegetum diu fustigatum, & flagellatione longa enectum, deplumatum, & exenteratum, & truncum imple simplicibus ante paratis, quæ sunt, semin. erithami, seu chartami dr. ii. polypod. hermodact. & Turbit ana dra. i. flor. senę orient. vnc. ÷ anys. cum yn. ana dr. i. coniiciantur in ollam plenam aqua: debullitis ad consumptionem carnibus, & facta forti expressione potus offeratur tepens ad lib. ÷ reliquijs vttere pro clysteribus.

Cucurbita magna parti dolenti conglutinata Galeno, & plerisq; omnibus habetur pro incantamento.

Secundo laudat Galenus philonium persicum, vel Romanum, quæ possunt plus semel, & multoties vsitari quoquo pacto in stomachum demissa.

In dolore Iliaco iidem, non alii sunt clysteres, aut auxilia, & ab his statim administratis propere propinandum est ad

Medicam. purgans. quod si febris adiuncta sit, elidatur vena interna dextri cubiti, signo non vano inflammationis iliacæ.

Si sædi vomitus eruperint, in promptu sunt syr. mitigantes materiam, quales sunt syr. de succ. viol. oxyfacch. de succ. cydon. endiu. borag.

Medicamentum ficcum, Rec. Rhabar. vigorati, diaphen. cinnam. singulorū pro ratione, & cum sacch. f. boli.

Pro potu vero manna sua dosi dissol. in suc. ros. pers. sufficienti. & p.

Ex naturalibus balneis dictum est subueni homini, & succus amygd. dulc. extractus recens, ut in colico potus.

Inunctiones abdomine toto ex oleo capparum, vtriusq; lilii, & absynt. an. partes æqu.

Ad Cholera.

Choleræ vomitus si sit ex cruditate curandus est primum ol.amyg.dulc.aduſo ſaccharo, quod ſi non ſufficit

Medicam.purgans in forma ſolida, non autem in potu.nec ex caſſia, quæ ventriculum debilitat, ſed Diacath. cum rhabar. vig. nutrito in ſucc.roſ.perſ. cum pill. hieræ, & Diaphen. quod poſtremum exhaurit cruditates.

Syr.corroborantes de mentha, & iulep de cinnam. & conſect. de cinnam. vnc.i. diambr. dra.i.

Conſectio quoque Hyacinthi, vel Alehermes ex vino bono veteri ad dra.i.

Si ſit ex materia calida ſyr. de oxyſacch. de granatis medii ſaporis de pomis, & de ſucc.borag.cum pulu.margar.prepar.& cum ſoliis auri.

Lapis item Bezahar, ſiquidem imminet periculum ſyncopes.

Fomenta ad ventriculum ex decocto roſ. incompl.rubr.cortic. citrii, cinnam. caryophyll.quæ coquantur parum in vino vernacio, expreſſis ex hoc ſpongiis vtere.

Emplaſta, atq; vnguenta adnotata iam in curatione vomitus, & nauleæ.

Et quoniam eſt ſæpe numero partium extremarum frigiditas, vtitor iſdem fomentis, quæ

quæ nuper in curatione syncopes habuisti.

Ad Inflammationem Iecoris.

NVnc parte gibba, nunc caua, phlogosis, & accensio comprehendit hepar: sed eadem est plane forma curationis.

Sanguinis emissio è dexteri lateris iecora-
ria, iniecto tamen prius enemate ex cass. &
melle viol. & decoct. comm. si vires sint va-
lidæ, sanguis in bene multa extrahitur por-
tione.

Syr. reprimentes de cichor. de oxysacch.
de succ. endiu. cum aq. borag. & acetos. sem-
per nimirum immistis stypticis, quæ visceris
laxitatem tueantur, ex Gal. 13. meth. & alibi.

Altera venæ sectio, si non sequutum sit le-
nimen ex priore. Porro Galenus præcepit
vsque ad animi deliquium effundi sanguinẽ,
sed hic inter nos vsus exsoletus est.

Medicamentum item conuenit lenitium,
non scammonio validum. At manna dissol-
uitur in iure pulli, vel ex succ. viol. cum succ. ros.
pers. vel ex cass. recent. extr.

Cautio Mesuæ. Remouenda, quæ maximè
refrigerant, vt claudentia poros, & exasperã-
tia inflammationes.

Inunctiones ex ol. amygd. dulc. recent. tepi-
do, validiores ex ung. santal. cum succo sem-
peruiui, & suc. cichor. & acetos. ros. prohi-
bet Manardus: nempe refrigerant hæc abso-

lutē, & multo amplius cum aceto.

Probantur autem inunctiones aliz ex vnguento ros. & populeo cum suc. plantag. aut cichor. misto; quippe quæ sunt ad lenitionē, & mitigationem.

Sunt & epithemata non illaudata, Rec. viol. ros rubi. fol. aut florum nymphææ ana. p. i. santal. omnium ana. dra. ii. aqu. cichor. borag. & succi solani, & lactucæ ana vnc. iiii. aceti destill. vnc. ii. parum bulliant; & ex panno lineo leuiter expressa multoties applicentur.

Postquam administrationem illinico partem vnguinibus, & oleis commodatis, quæ post sanguinis emissionem exordio fuerunt præscripta.

Viribus adhuc constantibus à repetita sanguinis educatione, atque alijs per enemata perque cathartica quantumvis lenia, deiectionibus

Decocto vtere discutiente adhuc modum parato, Rec. chamæm. melilo. fenigræci, & lemnii, cichor. fumar. & plantag. & absynth. ana p. i. bulliant in aqua cisternæ suffic. ad vltimam emolliationem. extractæ portioni per fetaceū adde pinguedinē gallinæ, ol. ros. compl. ol. cydon. ana vnc. ii. materia ad cataplasmatismatis formam adducta iecinoris partem obducito.

Ab his medicamenta sunt vim habentia, refrigerandi, ac deducendi per vias vrinæ, quæ

quæ & hac ratione leuare queunt. huiusmodi sunt aq. capill. vener. vel asplenij, quod alias dicitur ceterach.

Præterea feruorem attemperant iulep. ros. & viol. cum aq. hordei. vel aq. capill. vener. vel ceterach. quibus & uti poteris à primordio pro syrupis.

Ab exordio vero ad vsque calcem poter aquam hordei languens.

At debilissimo ventriculo conceditur vinum olygophorum aqua dilutum medicata.

Accedunt & auxilia, quæ comprehensa sunt in syncopes curatione, ubi viderimus decumbentem diffudere sudore diaphoretico; pulsus aboleri; & extrema corporis algere, ac vires denique vitales extremè languere. Quibus angustis, aliisque decessibus restaurantia, & calorifica, seu dixeris refouentia, valent occurrere, facereque quominus inscirrhum. transferatur remissa nimium hepatis inflammatio.

Ad Dysenteriam.

Est sanguinis emissio sumpta primum in indicatione à causa .i. ab hepate floris autore, sed injecto prius enemate ex iure puli vitellis onorum, & sacch. rubro. Postridie secetur vena interna dexteri cubiti.

Syr. de miua cydon. & portul. & de suc. ci-chor. cum oxalidis aqua.

Me-

Medicamentum compressium. Rec. thamarind. vnc. \div cort. myrobalan. omnium an. dr. iiii. torment. dr. ii. fiat decoct. in aq. acetos. Dissol. mannæ electæ, vel sacch. viol. vnc. iiii. rhab. sine spica inf. in vnc. iiii. succi ros. rubr. vel in aq. de v. infus. ros. rubr. colati, & fort. expressi dra. ii. triph. persicæ dra. iii. m. fiat potus.

Imponitur triphera, quia nunquam inducitur dysenteria sine febre valida; torment. propter malignitatem, & acrimoniâ syrupi.

Enema confortans ex lacte chalibeato cū succo centinodiz, vel plantag. cum ol. rosar. omphac. vel cum ol. cydon. cum adipe veruccino, cumq; vitellis ouorum dissol. in iure pulli. Quod si non sufficit vtere bened. & sue. ros. rubr. vetustissima adipe, nunquam omissa veruccina.

Aliud enema. Rec. malic. balaust. myrtill. acetos. & plantag. & ros. rubr. ana p. i. poma cupressi ruditer contus. nu. 3. boli arm. orien. dra. iii. fiat decoctum: materiæ fort. expressæ, adde simplicia ante memorata: habes enema, quod si fluores reprimere non valuit;

Rec. hippacis vetusti minutim concisi, infunde quinquies, vel septies in sufficiente aq. pluuiæ, vel cisternæ, decoque vna cū placentulis subtilibus crudis frumentaceis in iure pulli, donec utræque materiæ fuerint dissolutæ. Colatis ipsis adde gummi arabici vnc. i. lūs in intestinum infunde calidum

dum pro tenesmo desperato.

Sed in non tam extremo placentulas triticeas ipsas licet incoquere in iure pulli, vel aqua fabrorum ad vltimam dissolutionem.

Fieri solent & infernè suffitus ex hac materia, Rec. malicor. balauſt. plantag. & acetos. portul. verbaſci, myrell. & roſell. rubr. imatur. ana p. i. pomor. cupreſſi bene contritor. p. ii. bull. in ſuffic. portione vini rubri fomenta.

Fiunt & ſorus pro tenesmo cum coniuncta in pueris ani procidentia: qui faciunt, vt corroboretur muſculi, & introſum retrahantur: factis inſuper vnguinibus ex ſeuo veruecino, & deſuper inſperſa tritura panni purpurei, ſive ſcartati ſeu raſuræ eius exuſti.

Aſſula poſt hæc, ſive tabella tiliz, cupreſſi, vel pinus, vel abietis, lariciſue ad podicem, appreſſa, vel vt in ea ſedeat calida vſque dum refrigeſcat, mox illito ſeuo veruecino, vel cerato comitiſſæ deſcriptione Montagnanæ.

Quod ſi dolor, atq; tenesmus ſit implacabilis modica portio Philonii perfici, vel Romani. Atq; hæc in ſede inferiori.

In abdomine vero ſuperiore illitus ex ol. maſſich. & ex cerato Comitiffæ, quod eſt vnice ſtypticum, & roboratiuum. Inunctæ vero particulæ inſperge puluiſculum ex maſtiche, cinnam. & corall. rubr.

In vniuerſum autem ante prandium, & ante cenam reſoluendus eſt ventriculus cymis

mis absynthii viridis cum irrorato vino protropo lacryma dicto super laterculo feruido volutatis, & pręcalfa&is. vel

In vino rubro sufficienti decoq. cydonia duo, vel tria ad extremam eorum dissolutionem. extenduntur forma cataplasmatidis in paano linteo parti fouendę analogo: insperge pulveres adstringentes, & roborantes. cataplasma pulvere vigoratum impone stomacho mane, ac vesperi multos dies.

Laudantur item Sacculi, qui Rec. vtr. mērhę absynth. ros. rubr. cortic. citrii ana p. ii. ligni aloes santal. omnium mastich. corall. rubr. ana dr. i. car. oph. dr. i. omnia crassiusculo cribro secernantur, vnde fiant sacculi ad formam scuti, quorum duo made facti mero vernacio, & expressi stomacho alterne imponantur, tertius vero focus in longum detineatur.

Mirabile quoq; remedium est ad tormina omentum recens exemplum ē mactato nuper veruecis ventre, & calidum superdatum, & ante prandium mane, & vesperi ante cenam. Quod si iam tum calidum omentum haberi non detur: tunc

Rec. aquę myrt. lib. i. plantag. & aceti modicum bull. & calidum inde factum omentum stypticis inspersum pulueribus applicetur, vel applicetur

Emplast. quod Rec. mastich. vnc. i. extenditur in aluta cum ol. nardino fiat emplastr. ad

formam scuti pro stomacho; vel imponatur emplastr. D. Io. de Prochyta.

Perdurante amplius dysenteria, syr. exhibe myrtinum, vel de acetos. cum pulu: troch. de carabe, de spodio, & pulu. bol. arm. oriēt. & aquæ cisternæ parte aliqua. vel offer

In potû aquâ aceto tinctâ, ac decoct. myrob. citrin. & chebul. & indorum, tum quidē in prandio, tum in cæna, interdium etiam vtendam.

Secundum medicamentum purgās compressiū exhibendū ex Rhab. sine spica torrefact. cum aliis rebus ante descriptis.

Galenus sermone de dysenteria de lacte docet, lac præcipue caprinū, seu candentibus ferreis ignitabilis, seu torridis iniectis sæpe filicibus fluuiialibus castigatum, auxilio magno futurum, si tantum febris absit; vel hæc fuerit remissa.

Ad hæc 10. diebus voratus puluis rhabar. torrefacti, & cum saccharo rosato veteri permisti mirificus est. Denique decoctum radicis chinæ non postremum erit præsidium, postremo sumptum.

Decoct. quoque chinæ paratum, solenni forma non mediocriter iuuat.

Ad Hydropem.

Primo si sit hydropi adiuncta febris seca venam iecorariam, quando iecur alget algo;

algore proprio ; excalescit vero calore alieno, & extraneo

Gal. 5. de loc. aff. c. 3. docet, hydropē nullum esse simplicem, sed compositum cum alijs hydropis differentijs, denominari vero vnum ex causarum eius exuperantia.

Post sanguinis emissionem, præparationi valent sy. bizantinus, sy. de rad. rhodomel. ex sacch. aquę beton & in tympanite, seu flatuoso probantur aquę fęniculi, vel melissę.

Medicamentum purgās, & ec. pill. aggreg. agar. troch. pill. de rhab. opt. vig. dosibus cōsuetis. adde rad. iridis dra. i. vel amplius vbi vires ferant.

In potu vero, Rec. Agar. troch. dra. i. sol. sen. orien. dr. i. ÷ flo. cord. p. i. decoq. in aq. capill. vener. & in col. diss. sy. Niphi. vnc. ii. diaphzn. vn. ÷ m. Deindè paretur

Decoct. ligni sancti, Rec. lig. indicis rasi, & radicis zarzæ. præp. ad vn ii. cort. eiusdem ligni, & sol. senz orien. ana dra. iiii. ceterach. capil. ven. soldanellæ, flor. borag. stz ch. sãpsuchi, & beton. ana p. i. cort. rad. fęnic. & apij rad. petros. & capp. an. vn. i glycyrrh. præpar. vn. ÷ semin. fęnic. & anyl. ana vn. ii. Infundenda infund. per 24. horas in lib. vi. aq. fontis, fiat decoct. sec. art. ad consumpt. duarum part aq. & facta colat. seruetur pro syr. Dosis sit lib. ÷ continua medicamentum 40. dieb. cum victu carniū assarū. Interpone decimo quoque die pillul. ante præscriptas vsque
ad

ad finem dierum quadraginta.

Decoctum vero pro assiduo potu in mensa, & extra fit hoc.

Rec. ligni guaiac. limati, & rad. spartæ parillæ minutim concisæ ana vn.i infun. in lib. vi. aq. font. per 24. horas, fiat decoct. ad consumpt. tertiz part. aq. adde ceterach. capill. ven. soldan. ana p.i. coriandr. præp. vn. ÷ cin. nam. elect. & glycyrrh. parum contusæ dr. iii. colatura seruetur pro potu.

Inunctiones abdominis totius crebras fac ex hoc cerato, R. ol. vtriusque lilii, ol. capparium, ol. absynth. ol. amygd. amar. ana vn.i. Vnguenti Arthanitæ, & suc. cyclaminis ana vnciam i. ÷ adipis gallinæ vn. ii. ceræ quantum satis, fiat vngu.

Perdurante languore pill. de mezer. paulò ante prandium pro qualibet vice dra. i. ad 30. dies formandæ cum suc. iridis à summo ipso mane præparato, & 4. ab hinc horis erit in languente refoueri prandio: cibi vero vehiculum aqua decoctæ soldanellæ.

Clyster. lenientes, ac discutientes ex capire veruecino componendi, quemadmodum in curatione colicæ dictum fuit.

Cataplasma ex cochleis terrestribus cum testis earum in mortario validè contritis in amplo panno distentum, & abdomini calidum impositum 4. horarum spatio detinetor, creditur aquas per lotia mouere. Hollerius lumbis vult adh. bendum.

Discutiens, & aquas mouens. Rec. fimi caprarum lib. i. rad. fanic. rad. apij, rad. petros. rad. brusci, & rad. capparum, & panis azymiana vn. ii. capill. vener. & absynt. ana p. ii. bull. in suff. portione aquæ, donec emolliantur, ex hac omni materia perbene contusa, aut per setaceum transmissa f. cataplas. abdomini superiori distendendum.

Aqua decoctionis cinnam. in vase duplo, seu balneo Mariæ cunctatius confecta, præsertim aduersatur materiæ flatulentæ.

Sudationes Aniani, & arenationes Aenariæ valentissimæ sunt.

Aqua aduecta de balneo Lucensi lib. vi. quotidie pota. per vrinæ vias ocysime secedens xv. dierum spatio tumorem leuare potis est, si per initia vegeto iam ægroti calore hauriatur.

Ad Scyrrbum Iecoris.

SVb plethora sanguinis emissio tuta est. Diuretica vero summopere commendantur à Galeno plerisq; locis.

Syr. oxym. & rhodom. ex sacch. sy. byzantinus, aut de 4 radicibus.

Medicam. purgans, Rec. flor. cord. p. i. agar. troch dra. i. fol. senz orient. vn. ÷ Rha- pont. vnc. ii. f. d. in aq. capill. ven. & in colat. dissol. syr. de cichor. Nicol. vn. iii. Rhabar. vig. drach. ii. infusi in vn. iii. suc. ros. persic.

Dia-

Diacath. Arnaldi dra. vii. Rhabar. dra. ii. parum nutr. in succo ros. persic. cum saccharo, fiant boli.

In forma vero pillulari, Rec. Agar. trochisc. Rhab. vigorati, & pill. aggreg. ana dra. i. cum cath. ros. 7 pill. formatae deaurentur.

Fomentum emolliitium, Rec. maln. althææ violariæ, capil. ven. ana p. i. rad. cichor. petros. apij, cappar. ana p. i. absynth. p. 2. bull. in aqua pura sufficere, adde cyathum vini odorati, fiat decoctio secundum artem, inde epithema, quo vtere maditatis spongiis ad partem affectam.

Ad linimenta, Rec. ol. vtriusq; lilij, adipis vituli ana vnc. iii. cum cera sufficiente, fiat linimentum.

Emplastro, Rec. gummi ammoniaci, Bdellij ana dra. iii. macerentur aliquandiu in aceto, dissolue ex oleo de absynth. oleo mastich. & ol. ros. omph. an. vnc. ii. vtere mistura ad iecur emolliendum.

Sy. dicti magistrales, Rec. succi cichor. depur. lib. ii. in eo bull. comæ absynth. p. i. Rhabar. vigorati tenuissime contriti dra. ii. factæ decoctionis fiat fortis expressio, addita sacchari sufficiente portione, paretur syr. longus, de quo sumantur vnc. iii. in singulos vsus.

Electio, Rec. pulpæ peæ. gall. vnc. iii. sem. mel. dr. ii. pulu. troch. de eupator. & de Rhab. ana dr. i. sacchari albi diss. in aq. capil. ven. & meliss. fiant elect. in osellis, quæ vorentur

mane cum aq. capill. ven. in qua sit infusum
Rhab. vigoratum ligatum in pupatella.

Aqua ceterach. interdiu, & à cibo.

Hyeme vero interior mica cōtrita rhabar:
hausta cum vino albo bene odorato, vel
etiam Rhabarbarum ipsum commansum vi-
no odorifero superpotato.

Vel denique deuoret pill. de rhabarb. &
pill. aggreg. ana dra. i. mane.

Vel syr. de Eupatorio compos. vel de ci-
chor. Nicol. ad vnc. ii. quæ si non sufficiant

Decoctio vtitor sarzæ minutim incisæ vnc.
iii. infunde 24. horis in lib. iii. aq. font. fiat de-
coct. in aquis prædictis ad consumpt. me-
dietatis, adde flor. cord. capill. ven. ceterach.
ana p. i. sol. senæ orien. vnc. ÷ Rhapont. eupa-
tor. mastich. dra. iii. cortic. rad. petros. apij
capp. aspara. senic. tamar. brusci endiu. ci-
chor. ana vnc. ÷ absynth. p. ÷ confecta de-
coctionis expressio, paretur in sy. de quo dato
lib. ÷ in singulos vsus.

Decoctio spartz pro potu, Rec. spartz pa-
rill. præp. vnc. i. fiat infus. in lib. xv. aq. font.
die naturali decoque ad consumpt. tertie par-
tis, addito in fine glycyrrhizæ parum contus.
cinnam. ana dra. iiii. ceterach. capill. ven. ana
p. i. ÷ facta colatura seruetur pro potu, quo
decocto vtete 30. diebus cum victu carniū
assarū, & aliorū siccorū, quæ possunt exhiberi,
non obstante, quod hæc non obstant mor-
bo, qui gaudet humidis. nam huius origo fuit
in;

infarctus, & ex plenitudine cruditas, quæ duri-
ritiem induxit, & fouet.

Naturalia remedia nõ omittenda, è quibus
Balneum est succellarij dictum, roborans par-
tes naturales, & deobstruens, & calfaciens. in
hoc affectu nos ait vti debere roborantibus;
atq; discutientibus 14. meth. Gale.

Ad inflammationem Lienis.

VEnæ sectio finistri brachij, quæ compe-
tit vnicuique reprimendæ inflamma-
tioni.

Sy. de succ. endiu. & borag. capill. ven. ana
vnc. ÷ aq. cichor. vnc. iiii. m.

Medicamen. purgans quarto, vel sexto die
manna cum succ. ros. persic. vel cass. & sac-
char. viol. dissoluta in suc. ros. persic.

Inunctio ex ol. viol. & ros. cum adipe gal-
linaceo, vel anserino.

Fomenta, Rec. maluz, althææ, viol. ros. rubr.
cichor. flor. borag. ana p. i. ferue in sufficienti
aqua fontis: madidis ex ea spongijs fove
partem.

Item, Rec. ol. rosati, viol. de absynth. ol.
cydon. & myrtil. ana vnc. i. adipis anser. vnc.
ii. ceræ q. 5. f. ceratum.

Hirudines affigendæ sedi.

Aqua Cochlear. terrestrium destillatarum
vtere cum saccharo.

Elect. Rec. sem. melo. vnc. iiii. diamarg. fri-

gidi, & electuar. santal. ana vnc. i. sacchari albi, dissol. in aqua capil. vener. sufficienti, fiat elect. secundum artem. deudretur ex his offellis vnc. i. cum aqua ceterach, vel capil. vener. superpota.

Possēt etiam æger vti mane multiplici cōferua refrigerante, quales sunt conf. buglosborag. ros. persic. & ros. rubr. & viol. ana partes æqu. quibus ingestis frigidam superpottet aq. cichor.

His non conferentibus accedit sectio saluat. inter digitum anulare, & auricularem.

Et quia post lienis inflammationem solet insequi obstructio, & scirrhus, hæc duo sunt cauenda, quemadmodum capite proxime sequenti.

Ad Scirrhum Lienis.

Syr. byzantinus, syr. de trib. vel de 5. radicibus, oxym. simpl. cum aqua ceterach, vel capill. ven.

Medicam. purgans, Rec. pill. aggreg. rhab. vigor. & agar. troch. ana dra. i. form. pill. 7. cum cath. ros.

Apozema post 4. horas, Rec. syr. ros. sol. vel syr. cichor. Nicol. vnc. iiii. aquæ melissæ modicum.

Potab. medic. Rec. Agar. troch. dra. i. sol. sepe orient. vnc. i. fiat decoct. in aq. capill. ven. & in colatura dissol. syr. cichor. Nic. vnc. iii.

Rha;

Rhabar. vigorati infusi in vnc. iiii. succi ros. persic. colati m. & fiat potus.

Vnctiones ex oleo vtr. lilij, de cappar. & de absynth. ana vnc. ii.

Fomenta, Rec. Ceterach, capill. ven. rad. tamar. fenic. apii, petros. radic. cappar. mal. uæ althææ, asparag. & absynth. flor. chamem. fenigr. semin. lini ana p. i. caricæ ping. nu. 12. fern. in hydrel. & expressis ex eo spongijs vtere in fomentum.

Linimentum, Rec. vnguenti arthan. succi cyclam. ol. amygd. dulc. & amar. vtriusq; lilij, & olei capparum, & olei absynth. ana vnc. i. adip. an. vnc. iii. ceræ pauculum m. fiat vng.

Syr. magistrales, Rec. rad. chinæ concisæ vn. ii. fiat infusio in lib. vi. aq. font. inde decoctio secundum artem ad consumpt. mediet. aquæ. adde in decoct. ceterach, capil. ven. rad. tamar. fenic. apii, petros. endiu. asparag. ana p. i. sol. senæ vnc. i. absynth. p. ÷ fi. syr. longus.

Rhabar. vig. subtiliter puluerati dr. ii. agar. troch. subtiliter contusi dra. ÷ factæ decoctionis fiat fortis expressio, & addito saccharo sufficienti paretur syr. longus, cuius potus est vnc. iii. in longos dies.

Balneum succellarij.

Pro aqua pura præstat asplenij, vel capill. veneris decoctum.

Demum hirudines venis sedis affigendæ, & fonticulus ad internum sinistrum poplitea est postremus.

Ad Inappetentiam.

HÆc si dependeat à calidis humoribus,
 syr. sint oxy sacch. syr. de gran. dulc. de
 suc. cichor. endiu. lupul.

Medicamentum vero purgans esto *Casia*,
 vel manna dissoluta succo ros. persic.

Si vero fiat hepatis vitio, sanguinis emissio
 ex dexteri brachij vena interna, & subinde
 medicamentum præscriptum.

Electuaria cum aqua acetosæ, vel scorsio-
 nariæ.

Linimenta ex ol. amygd. dulc. olei absyn-
 thij, & ros. omphac.

Diamarg. frig. exhibe summo mane ad
 dra. i. vel

Elect. de gemm. eadem portione.

Si verò dependeat affectus à frigidis hu-
 moribus, vomitus vt supra monui, prouo-
 candus.

Syr. oxymeli simplex, Rhodomeli saccha-
 rinum, syr. cortic. citrij, syr. de pomis cum aq.
 beton. vel melissæ superpota.

In forma potabili medicamentum, Rec.
 sol. senz orient. vnc. ÷ agar. troch. dra. i. flor.
 cord. p. i. fiat decoctio in aqua betonic. & in-
 suffic. colatura diss. syr. ros. solut. vnc. iiii. syr.
 Augustini vnc. iii. Diaphen. vnc. ÷ & non
 colat. misce, fiat potus.

In forma pillulari, Rec. pill. aggreg. agar.
 troch.

troch.& Rhab.vigorati ana dra.i. form.pill.
cum cathar.roſ.n.7.

Vnctiones externæ ex ol.maſtich.& ol. de
abſynth.ana vnc.i.÷ ol.nucis moſc.dra.i. ce-
ræ modicum m.fiat linim.

Emplaſt.Ioannis de Prochyta,vel vtr.gal-
liæ,vel empl.de maſtich.

Ante prandium ſyr.de mentha cum ſyr.de
cort.citrij,item iulep de cinnam. vel confe-
ctio de cinnamomo, nec non cum oleo any-
ſorum in tabellis.

Auxilia denique omnia ſuperius adnotata
pro vomitu,quales ſunt ſacculi fomenta, &
vnguenta.

Interpellatis vicibus pill. maſtich. & pill.
de aloe præp.ad dra.i.ingere ante cibum
mane.

Si ex obſtractione,ſyr.de abſynth. de Ar-
themys.

Medicamentum purgans deſcriptum in
forma pillulari.

Vinum de abſynthio,& ol.de abſynthio.

Rhabarbarum pulueratum ex vino albo
odorifero ſummo mane.

Pro potu aqua ceterach, & poſtremo

Decoctum chinæ,vel ſarzz,&

Balneum ſuccellarij quaſi pro ſomento.

Ad Obstructionem hepatis.

Obstuſtio ſi ſit per eſſentiam, ſectio Ieco-
rariz dextri cubiti.

Syr. oxymeli de 3. vel 5. radic. cum ſucco
endiu. cum aqua capill. ven. Hyeme vero ſy.
byzantinus de 3. rad. rhodom. zuech. cum
aqua ceterach.

Medicamentum purgans, Rec. flor. cord.
p. i. Agar. troch. dra. i. ſol. ſen. vnc. ÷ fiat de-
coctio in aqua ſcorſon. & in colatura diſt. ſy.
D. Auguſtini, & ſyr. viol. ana vnc. iii. rhabar.
opt. vigor. dr. ii. in ſuſ. in vnc. ii. ſuc. roſ. perſic.
colati, & expreſſi m. fiat potio.

Hyeme medicamentum pillulare, Rec. pill.
aggreg rhabarb. vig. & agarici troch. ana
dr. i. form. pill. 7. inaurata.

Post 3. horas, Rec. ſyr. de cich. Nic. & roſ.
ſolutiu. ana vnc. iii. cum aqua ceterach.

Vnctiones ad hepar. ex ol. de abſynth. &
amygd. dulc. ana vnc. i. ÷

Syr. magiſtrales. Rec. ſuc. cichor. ſylu. lib. ii
bull. lento igne, & add. ſol. ſenæ orient. dra. iii.
abſynth. p. i.

Rhabarb. ſubtil. puluerati dra. ii. ſi decoct.
mox colatura, tertio fortis expreſſio, adde
ſacch. ad ſuff. fiat ſyr. longus, de quo ſumat
languens vnc. iii. mane.

Aqua decoctionis ceterach in omnem
uſum potionis.

Vn-

Vnguentum, Rec. Ammon. dissol. in aceto vnc. ÷ olei de absynthio, & amygd. dulc. ana vnc. i. ÷ omnia simul dissol. cum paucula cera fiat ceratum molle.

Electuaria, Rec. sem. melon. vnc. iiii. adde elect. diatrium santal. ana dra. i. sacchari albi dissoluti ex aqua capill. vener. quantitate suff. fiat elect. cum vnc. iii. aq. capil. ven. in qua infusum fuerit rhabar. in papar. cuius dosis sit vnc. iii.

Hyeme rhabarb. in substantia mansum cum haustu vini odorati. rhabarbarum ubi mandere non possit ægrotus, idem ipsum tenuissimè tritum ingerat ex vino.

Est & mane commodus syr. de cichor. Nicol. cum sy. byzantino composito ana vnc. i. ex aqua decoct. ceterach 10. diebus pota.

Syr. vehementiores de aceto scyllitico, & oxymeli scyllitici cum aqua ceterach, vel capill. ven.

Pill. vehementiores aggreg. de rhabar. vigorato, pulu. hieræ, de quibus sume mediocrem portionem; fiat autem massa cum sy. de cichor. Nicolai.

Pro potu deinde cape, syr. D. Augustini, cum syr. Nicolai.

Si verò persistat etiamnum morbus, & iam inueterauerit;

Decoctum accipe sarzæ, in quo simplicia diuretica sint decocta.

Balnei succellarij vsus 7. diebus, quo medio

dio tempore sumat languens rhabarb. vel iā substātia, vel bene pulueratum, vt ante monstratum est.

Rhapontici demum vsus longus, quod est mirabile.

Ad Suppressionem vrine.

EA si vitio sit vesicæ debilitatæ sectio, venæ iecorariæ, vel cuiusq; reliquæ venæ non videtur conuenire, sed potius corroboratio partis, & primo

Medic. purgans ex casia, & diaph. hiera. Galeni cum pulu. glycyrrh. cinnam. vel

Forma potus, Rec. Diaph. vnc. ÷ dissol. in suff. sy. de cichor. Nicol. adde pauculam aquā fēnic. m.

Fomenta, Rec. flor. chamēm. melilo. fēni-græci, sem. lini, sampsuchi, beton. ros. incōpl. ceterach, & capill. ven. flor. stēchad. absynth. ana p. i. feruēāt omnia in suff. vino albo odor. spongijs ex hoc expressis fiat forus.

Inunctiones loci male valentis ex ol. chamēm. oleo de absynth. ol. de spica, & oleo de hyperico.

Suggere vero per os, quæ vim habent incidendi, & corroborandi, quale est oxymeli simplex, vel scylliticum, rhodomeli cum saccharo, vel oxysaccharum.

Pillulæ, quibus corroboratur cerebrum, & partes neruosæ, sunt huiusmodi; pill. cocc. agar.

agar.troch.formentur è syr.de stæchade.

Secundo pro potu, Rec.syr.D.Angustini,
& syr.de 9.infus.ros.perf.vel syr.ros. per sen-
nam.solutiuarû. Poteris & manu.perinde ac
vtrem emungens, vrinam elicere.

Vnguentum ad pubem, & vesicam esto,
quod Rec.ol.vtr.lilij,olei capparum, ol.de
absynth.ol.de spica,ol.de hyper.ol.de lumbr.
ana vnc.i.ol.nuc.mosch.dra.ii.adipis anseris
vnc.÷ cum paucula cera fiat ceratum,vel

Re.4.anodyn.farin.lupin.& sem.sinap.ana
p.i.feru.in aq.cum his in mortario pistentur
adeps vetus gallinæ,vel potius anseris, oleo
guttatim instillato de spica ad vnc.ii.f.catap.

E diureticis necessarijs præsentè calculo,
vel arenulis,vel limo crasso, vel grumo san-
guinis in canali vesicæ,primû est Electuarium
Iustini ad dra.i.ex vino.

Mox pulueres hi,Rec.pulu.ononidis, milij
solis,lapidis Iudiaci,offiû cerasorum, mepsi-
lorum, dactyl.ana dra.ii. Quum opas est ac-
cipe pondo dra.i.ex vino odorato.

Proficit & flatulentiz lorum supprimen-
ti confectio de dianysso, vel tabellæ ex oleo
stillatitio anyforum,& saccharo, & aqua fa-
niculi secundum artem paratæ: item elect.è
cinnam.

In vniuersum vero casiz flos glycyrrhiza,
& semê maluz, & halicacabi, seu alchechen-
gi,laxant vrinæ vias.

Pulueres laudati tali leporis adusti. lauda-
ta sunt &

Fomenta, quæ comprehendunt hæc; rad. iridis, petrosel. apij, asparag. capp. borag. ci-chor. ceterach, capil. ven. ana p. i. ferueant in albo vino sufficiēte, in quod orificij amplioris vase receptum infundantur penis, & testes aliquandiu: mox absterfi, & exiccati deliniantur oleo de scorp. amygd. amar. & oleo irino ana vnc. ÷

Elect. Rec. sem. melonis, & semin. maluz, & semin. lini, glycyrrh. contusæ ana vnc. i. milij Solis, lapidis ludaici curiose pulueratorum ana dra. ii. sacch. albi dissoluti aq. capill. ven. portione, quota sufficit, fiant electuaria secundum artem.

Potus aque ceterach, & capil. ven. in potu.

Rhapontici pulu. in albo vino sufficienti. noctu infunde, mane colatum humorē hauri, qui maximè iuuat.

Balneū de subuepi homini, vel huius forte defectu, balneum ex oleo puro, vel balneo facto ex hydrelgo, in quo serbuerint, quæ superius adnotauimus.

Decoctum spartæ tum in syr. tum in potu ex memoratis sæpe diureticis paratum.

Destituto remedijs languente, & in casu lapidis explorato, consultum est secari inter anum, & testes, ubi collum est vesicæ, & inde calculum eximi. nimirum expedit languentem in vita cū fistula seruari, prius quā biduo, vel triduo miserabiliter perire. Sed facta protestatione quandoq; id ego permisi.

Ad Diabetem, siue vrinę incontinentiam.

IN recēti Diabete, & acri materia venę se-
cio dextri cubiti, atque infimul.

Syr. de suc. cichor. de miua cydon. cum
aqua plantag. aut acetos.

Medicamentum purgans, Rec. thamar.
vn. i. cort. myrob. citrin. chebul. & ind. ana.
dr. ii. fiat decoct. in aqua acetos. & in sufficiē-
te colatura dissol. mannę electę corp. vel sac-
chari violati vnc. iii. rhabar opt. sine spica
dra. ii. infusi in vnc. iii. succi ros. persic. vel
aquę ipsarum m. fiat potus.

Vicius ratio inculcata, & opt. sint cibi de
bipedibus, & auiculis.

Potus aquę cisternę chalibeatę.

Vnctiōes ad renes ex ol. ros. omph. myr-
tino, & vnguento comitissę, vel seorsim sin-
gulis, vel mistis.

Per os syr. de ribis, myrtinus, de portul. &
acetos. de miua cydon. cuicunq; additis pulu.
boli arm. orient. corall. rubr. troch. de carabe,
& de spodio.

Emplast. Rec. pulu. ros. rubr. myrti bacca-
rum, boli arm. orien. mastich. coral. rubr. san-
guinis dracon. cortic. castan. assarum ana.
dra. i. ÷ farin. hord. p. i. ol. myrtini, & ros. om-
phac. & mastich. ana dra. i. ÷ pulu. myrob. ci-
tr. chebul. & ind. ana dr. ii. omnibus tenuis-
simè contritis, & addita terēbinthina, & vi-
sco

seo quercino sufficiente materiam deduc ad formam emplasti secundum artem, quod in aluta extēde oblōga quadrata. Hoc medicamentū mirabile est ad remorandā, & digerendam materiam serosam, & alias, & ad sētum in vtero retinendum.

Poterit & egger mane myrobal. citriais vti. Ad hæc intret

Balneum aquæ dulc. modicè calefactæ, & accipiat ad lumbos stillicidium ex hac materia.

Rec. malicorij, balauft. myrt. baccarum, pomorum cupressi, plantag. acetos. ros. rubr. ana p.i. feru. in aqua fabrorum sufficiente, licet ex hoc quidem fieri fomentum in regione renum, sed præstantius est stillicidium incidens ex alto loco.

Sic Balneum de la Goccia, quod est Puteolis propè Sulphatar. commendatum est, & ita dictum, quod guttatim erumpat è saxo.

Potest & ad vsum componi ex simplicibus ad hanc rem facientibus.

Rec. prædicti balnei lib. iiii. aq. myrt. vel ros. rubr. libr. ii. misce, & modicè calefactæ cura ut ex ahenò vasculo cadant in renes guttatim, vel si corpori subsit intemperies, balneū intret, quod dicitur Balneoli.

Si Diabete nihilominus perduret, venæ sectio nullius est vsus, at sudores certo erunt emolumento: verūtamen adhibito prius medicamento purgāte ministret sibi balneum istud

Rec.

Rec. Ceterach capill. ven. rad. cichor. tam. mar. s. nigr. sem. lini, s. nic. apij, petros. ana. p. i. feru. in aqua sufficienti in lebetes mediocri ponat pedes æger, & hac foueat partes affectas.

Eo vero tempore languens ponatur supra grabatum benè coopertus excepto capite, vt halitu vaporis illius aperiantur pori sic, vt emanet sudor: quod estuarij genus continuet ægrotus ex diebus: nutriendus interim optimis eibis.

Sed vbi vitium priuatum sit colli vesicæ, priuatim etiam, & propriè debemus his auxiliari, atque vbi sit ab vlceris acrimonia, per iniectiones, & remedia extrinsecus attēperantia, & digerentia diu resouenda pars est, quæ inter anum, & penem est sita.

Ad calculum renalem, & vesicæ.

Sanguinis emissio secundum virium renorem est moderanda, de interna dextri cuti iccoraria.

Syr. præpar. & incidentes materiam crassâ, qualis est syr. de 5 radicibus, & oxym. simplic. Et si materia fuerit impense frigida rhodomeli saccharinum, de 3. rad. Gentil. sine aceto, syr. de malua, syr. capil. ven. cum aqua ceterach, vel graph. vel capil. ven.

Medicamentum purgans in potu, **Rec.** radic. glycyrrhizæ ruditer contusæ dra. ii. fiat de-

decoct. in aqua capil. vener. & in colar. dissol.
 manna elect. corp. vnc. iii. vel sacc. viol. vnc.
 iii. vel pulpæ cast. recent. extra. per setam
 vnc. i. ÷ syr. de cichor. Nicol. vnc. ii. rhabar.
 vig. dr. ii. infus. in vnc. iii. succi ros. persic. co-
 lati, & expressi diacath. Arnal. vnc. ÷ misce
 fiat potus.

Bolus, Rec. pulpæ cast. recent. extra. per se-
 tam vnc. i. diaphen. dra. vii. pulu. glycyrrh.
 ononidis, & cinnam. ana dra. i. cum sacch.
 fiat boli.

Pillulare medic. Rec. pill. aggreg. ex inuēt.
 Mesuæ, pulu. hieræ Galeni, agar. troch. rhab.
 vig. ana dra. ii. fiant pill. cum cathar. ros. n. 7.

Pruna damasc. condita cum succ. ros. persic.
 & cum decoct. senæ orient. quotidie ante
 prandium assumenda.

Cautio. Materia hæc crassa, & viscida ex-
 pelletur potius per aluum, quam per vtreteres,
 & vias reñum.

Et quoniam metus est, ne lapis augeat,
 hocce periculum præuenire oportet, & factū
 qualemcunque demoliri.

Igitur cum optima diæta apprehendat
 æger decoctum, quod Rec. (sparte parille mo-
 dicum concisæ, & lotæ vnc. iii. cort. ligni In-
 dici vnc. i. infund. in lib. vi. aq. fontis 24. hor.
 decoque ad consumpt. 2. partis aq. In fine
 adde sol. senæ orient. vnc. ÷ ceterach, capill.
 ven. flor. viol. flor. maluæ, flor. borag. sumit.
 lupul. & cichor. ana p. i. radie. ononid. dra. ii.

radic. petros. aspar. apij sēnic. & tamaricis ana
vnc. ÷ facta fortis expressio seruetur.

Pro potu, Rec. eiusdem spartæ vnc. i. infus.
per idem tempus, & eodem modo in xv. lib.
aquæ font. decoq. ad consump. tertiæ part. aq.
adde in fine ceterach, & capill. ven. ana p. i.
glycyrrh. dr. iiii. cinnam. dra. ii. facta colatura
seruetur pro potu decē diebus prosequendo.

Purgato corpore Balneum petræ Puteola-
nū administretur lūborū regioni sex diebus.

Quod si calculus obfirmatus sit, & obdu-
ratus, ad valentiora præsidia confugiendum
est, &

Diuretica apprehendenda. Primo leuiora;
qualis est expressio succi fauorum cum dra. i.
pulu. ononid. vel aq. florum anthos. i. ror. ma-
rini destillati ad vnc. ii. vel aq. destill. ex mi-
nutulis limonibús cū paucula aqua cinnam.
destillati. In mensa vero iuscula cicerum ni-
grorum cum semin. asparag. & sēniculi deco-
ctorum. Puluisculus item frugiferus est, qui

Rec. pulu. ononidis, ossium ceras. dactyl.
mespil. lapid. Iudaici, milij solis, & faxisragij
ana dra. ii m. & vttere ex vino græco, vel ex
succo limonij, vel ex decocto diuretico.

Electuarium Iustini.

Sanguis item hyrcinus præparatus ex vi-
no bono voratus.

Calculus humanus quoque perhibetur à
proprietate profuturus.

Vnctiones ex oleo de absynth. de cappar.

N

vtriusq;

utriusque lilij, & olei de lateribus, & huiusmodi alijs.

Quoniam fas non est ipsos adaperiri renes, licet hoc ausus fuerit Franciscus Rossetus, quemadmodum in lib. de partu Cæsario declaratum reliquit: mirabile præsidium est apponi cucurbitulas duas ad lumbos, mox vero binas alteras inferius, & tertio binas alias iuxta pubem infimã. legimus apud Aetium, & Nos in opere efficacis medicinæ monstrauimus, hocce remedio pertrahi calculos ex renibus, & extrudi deorsum.

In dolore peracerbo balneum de subueni homini Puteolanum subuenturum utique spera. quo apud exteros deficiente, substituas licet artificiale, ex hydreleo, quod receperit in se diureticas radices, simplicia quatuor anodyna, polytrichum, & adianthum, veneris dictos capillos, utramque maluam, paludapium, caricas, zyzzypha, carobas, dactylos syriacos, & huiusmodi laxantia, & aperientia omnia.

Aliunt intestinum hædi in laborantis hominis mentulam inductum, & vehementer inflatum, sic ut illapsus flatus vesicam ampliauerit, & dilatauerit, exiturum exindè calculum, qui remoratus opprimat dolore: cuius ego simile commentum, & instrumētum exposui descriptū in medicina efficaci monstratum à Memphitico medicatore. Quorum utrumuis exigente casu possis experiri.

Ad

Ad impotentiam coeundi.

SI venerit imbecillitas ab inanitione, im-
 promptu victus esto ratio plenior, qua-
 les sunt testes gallorum, coturnices, turtures,
 hœdi, veruecina, suillaue caro, pistacii, nuclei
 pinei, vulgaris giorgiolena, sesama, semen si-
 napis, semen erucæ, ipsæ quoque erucæ, pasti-
 nacæ semen, & brassicæ, quæ cuncta generant
 abundè semen.

Si fiat defectu flatus, suggerent hunc legu-
 mina, qualia sunt cicera, fabæ, phaseoli, cæpæ,
 & allia assa, radicula, semina anysorum, seni-
 culus, carduus scolymi.

Animi turbationes ad iucunditatem con-
 uerſe.

Penis leporis, vel vulpis tritus ex vino as-
 sumptus.

Esitatio Dactylorum.

Pinguedo lacerti scyni hoc modo para-
 ta. amputatis caudis, & capitibus, & intera-
 neis, quod reliquum est conditur sale, & quæ
 pinguedo dimanat ab embammate, seu con-
 ditura, colligitur, qua locum inunge situm
 inter anum, & testes.

Herba nominata testiculus vulpis, & ra-
 dix Satyrii mansa:

Conf. diasatyrion ad dra. i. ÷ horam dimi-
 diam, aut integram ante coitum. Diamoschū
 etiam, ac Mithridatium vsitata, seu catapo-

tiis, seu iusculis, aut mero potata.

Vnctiones ad intercapedinem inter anum, & testes ex ol. sesamino, vel de euphorbio, vel ex nuce mosch. vel ex moscho. vehementius autem ol. de lateribus, quod & semen gignit, & mentam intendit.

Per os vero diamargar. calidum.

Electuaria, Rec. cerebrorum passer. vnc. iii infun. in aq. namphæ per 24. horas, nucleorū pineorum, & pistaciorum ana vnc. ii. gran. parad. piper. longi, zinzib. sem. vrtic. nasturtii, crucæ, galang. ana dra. i. facch. albi dissolu. in aq. namph. fiat elect. de quo singulos in. vsus mane, & vesperi mande vnc. i. ex vino albo generoso, in quo fuerit infusam zinziber, cinnam. iulep. ana dra. ii. facch. quantum sufficit; fiat vinum odor. quod vinum dicitur Hippocrassum, celebre Panormi.

Lotiones ad testes, Rec. galangæ, garyophyll. cinnam. zyziphor. mastich. zinzib. ana dra. iii. cort. citrii ana p. i. vel p. ÷ bull. in vino rubro crasso generoso sufficiente, ex quo saepe perluere sedem, & obscena licebit.

Illitus ad partes prædictas, Rec. ol. de laterib. ol. euphorb. ol. castor. & ol. sesamini ana vnc. ÷ puluerum moschi, zinziberis, zibetti, mastich. & cucubearum, semin. cinaræ, crucæ, sinapis, & feniculi ana dr. i. ceræ pusillum m. fiat linim. quod valet ad trahendum sanguinem ad locum interiacentem ano, & testibus, ex quo postea sanguinis, & utilis flatus

tus influxu necessaria fit colis ad venerem
arrestio.

Ad Priapismum:

AB ignavia genitalis phalli venimus ad
immodicam eius intentionem, quæ
Si fiat ex seminis multitudine, sectio venæ
cubiti dexteri, & sinistri, non semel tantum,
sed bis, atque ter.

Medicamenta expurgantia renes, qualia
sunt casia, manna, syr. viol. sacch. viol. sæpe-
numero exhibita.

Vnctiones externæ ex ol. viol. ol. sem. cu-
curbitæ, vnguento refriger. Galeni, succo
modico hyoscyam. succo semperuiui maio-
ris, solani, lactucæ, mandragoræ, & vsque opii
momento, si necessum fuerit visum, quibus
& terebinthina commistis illinire possis lo-
cum ano, & testibus interiectum.

Electuaria refrigerantia. Rec. sem. melon.
vnc. iiii. semin. cucurbit. & citruli ana. vnc. i.
semin. portul. lactucæ, & papau. ana. dra. i. se-
min. agni casti, & rutæ ana. dra. ʒ. sacch. albi
dissol. in aq. ros. rubr. q. s. m. fiat elect. quo va-
lerudinaris vritor ex decoctis maluæ, viola-
riæ, hord. qua hordei aqua ad vinum lym-
phandum opus erit.

Mane diamargar. frigidum ex eisdem aquis.

Est & vsus dra. ʒ. caphure, & vna sem. agni
casti, menthæ, ac rutæ ex vino albo.

Si sit ex immodico flatu, discutientibus occupes, & primo

Syr. ex oxym. simpl. oxysacch. & rhodom. syr. de mentha, de cortic. citrii cum aquis fenic. anethi.

Medicam. purgans, Rec. agar. troch. dra. i. senæ orient. vnc. ÷ sed cum folliculis, semin. feniculi dra. i. fiat decoct. in aq. melissæ, & in colat. dissol. syr. D. Augustini vnc. iii. de nouë infus. ros. rubr. & de 5 persic. ana vnc. ii. Diaphen vnc. ÷ m. fiat potus.

Vnctiones tum ad renes, tum ad scrotum, & intersemineum, ex oleo chamæm. rutæ, & anethi.

Per os diamarg. calidum, diamoschum, confect. diambæ, & Galenæ ad dra. i. triph. persicæ, aut magnæ, quæ omnia discutiant flatum, & libidinem obtundunt.

In potu aqua anys. cum pauco cinnamomo.

Vinum vero sit album discussitum, vt Cerebellæ, Beluidere, Pausilypî, & Capodimonte.

Elect. Rec. 4 sem. frigid. maior. vnc. iii. seminum crucæ, fenic. anys. pulu. glycyrrh. ana dra. i. sacch. albi q. 5. dissoluti in aq. fenic. fiat elect. in offellis, quibus vtitor mane, & vespere ex aqua primo decocta.

In materia vero acri, & mordaci venæ sectio internæ dexteri cubiti.

Syr. de fumar. de cichor. de lupul. & portulaca.

Medicam purgans, ex syr. D. Augustin. ros. persic. de succo viol. cum conf. Hamech.

Serum lactis, in quo decocti sint flores cordiales, & sol. sen. orien. aliqua portione: vritor aliquot diebus.

Balnea ex aq. dulci. Aq. frigida affusa ad testes, & pudendum, priapismum curauit Galenus 14. meth. c. 7. Ad penetrationem adde aliquantulum aceti.

Vnctiones omnes adnotatz, cum ageremus de multitudine sem. sic electuaria, &c.

Ad inflammationem renum, & vesicæ.

H Vmectantia, & refrigerantia.

Venæ sectio ex Galeno 13. meth. c. 17. & lib. de curatione per sanguinis miss. c. 8. ex saphena. Recentiorum vero sententia ex interna dexteri cubiti.

Quæ ambæ sententiæ sunt approbæ, illa quidem catâxin rectitudinem, hæc per reuulsionem: quæ vero reuellere intendimus, præcipue consultum est ex iecoraria.

Vel dicas, quod sub viribus validis vtimur reuulsione per brach. sed in languidis cum Galeno euacuando sufficit semel sanguinis emissio: ante quam emissionem omnino

Clyster. odinetur ex casia, ex oleo viol. & melle viol. quæ omnia dissol. in aqua decoct. maluz, viol. & hord.

Syr.præparantes, & mitigantes acrimoniâ humorû, Rec.malu.viol.ana vnc.i. aq. hord. vel cichor.ad vnc.iii.m.

Medic.lenitium ex casia nouissime extr. laudatur quoque syr. de succ.viol.vel sacch. viol.cum syr.ros.solut.vel manna dissol. in aqua quinque infus.ros.perfic. siquidem in hoc casu per initia diureticis medicamentis vti non debemus, nec item vehementer calidis, nè concitentur humores infernè.

Illicus ex ol. viol.ros.omphac. ol.sem. cucurb.cum paucio succ.mandrag.succ. solani, suc.plantag.& in vehiculum aliqua portione aceti, Vnguento rosato, & santal. cum aceto, vel vnguento refrigerante Galeni.

Elect. Rec.sem. mel. vnc.iii. sem.malus, sem.portui.sem.papau.sem.lactucæ ana dr.i. sacch.albi dissoluti in aq.hord. sufficiente.ex contrita omni materia secundum artem pareretur elect.in offellis, quæ delibet æger mane, & vesperi aqua hordei superpota.

Tendente ad suppurationem vlcere abstinendum à rebus nimium frigidis cautione scirrhi, qui contrahi posset in renibus, vel in vesica, quare consultius apprehendenda sunt.

Fomenta, quæ sint huiusmodi, Rec. chamem.fenigr.sem.lini, malu.akhez, caricarum pinguium minutim concis.quantum videbitur:ferueant in hydrelæo, ex quo primum insuccatis mox leuiter expressis spongijs vttere
ad

ad digerendam inæqualem intemperiem re-
num, & vesicæ; quas vtrasque partes triduum
inungere possis oleo chamomeli. amygd. dulc.
& ol. lilij albi addito aliquoto butyro, & adi-
pe gall.

Cataplas. perficiens suppurationem, Rec.
farinæ tritici sol. malu. althææ, fenigr. ana p. i.
fermenti vnc. ii. caricas ping. n. 3. ferueant in
aq. sufficiente, donec herbæ mollescant, adde
sub finem croci dra. ʒ. butyri recentis vnc. i.
adipis gall. vnc. ʒ. axung. porcine vnc. i. ʒ. m.
in mortario fiat malagma. est mirabilis vir-
tutis, diu retinendum in affecto loco, nec plus
semel interdiu transmouendum.

Facta suppuratione diuretica præpta sunt:
ex his vero sy. de rad. Gent. sine aceto, syr. ca-
pill. ven. & interpellatus sy. de cichor. Nicol.

Aqua deco. ceterach capill. ven. petrosel.
tamaricis cum radicibus.

Syr. magistr. Rec. rad. tamaric. fenic. apij,
petros. cappar. borag. cichor. endiu. an. vnc. i.
ceterach, & capil. ven. an. p. i. absynth. p. ʒ. fl.
cord. p. i. ferueant in vi. lib. aq. font. ad con-
sumpt. dimidij, adde sem. maluæ dra. ii. semin.
lactuæ, & portulacæ dra. iii. flor. viol. p. ii. foli.
senæ orient. vnc. i. rhabar. opt. vigorati subti-
liter puluerati dr. ii. expletæ decoctionis fiat
expressio fortis, cui addito saccharo sufficien-
ti, fiat syr. longus, de quo mane hauriat ægro-
tus vnc. iii.

Cum periculum est vlceris, curabis, vt infra
com.

comprehensum est.

Inflammato vesicæ collo sic, ut mistionis fieri nequeat actus, utere cathetere. quod si sequatur intensior dolor, lenitiua præsto sint ex ol. amygd. dulc. & lactis vsus caprini, vel aqua lacticina seminum melonum, vel aqua decoctæ malug cum infus. sem. melonum, vel aq. hordei viridis destillata.

Aucta inflammatione, & apostemate consummato, nullus est vsus catheteris: verum, sola superest sectio perinæ inter anum, & testes à latere, declinato cautè medio neruo cliuo. liberatus est per me fistula quidam Monachus, qui se commingebat ulcere internè patente, & callo coalitum distinente: sed callo tamen excusso non arduo negotio resecta est vnitas.

Ad Gonorrhæam.

MOrbus hic si per multitudinem est seminis, eo modo curetur, ac priapismus Galen. de loc. aff. lib. 6, c. 11.

Si vero non sit ex multo, necessum est, ut sit ex acri, & tenui; causa verò fluoris acuties sit. nempe cum aquea substantia stat sal, statq; nitrum.

In hypothesi priore fiat venæ sectio dexteri cubiti internæ: quæ sanguinis detractio remittet aliqua parte acrimoniam, quam & alijs rationibus expugnari licebit, & primo
Syr.

Syr. de succis maluæ, violarum, cichorij, endiu. fumar. lupul. adde aq. hord. vel capill. ven. cum emultione 4. sem. frigid. maior. tribus, aut quatuor diebus.

Medic. purgans ex casia dra. i. ÷ pulu. sem. haliacabi, seu vesicariæ semin. vtriusq; maluæ, & glycyrrh. ana dra. i. & sacch. q. s. vel Rec. manæ dissol. in aq. hordei, & sacch. viol. ana vnc. iiii.

His actis mane per 10. vel 12. dies conservæ flor. maluæ, & sacch. viol. commistarum ana vnc. i.

Naturalia remedia, quale dicitur Balneoli prope Nyfidam, & Putolos, quod balneum est mirabilis virtutis ad profluvium omne sistendum. cuius apud exteros defectu parari licet Balneum ex aqua dulci incoctis simplicibus ad id rei facientibus, qualia per nos multa tradita sunt ad priapismum.

Inunctiones ad renes ex ol. omphac. ros. ol. viol. semin. cucurb. cum exigua portione cum opus fuerit, succi mandragoræ, hyosciami, solani.

Vnguenta, Rec. pulu. boli armen. orien. corall. rubr. mastich. sanguinis drac. ana dra. i. ol. cydon. mastich. myrtin. ros. omphac. viol. papau. ana vnc. ÷ pulu. santal. omnium ana vnc. ÷ ceræ modicum m. fiat vnguentum.

Vfus laminæ plumbeæ, noctu præsertim alligatæ lumbis, at hominis validi, nō autem delicati, quippe qui non ferat plumbi pondus,

duſ, & algorem. Sed delicati ne decubituꝝ ſupinum accerſant effluxum alias, quam par eſt; expedit, vt his in medio lumborum accommodetur adhærens lintea pila, quæ vetet incubituꝝ dormienti alioquin improuiſuꝝ, ſecus linteo ſuppoſitas inferiori ſuſternemus vitulinas, aut caprinas alutas.

Odoramenta etiã adhiberi ſolent ad nares frequẽtia; quæ per ſpiritus traduſtores de uehant infrenandæ ſpumæ veneris virtutẽ. ei uſmodi ſũt ſem. viticis, papau. hyoſcyami, mãdrag. ſolani, rutæ, menthæ, ſemina, vel folia. Sed Caphura prima, ex quibus ſingulis dr. ÷ contuſis colligi licebit in panniculum laxæ texturæ peſſarium nodulo colligatum.

Vbi vero ſemen aduerteris fluidum, ac tenue, ſic vt ſeroſum videatur: tum ſimplicibus incrassantibus, quaſi coagulo ſtudeas cõprimere ſubſtantiam, quemadmodum per ſuos ſales figunt fluxilia Chymiſtæ.

Id, quod efficere parati ſunt ſyr. de papau. ſy. nymphææ, ſyr. viol. ſy. myrtill. ſyr. roſell. ſy. gran. dulc. zyzzyphor. & de portul. cum aqua nymph. plantag. aut portul.

Medicam. corrob. quale datur in alijs inactionibus.

Huiusmodi decoctum eſt myrobal. cheb. citrin. & indor. in aqua plantag. in ea diſſol. mannam, vel ſaccharum viol. adde rhabar. ſine ſpica, infuſum in ſyr. nouem infuſ. rol. rubr. paratus eſt inde potus. à qua leui purgatione

De;

Decoctum succedit spartæ; longe verò diuersum à consuetis, quod Rec. spartæ parillæ concisæ vnc. iii. cort. ligni guaiac. vnc. i. rad. rhapont vnc. ii. sem. vtriusq; malu. lactu portul. ana dra. ii. fol. senæ orient. cum follic. glycyrrh. vnc. i. sem. rutæ, sem. ag. casti ana dra. i. pentaphyll. eupator. flor. stæch. lentisci ros. rubr. ana p. i. infusa omnia spatio 24. horarū in lib. vi. aq. fontis, decoq. secundum artem, ad consumpt. duarum part. facta colat. seruetur pro syr. cuius dosis est lib. ÷

Fiat item aqua de sparta subditis vtriusq; malux semin. dra. ii. quod decoctum sumatur 20. diebus.

Quæ omnia si non expleuerint votum, erit utiq; necessarius vsus terebinthinæ hoc modo parandæ.

Rec. Terebinth. lozæ decies ex aqua decoct. glycyrrhizæ, radicum malu. & hord. ad singulorum vnc. ÷ quæ sic præparata sumatur alternis quibusque diebus semel vsq; adeo vt spatio 10. dierum sit ingesta quinquies.

Interim emanante materia putri spermatica, sunt absorbenda iura confecta ex pedibus veruecinis cum farris. extremè dissolutis: quæ iuscula resorbeantur cum saccharo continenti cursu 15. dierum.

Et perdurante amplius fluore lac offerendū est capræ, quippe quod maximè suo quasi coagulo seminis liquamentū mistis alimēti, medicamētiq; viribus belle valet incrassare.

Pseu.

Pseudo gonorrhææ mananti, cum tentigo est adiuncta molestia; pro symptomate depellendo non sunt auxilia meliora, quam priapismi dudum à me descripta, atque alia quædam in capite de venereæ contagionis gonorrhææ.

Sed turgidulum præpupium, qui angit dolor; irrigationibus tollitur, vel alterantibus frigidis, vt succo plantag. aut aqua rosarum; vel lenientibus, ex quibus est ol. amygd. dulc. & ol. sem. lini, & vng. rosatum: vel anodynis, & naturæ affinibus nostræ, vt lacte humano, vel caprino tepentibus.

Impransus autem homo voret semina maluarum condita saccharo secundum artem, nec nõ è sem. alchechengi, alias halicacabi cōfectos trechiscos, vt qui acrimoniam temperant humoris.

Ad ulcera renum, & vesicæ.

Aqua hord. torrefacti; viâus ratio infrigidans, & humectans.

Seâio venæ dexteri cubiti internæ.

Syr. de succ. cichor. fumar. lupul. endiu. cū aquis earundem herbarum exstillatarum.

Medicam. ex syr. D. Augustini viol. ros. incompl.

Item ex manna cum succ. ros. persic. vel Bolus ex diacath. & conf. Hamech.

Potus aq. mulsæ, & mane rhodomeli.

A me;

A medicamento lac asin. 20. diebus, & rursus alteris 20. diebus lac caprinum.

Interpellatis hebdomadis portio casie recenter extr. per setam cum pulu. glycyrrhizę, & sem. vtr. maluz.

A principio quoque inunctiones ex oleo ros. omphac. & viol. &c.

Ulcere progrediente, vel non sanescente, circa lumbos affricator ol. chamæm. & rursus progrediente ol. de lumbricis, & de hyperico.

Adstringentes syr. myrtill. de portul. de ribis, de miua cydon.

Electuaria in hunc modum parata, Rec. sem. melon. vnc. iii. pulu. sem. vtriusq; maluz portul. papau. lapidis hæmatitis ana dr. i sacchari albi dissol. in aq. portul. sufficienti fiant elect. in offellis, quibus vtitur summo mane ex aq. acetosellæ.

Pro potu aq. cistern. chalibeata, cibusq; adstringentes.

Si vicus in fundo sit vesicæ, lauacrum ex decoctione hord. cum cort malu. & viol. cuius portioni admisce semina melon. benetritorum, vt omnia concorporata præferat formam lactis.

Iniectiones per siphorem frequentes ex lacte caprino primum, mox asinino.

Balneû ex chamæm. melil. sc. nigr. sem. lini malu. & althæz viol. hord. mundi ana p. i. ferueant in hydrelco fiant fomenta, & in ipso de-

decocto laua pudenda, & testes magis autem proficient Balnea cantharelli, vel Balneoli naturalia per spongas adhibita, vel lauacro.

Aliz per syphonem iniectiones, ex aqua plantag. rosarum rubrarum, & myrri, in qua bullierint pulu. corall. rubr. mastich. boli armen. orient. sanguinis draconis.

Mane, & sero alchechengi semina saccharo condita.

Syr. & aqua ex china parata, vt moris est.

Et puluis interim terebinthinæ claræ ad vnc. ÷ ex multa aq. portione decocta, quæ admodum enarrauit Valerius Cordus in Dispensatorij sine.

Ad retentionem menstruorum.

SECTIO saphenæ dexteri pedis repetita bis pro iudicio medentis, at parca.

Syr. aperientes de radic. Gentilis sine aceto, capill. ven. & rhodom. cum aq. ceterach, aut radicum brusci, quæ præcipua est.

Medicam. aperiens, Rec. flor. cord. p. i. sen. orient. vnc. ÷ agar. troch. dra. i. fiat decoct. in aq. capill. ven. & in colat. dissol. syr. ros. solut. vnc. iiii syr. de cichor. Nicol. cum duplicato rhab. dra. iiii. Diaphen. vnc. ÷ m.

Inunctiones ad pubem, & vteri regionem ex oleis vtr. lil. oleo cappar. oleo de absynth. vtr. amygd. ana dra. i. ladani tenuissime triti vnc. ÷ olei namphe vnc. i ÷ m.

Fri.

Frictio mane, & vesp̄eri f̄emoribus, & crucibus interioribus, mox cucurbitulæ applicandæ; partibus item interioribus coxarum.

Pupatella ex saccharo rubro, & tragacantha constrictis in lintea petiola rara, de qua dependeat filum prælongum, quo nodulus ol. amygd. dulc. vel sesamino, vel naphthæ intinctus immittatur, & adigatur in intima penetralia matricis, adeò vt incidat in vacuitatem ipsius.

Pupatellæ valentiores ex folijs mercurialis, & maluæ cum paucis croco. & adipe gallinæ parandæ, & administrandæ modo, & ratione, qua dictum est. nuper.

Pupatellæ alię valētiores ex granis zibetti.

Pupatellæ valentissimæ. cum his prædictis adijcitur momentum viridis æris, vel exigua portio retrimenti, seu rasurę cyclam. duobus ante diebus infusi in oleo recenter expresso ex amygd. dulc. Verum vbi suppressionis causa fuerit multa crassities humoris pituitosi: Galenus vsus est hellebori nigri tantillo, quod fuerit antea remollitū: nos infundimus prius in oleo amygd. dulc. qui quidem omnes pessarij sic sunt egregiè præstantes, vt vsque fœtum mortuum, & secundinas in utero relictas extrudere valeant.

Electuaria, Rec. sem. melon. ꝑnc. iiii. pulu. glycyrrh. trochisc. de eupat. & de rhabar. ana dra. ii. sacchari albi dissoluti in aqua capill. ꝑnc. q. s. misce fiant offellæ, deliber ægrota.

vnc. ÷ aut vnc. i. ex aq. capill. ven. & modica aqua namphe.

Syr. dicti magistrales, Rec. rad. aut fol. fenic. apij, petros. capp. borag. cichor. endiu. capill. ven. ceterach arthemys. matric. & mercurial. ana m. i. eupator. dra. iiii. fol. fen. orien. vnc. i. glycyrrhizæ modicum cont. vnc. i. absynth. cymar. dr. i. fiat infus. & dec. secundum artem in lib. vi. aq. font. ad consump. dimidij; adde sub finem rhab. vigor. subtiliter cōtriti dra. ii. colatura fiat cum forti expressione materia condiatur saccharo sufficienti, vt fiat syr. longus, cuius dosis vnc. 4. aut 6.

Potus ex aq. capill. ven. vel ex aqua decoctionis modicæ glycyrrh. cum rad. tamaricis, siue myricæ, & radic. petrosel. ceterach, & capill. ven. vel

Vinum toleretur absynthite mane ad vnc. iiii. vel iiii. vel infusum rhabar. in aq. capill. vener. etiam tempore matutino, vel quæ eadem est materia. varius modus.

Rhabar. micam ad dra. ii. dentibus attritam demittat in stomachum, mox vini albi generosi superbibat haustum vnum.

Sparæ parill. decoctum cum his, quæ recipere conseruerunt syr. magistrales ante descripti.

Ad Profluuium mensium.

Sectio venæ dexteri cubiti internæ bis, & ter fortassis in pleniufculis repetita.

Syr. infrigidantes myrtinus, de acetos. de portul. de infus. ros. arid. & miua cydon. cum aqua portulacæ, acetosellæ, & nymphææ.

Medicamē. consentiente profluuij clemētia sit tale.

Rec. thamar vnc. ÷ cortic. myrob. chebul. citrin. & ind ana dra. ii. fiat decoct. in aqua plantag. & in colat. d. sol. mannæ elect. corp. vel sacch. viol. vnc. iii. rhabar. opt. sine spica infusi in vnc. iii. succ. ros. rubr. & non colati: misce fiat potus.

Quo medicamento non conducente sit aliud, & tale, Rec. rhabarb. torrefacti subtil. puluerati dr. iiii, cum sacch. ros. rubr. vnc. iii, mulier assumito mane, quatuor ab hinc horis, aut quinque praesura.

Repetitio sectionis nunc dexteri, nunc sinistri brachij venarū, pauca semper educatione pro retrahendo sanguine.

Cibi incrassantes, ex quo numero sunt capita, & pedes, cerebella, & partes exanguæ animantium.

Potus aquæ chalibeatę, & de cisternis hauriæ, seu recentę, seu iamdiu cœlitus lapsę, quibus incoctę sint myrob. cheb. belliricę, citrinę, & indę: quas pro libito prę-

dat prandio, atque cœna.

Carnes omnes, & gallinaceæ in eadem aqua cisternæ coquantur.

Torticia, quasi tripta dicta græcè, quæ & vulgo pista dicuntur, cum seminib. papaveris, aut portulacæ, aut lactucæ.

Tabellæ, Rec. sacchari ros. rubr. incompl. vnc. iiii. pulu. boli arm. orient. corall. rubr. & lapid. hæmat. ana dra. i. sacchari albi dissoluti in aqua rosar. rubr. aut. acetos. sufficienti, fiant electuar. in offellis.

Quibus utitur summo mane ex aqua acetos. vel plantag. vel portul. vel nymphææ.

Syr. ante cibatum, Rec. syr. myrtini, de forbis immaturis ana vnc. i. ÷ pulu. troch. de carabe, & de spodio ana dra. i. misce.

Possumus item immiscere syrupis pulu. boli arm. orient. terræ sigill. ana dra. i. ex quo possumus propinare duo cochlearia proxime ante prandium, & cœnam.

Frictiones, & ligaturæ in brachiis, & digitis.

Cucurbitulæ apponendæ in spatulis, & lumbis, & sub mammis utriusque lateris.

Inunctiones ad vterum, & circa partes ventris; & ad renum regionem ad hunc modum compositæ.

Rec. ol. myrtini, & mastich. an. vnc. i. pulu. boli arm. orient. terræ sigill. ana dra. i. ÷ cere modicum, misce, fiat ung.

Item unguentum Comitissæ, & fantalorum.

Po.

Potest etiam apponi candidum oui cum cinere chartæ, vel crassissimæ araneæ telæ ad regionem renum.

Item aliud, quod vel ipsum sætum, retineat quam validissimè.

Rec. chartæ vstæ, sanguinis dracon. boli arm. orient. corall. rubr. & cortic. castan. myrob. citrin. indar. & chebul. myrtill. terræ sigill. mastich. ros. rubr. ana dra. i. ÷ terebinth. q. s. m. super igne secundum artem, deduc. ad formam empl. adde modicum visci querni, & picis nauticæ, quod extenditur in aluta, vel in tela noua per rudiculâ emplastr. quod sit bipartitū, vt spinalis medulla libera remaneat.

Suffitus ipsam quoq; vuluam adstringentes, Rec. balauft. malicor. pomorum cupressi, cortic. nucum pinearum, omnia crasso modo cōterantur, adde myrt. ros. immaturarum ana p. i. plantag. verbasci, frondium myrt. portul. acetos. ana p. i. ÷ subeoquantur igne lento in vino rubro crasso sufficiente, suffitus materia spongijs accepta, fiant infimo ventre fomenta.

Pessarium, seu pupatelkæ. Rec. boli arm. orient. terræ sigill. ana dra. i. infundantur in tela rara, factusque pendulo filo nodulus, & oleo myrtino tinctus, in vteri profundum intrudatur.

Pessarium item delibutum vnguento comitissæ, intra, & extra intinctum pulueribus mastiches, corall. rubror. & boli atm. orient.

immissum in vuluā sic ipsam adstringit vehementer, ut hoc adiuta mulier corrupta virginitem e mentiri posse credatur.

Postremo lac caprinum chalibeatū coagulatricem alendo vim in sāguine relinquit.

Ad profluvium alui.

Sectio internæ venæ dexteri cubiti ad reuulsionem facit.

Syr. refrigerantes, & adstringentes obfistēbili, quæ stimulus est præcipitis huiusce defluxionis. hi sunt syr. de nymphæa, de sacco myrtillorum, de succo acetosæ, de papauere, de infus. rosar. rubrar. immaturarum, syr. de sorbis etiam immaturis, syr. de succo aurantiōrum acidulorum, de agresta, & si qui sunt alij cum aquis nymphææ, plantag. porculacæ, stellaris, solani.

Medicam. firmans, Rec. syr. de v infus. ros. rubr. Diapruni nō laxatiui D. Nicol. vnc. ÷ rhabarb. opt. infusi in succo ros. rubrarum, non colati dra. ii. aquæ acetosellæ modicum, vtērē in potum.

Item Focis abdomine inferiore, & regione lumb. ex aq. pluuiæ aceto rosato tincta.

Item lac asininum dies. 20. & rursus per alios totidem lac caprinum quasi coagulat parum vtrumq; fluxionem illam albam.

Item vsus coaguli leporini, vel hœdini dissolutorum ex aqua plantag. calida, quod cō-

men-

mendatur à Galen. 5. simplic. medicamen facult. 18. præstans quippe medicamentum expertus in curanda Boethi vxore, vt perhibuit lib. de præfagit. ad Posthu.

Quibus non elevantibus, non abiicienda, spes est in Philon. Romano dissoluto in succo plantaginis, aut in Philonio Perfico, vel Triph. magna singulis offerendis pōdere triū drachmarum in aqua stellariz, vel rubro vino.

A balneis naturalibus abstinendum equidem putarim, vt quæ necessario suo productiore vsu subrefrigeratum, & hydropicum affectum inducere valerent.

Ad procidentiam uteri.

Clysteres potissima parte diuretici, ita vt crassa attenuent, flatus discutiant.

Linimenta ad uterum ex pannis intinctis in ol. ros. omphac. vel myrtino, vel vnguento Comitissæ delibutis.

Fomēta præparantia repositionis actus ex parietar. mercurial. seminibus lini, caricis pinguibus, beta, & quat. anodynis sollemnibus decoctis in hydrelco, & ex decocto spongijs leuiter expressis, & ad elapsum uteri cololum admotis eo consilio, quo remollita pars obstrictis adminiculantis manu facile reducatur, genubus præsertim & seminibus supina laborantis altè sublatis.

Fomēta vero conseruantia repositionem

parentur hæc . malic. balauft. pomorum.
 enpress. rofar. rubr. plantag. & myrt. ana dra-
 ch. i. ferueant in vino rubro. & linteo panno
 vel spongia fiat focus crebet in collo vteri, &
 in pube.

Pessariū ex lana inuolutum linteo tenuis-
 simo, madefactum ol. myrt. & cydon. insperso.
 de super puluere boli Armeniæ Orient. corall.
 rubr. & sangu. dracon. myrtill. & rosell. rubr.
 ligatum filo dependeat ex collo vuluæ sub-
 dictum in intima pessarium.

Deindè affigatur cucurbitula magna pu-
 bi, aut circa vmbilicum. sed ligamentis de-
 bilitatis agglutinandæ sunt cucurbitæ reni-
 bus, qui sunt inungendi linimentis expositis
 in nimia sanguinis inanitione ab vtero.

Suffitus, & odoramenta fetida circa par-
 tem inferiorem, cuius generis sunt animan-
 tium pelles, & tali crematiassa fetida, & hu-
 iusmodi contra verò à superioribus quolibet
 odoramenta.

Empl. ex tachamach. circa vmbilicum,
 forma circulari, quod extendatur in pannum
 rubrum in medio perforatum, vt vmbilicus
 liber sit emplastro.

Sectio venæ dexteri cubiti repetenda con-
 denter, vbi sit humorum copia.

Syr. astringentes, & medicamentum com-
 pressiuum, vt in profluvio mensiū præceptum
 fuit.

Ad strangulationem uteri.

Strangulationi uteri animi deliquio coniunctæ primum occurre suppositorijs ex ruta, vel ex allio, vel fico imbuta nitro, vel contrito sale gemmeo resperfo.

Frictiones cruribus, & utrique semori duriores.

Cucurbitulæ verò coxis.

Oleum rutaceum, aut contusæ rutæ succus ab osterrice diligente per syphonem infundendus in uteri cava, vel chamæmeli, vel anethi ol. vel namphe liquor immittendus est iniectione, Galen. 6. de loc. aff. c. 5.

Pessaria ex odoratis, qualia sunt crocus ambaram, moschus, zibetum ex adipe galina.

Cucurbita ampla pubi, vel lateris molliitudini conglutinanda. Solennis usu rei consultæ femina nostrates matulam sustitunt medicinali cucurbitæ, qua usus est, aut rectius, utendum voluit Galen. in 13. methodi therapeut. sub F.

Sufficus rerum insuavis ad histericæ nares vel procuratus, vel illigatus vetustissimus est ab Hippocrat. & Gynæcion dictatorib. indicatus ex penis, inquam, bipedum, ex cornubus, vnguibus. & talis, & veteramenti omnibus igni coniectis.

Odoramenta castorij, vel sinapis in aceto tincta oru, itemq. allia munda, vel semes, & capila

pillamenta ceparum mandenda.

Sternutatoria ex trito pipere, nigella, & flaphi. agria.

Syr. seu condita de stęchad. & syr. de infus. ros. rubr. cum triti castorij drachmę pond.

Vomitus erumpi commodum, vel immis-
sis in fauces digitis oleo tinctis, vel pennis,
vel antiquorum loro, cuius meminit Scribo-
nius in cōp. 180. & Cl. Castellus in emetice.

Sunt & eo casu, quo suscitetur consterna-
re sęminę sensus, ex usu vociferationes, &
fragores ad aures intenti, ad nares verò elly-
ehnij restinctus, & sulphuris accensi proxi-
mus halitus conducibilis est.

Hęc, si strangulatio pręceps fiat. sed quo-
niam non est ita semper acuta, cum cunctan-
tior est, maturamque prouisionem permittit;

Clyster. paratus esto ex capite vetuecino
cū discussorijs, quę sunt sęnic. alliorū triuin-
ctę, paleę, carycę pingues, mel despumatū
in iure vetuecini capitis elixati, saccharum
rubrū in prędicto iure. Infusi forma est hęc,
R. ol. amygd. dalc. recēter expressi. vnc. iii.
olei anethini, vel quod eiusdē est prope qua-
litatis, ol. chamęm. ana drach. ii. mell. de-
spum. vnc. iii. diaphęn. & hierę picrę ana
drach. ÷ cum decoct. diuretico misce.

Sectio saphenę dexteri pedis, siq. vires cō-
sentiant, inculcanda secundo, & altero pede.

Syr. incidentes de trib. radicib. Gentilis si-
ne aceto, syr. cap. Ven. ana drach. i. aquę sę-
nte.

nic. & ceterac. ana drach i.

Medicam. pillul. recip. Agar. & Rhab. vigorati pill. aggreg. ana drach. i. form. pill. 7.

Medicam. forma potab. rec. sol. senę orien. drach. 3. ÷ agarici troch. 3 i. fiat decoct. in aq. senic. in colatura suffic. diff. syr. ros. vn iiii. syr. de cichor. Nicol. drach. iiii. Diaphz. drac. ÷ m. & fiat potus.

Iam verò si vulgo strangulatus causam agnoscat mensium suppressorū, balnea probauerim, & ea, quæ decreuimus in curatione morantium menstruorum: si verò ex seminis cohibitione, remediis vtemur, quæ proposuimus aduersus priapismum.

Ad Molam uteri.

Q Vandoquidem & menses, & mole genere comprehenduntur alienæ matris, quam vtramq. retineri perniciosum est: Communis autem locus est uterus: communis ex hoc vno scopus est euacuandi & cōmunia medicamentorum genera sunt, & aperiendi, atq. extrahendi.

Clysteres itaque sint acres, & acuti ad hūc modum. Recip. elect. de succo ros. & diaphę. ana drach. ÷ ol. rutac. chamęmel. & mell. despum. ana drach. iiii. cum decoct. diuretica. fiat enema.

Syr. aperientes, & incidentes. Recip. syr. de radicib. bizantin. & oxym. ana drach. ÷ aqu. cap.

cap. Ven. drach. iiii.

Medicam. in forma pillul. recip. pil. aggregat. pil. fatid. Agar. troch. ana drach. ii. form. pil. num. 7. cum succo rad. Iridis uox tribus ab hinc horis

Recip. syr. ros. solut. & de cichor. Nicol. ana drach. ii. cum aq. cap. Vener. parca dosis esto pro ratione.

Catharticum medicamentum portabile. Recip. agar. troch. & sol. fen. ana drach. ÷ flo. cord Arthemys. capil. Ven. & ceterac. ana p. i. glycyrrh. mund. modicum contusæ drac. ii. fiat decoct. in aq. capil. Ven. in colat diff. syr. de cichor. Nicol. drag. iiii. Rhab. vigorati drac. ii. infusi in drac. iii. suc. ros. persic. colati, & expressi. Diaph. drac. ÷ fiat potus.

Infessiones balnei arte parati. Recipe Arthemys. matricar. pulc. orig. sabine ablynrh. & 4. anodyn. ana p. i. ferueant in hydrelco, fiat vsq. ad vmbilicum infessio.

Balnea verò naturalia sunt Puteolis saluati, & in suffitus ibidem est sulphataria, quæ suo si loco non liceat capi, tum artificiale sulphurabulum substituetur ex accensa domi, & in suffitus in angusto conclauis materia.

Inunctiones calidæ. Recip. ol. vtr. lilii, de cappar. de absynth. vtrarumq. amygd. & vng. de cyclamine ana drac. i. Ladani, ammoniaci, & Bdell. vnc. — ceræ modicum secundum art. elaboratum, igne fiat vnguentum.

Suppositoria qualia parari volumus in curan-

randa vteri præfocatione.

Trochisc. de myrrha contritus, vel pulu. è cassiæ fistularis cortice pondo drachmæ portione hauſtus.

Syr. magist. syr. de sparta parilia.

Pessaria, seu pupatellæ elect. potiones, inunctiones, frictiones, cucurbitulæ, & aliæ medellæ, quæ suppressis mensibus educendis ordinatæ suere.

Ad sterilitatem.

IN materia frigida syr. præp. & incid. de cort. citr. de pom. rhodom. zuccar. ana vnc. ÷ aq. beton. vel fœnic. vnc. iiii. m.

Medicam. purgans. Recip. Agar. trochisc. drac. i. epith. drach. ii. glycyrrh. ruditer cont. vnc. ÷ flor. cord. p. i. decoq. in aq. beton. vel meliss. in colat. dis. syr. D. Aug. vn. ÷ rhabarb. vigor. drach. i. ÷ infus. in vnc. iiii. succi rosar. persic. col. & expr. diaphœn. vnc. ÷ m. fiat potus.

Fotibus vtitur calidis, vel partium infern. vel colli vteri, vel ipsiusmet ex cinnamom. maci, caryophyl. thur. cort. cas. zibet. & thymi, calami aromat. vel hoc modo.

Recip. Arthemys. puleg. orig. fl. chamem. fœnig. (abin. flor. stœchad. samp. beto. ana p. i. ferueant in hydrelæo, decocto spongijs accepto, pubem, vel collum vteri crebrò foueto.

Inunctiones. Recip. ol. costin. & irin. & ol. de spica, de absynth. ana vnc. i. illinc renes, ac pubem.

Item

Item ol. lacrymæ, seu primæ expressionis nucis moschatæ cū modico zibet. vel modicum zibet. vel moschi dissolutū aq. namph.

Pessarium ex coagulo leporis cum aliqua portiuncula zibetti.

Confect. diambrae dulcis ad drac. i. diasatyrion ex vino albo spirituofo, quod sæpè haustum multum in hanc vim conducit.

Decoctum spartæ pariliæ cum simplicib. quæ descripsimus aduersus suppressionem mensium vfitandum 20. diebus, & his exactis descendat ad balnea saluiati.

Balanus. siuè suppositoriū ex nuclej vnus alij modica portione. In materia calida sanguinis emissio, prima est, quæ calorem seminis exustium remittat, atque modifcet. in feminis igitur tentanda saphena, in viris verò vel vena brachij, vel vena sinistri pedis.

Syr. infrig. de suc. cichor. de borag. endiu. ana vnc. ÷ aq. lupul. vnc. iij. m.

Medicam. ex manna dissolut. in suc. rosar. persic. vel ex cass. recent. extracta.

Topica medic. & primò inunctiones ex ol. ros. omphac. ol. viol. & ol. amygd. dulc. circa pubem, & renes. vel renes illine vng. rosato, vel ceroto refrigerante Galeni.

Pessaria vteri ex sol. maluz, & altheæ, adipe gallinæ, & saccharo rubr. contusis omnibus, & in tela rara collectis & pendente filo, quā pupatellam à nostris dictam, & ol. amygd. dulc. intinctam immitte in vteri sinū. In collū verò

vte-

vteri infundentur commodè lauatra ex lacte caprino, vel a sinino.

Elect. sem. comm. frig. maior. vnc. iiii. pulu. sem. malu. papau. portul. ana drach. i. pul. glycyrrh. pro vehiculo medicamenti drag. iiii. sacch. albi dissol. in aq. cord. q. s. ꝓ. & fiat electuar.

Si contigerit exteri, vel conteri pelliculam penis virilis calore vteri complectentis: vtrūque proluce succ. lactuc. plantag. mandragor. solani, quandoq. & hyoscyami. porro solida quædam vteri collo dolenti non ita percommodè, neque ita boni cōsulente famella possūt adaptari; siquidiora rectè in caua quæcūq. dictatione, ac lege curationis insinuantur.

Inter frigida verò, quæ demitti queant invuluum, optimus expressus è viridi plantagine suc. aqu. ros. albar. associatus, vel tum ex rosis, tū è plantagine stillatitiæ recētes aque, quibus in omnibus appellendis medelis, ne dubites tamē de impediendo conceptu quicquam.

In materia humida syrup. rhodom. zuc. de stech. de infus. ros. ana vn. ÷ aq. beton. vn. iiii.

Medicam. Rec. syr. ros. sol. vnc. iiii. D. Aug. tantumdem, confect. Hamech. vnc. ÷ cum aq. sēn. pauca.

Decoctum ligni Guaiacini quotidie 20. aut 30. diebus assumendum.

Medicamentum paulò ante notatum aliqua interposita quiete ab vlu decocti resumendum.

Balo.

Baln.artificiale. Rec.malicor.balaust.pom-
mor.cupressi,myrt.verbasci,rosar.rubr.ana
p.i.cort.pomor.pincor.p.i. ferucant in vino
rubro, & ex hoc expressis spongijs vterum
soue sæpè. In sessiones vsq.renes, ex simplicib.
vtero roborando, & semini virili vegetando
valentibus administrandæ.

Illicus circa renes, & pubem ex ol. vehe-
mentiorib: & acutiorib: è quibus est, quod.
Rec.ol.de hyperic.rutac. mastich. vulpin. de
spic.ana vnc.i.bdell.sagapen.ana vn.÷ ma-
teriam omnem ex aliqua portione ceræ re-
duc ad formam vnguenti.

Pessaria, seu noduli adstringentes. Recipe
pulu.bol.Armen.orient. mastich.coral.rubr.
& myrt.ana drac.iii. ÷ in pâniculo raro col-
lecta, & mox ol.myrtil.tincta demitte ad vte-
ri cervicem.

Locus sulphureus natura, qualis est Puteo-
lis altiore colle, superfluitates resiccando mi-
rificè conducit: quo cum non licet vti, tum
in angusto conclavi sulphur in calidis fauil-
lis accendo nitrosum excipe fumum ore lato
caput manili circumtectus.

Si fomes sit siccitate vitiosus, vti tor sæpè
cassia bolo, mox iuribus pulli consumpti, in
quo fuerint incocta farra, & hord.mundum
cum pedibus veruecis, viginti cōtinuos dies
mane.

Decoctum radicis chinæ 12. dies.

Balnea dicta ex aq. dul. calidiuscula, vel te-
pi-

didā: cōtēcto tamen vtero. & vndique cō-
clūso, & cautē seruato, ne naturalis aquę fri-
giditate labefactetur.

Inun&iones partium externarum, vtpotē
lumborum ex ol. de cucurb. ol. viol. ol. papan.
ol. amygd. dulc. recentī, vel cōsimili ad hu-
mectandum bellē valente.

Pupatella ex gūmi tragacāth. singulari, vel
cum sacch. albo, seu rubro, & guttis aliquot
amyg. dulc.

In causa flatuosa commendat Galen. 9. de
simpl. medicam. fac. cap. 10. crebrum resūmi
agar. ex vino albo odorat sed nō omissio prius

Medicamento purgante, quod in frigidis
pituitosis, & crudis affectibus nobis est sola-
men.

Inseffiones, vel fotiones. Rec. anod. omniū
fenicul. api. petros. ana pug. i. caric. pingue s
num. i. sem. anys. & rutę ana drach. iiii. ser-
ueant in aq. font. suffic. & vini albi boni sub
decuplo: quibus vti possit homo, & per in-
sesum, & per forum.

Inun&iones ol. chamęm. ol. cappar. ol. de
absynth. ana part. equal.

Pessariū ex modica portione hellebori ni-
gri med. dati in ol. namphę, vel amygd. dulc.

Præstat item ad flatum discutiendum, &
ad sætum mortuum educendum pupatella
ex modica cyclaminis portione.

Iura ex pullis columborum coneis, & cō-
tritīs cum totis ossibus, & cum ciceribus rū-

bris, & cum radic. fenic. & radic. petrosel. & cum exiguo croco concoctis in aq. luffic. ad dissolutionem carniū ab ossibus extremā.

Materiæ fiet expressio forti manu, quam resorbendam off. r mane. iuscula repetantur continuos. 15. dies. iterum flatibus emundabis, & inertem aluum liberabis.

Elect. quod. R. testes vulpis, & testes leporis, & cerui, capri sylu. sing. num. ii. coagulum leporis dimidiū. elixa materia in suf. portio. n. aquæ namphæ. critis omnibus impone nucleor. pineor. vnc. iiii. cum purissimo sacc. & aliquot guttis aquæ stillaticia ex optima cannella. fiant electuaria turundarum, aut resellarum forma.

Similia pineis sunt pistac. quapropter hæc cum illis commutari licet.

Si verò non concipiente semella, id vitio fiat penis non attingentis yteri fundum, conulunt Aetios, & Mercurialis, vt postica sit ingrum naturalem seminis ejaculatio.

Abortus curatio.

Siquidem hic affectus ortū habet ab utero, tum id fit, vel quia pinguis, vel quia gracilis. Et rursus pinguedo vel per sanguinem est, vel per crassa excrementa. sanguis igitur cum humiditate cōiunctus est supponendus.

Itaq. materia præ sente humida, sectio venæ dexteri cubiti: nimirum hæc in melis se-

mellis sanguine redundantibus impedimen-
tum abstulit concipiendi.

Syr. firmantes, & adstringendi vim habentes fuerint syr. de myrt. bac deq; ribes acinis, de acetos. de portul. de sorb. de aurantior. acidulor. suc.

Vina rubra, & austera.

Cibi sine assi, vel parcium in animantibus extremarum elixar. e fructibus acida punica, cerasia, aurantia, limonia, omphacia, cydonia, coryli, mespili, sorba, myrt. spartæ pariliæ decoctum superfluitates exprimendo constrin-
git.

Inunctiones calefactivæ vteri ex ol. laurin, collin. absynth. frigidiore verò rosac. omph. cydon. lubricatū, quibus omnibus pro oportunitate delinies & lumbos, & pubem.

Syr. matutini præter antea memoratos, syr. de beton. de cort. citr. de stachad. rhodomel. simpl. ex sacch.

Sed vteri gracilitati occurre per torticia, perq; iura pulli, ut vulgo dicunt consummati. Verum ut horum humidum substantiale, longe amplius conferuas, parata in balneo Mariæ, vocata nihilominus in sicco, idest sine aquæ additione, qua ratione fiunt & iura in sicco cum depleta plurima, quæ restat, aqua in minore recoquitur vase, & rursus exhausta recogitur in multo minore olla, & deinceps coniectis interim herbis, & fructibus adstringentibus iam expositis.

Alia series syruporum ante cibum humect.
 syr. de borag. myrt. viol. papau. nymph. syr. de
 pom. & alij syr. dulciduli saporis omnes.

Hæc ubi abortus inducitur veteri vitio, sed
 in huius quidem imbecillitate primū est bal-
 neū ex aq. Goccię falsò Doccie, quod paratur
 hoc modo. rec. Balnearis aq. & aq. myrt. ana
 libr. i. calefacta degustō, vase superiore deci-
 det modo in renem dexterum, modo in fini-
 strum. vel defectu balnei naturalis supplemus
 arte nostrum, quod rec. malicor. balauft. sol.
 myrt. & ros. rub. plantag. pomor. cupressi. por-
 tul. herbæ acetosæ, gallar. cortic. pincor. ana
 p. i. ferueant in aqua sufficienti cisternæ, &
 aceto pauco rosato. guttatim ex eodem vase
 supernè posito, vel alio artefacto decidat
 aqua calidiuscula, quō medicamenti penetret
 vis profundè.

Emplast. ad firmandum vterum. Rec. pulu.
 bol. armen. orient. corall. rubr. mastich. thur.
 myrt. rosel. rubr. baccar. lē tisci cortic. myrob.
 chebul. citrin. & ind. core. castan. intern. pom.
 cupressi, gallar. minutular, ana part. equ. resin.
 terebinth. & resinæ pinus quantum artifice
 perito videbitur, qui materiam igne deducat
 ad emplasti formam, quod imponatur aluta
 distentum panniculo subtili medio crebriu-
 sculè sorato, ne lumbi percalescant, vel hos
 vnguento illine Comitissæ, in delicatis verò
 semellis ternis præsertim mensibus crustam
 imponunt aniculę papyrum conquassato oui

candido exceptam.

Si periculum formidetur abortus, fatuli languidioris ergo. matris vmbilico da fctus ex carne vaccina prunis affata, & ita calida irrigorata, ac calido item vernacio vino caryophyllor. & cinnamom. pulu. conspersa.

Sunt & liquida fomenta. Rec. vtriusq. mēthæ ros. rubr. cortic. & frond. citr. ana p. i. caryoph. & cinnam. ana drac. ii. omnia crassiusculè terantur, & incoquantur vino spirituoso: expressis spongijs latis vteri fove regionem.

Item circa vterum applicāda olea ex mastic. de spica, & nuc. mosch. vnguento Comitissæ.

Syr. resorbendi ante prandium præter superius annotatos de infus. ros. rubr. de cortic. citr. de pom. cum iulep. cinnam.

Si consuetus aliàs fieri sit abortus ex immodica sanguinis inanitione: præsto sint ea præsidia, quæ paulo ante notauimus aduersus nimiam sanguinis profusionem.

Silaxata sint vteri vasa, corruptaq. temperies ab vna contagij venerici, quæ à tota substantia dicitur, causa: tum quia nil operæ præstare valemus: ad partus vsq. repurgationes propriæ curationi supersedebimus: quamquam doloribus vrgentibus per vesanam luem coactus eris inito iâ quarto, & toto intra sextum interuallo clementiori non parcere medelæ.

Si verò discrimen interminetur febris ma-

ligna, senum, & præceptorum meorum non illaudatus fuit, mox & sanguinis tentare miffiones, & medicamentis catharticis citra no-
num vti compressiuis.

In difficultatem partus.

NOno mense verentes nos partus difficul-
tatem præscribere debemus tenuem vi-
ctum, ne nimio prægrauetur fetus.

lura pulli concoquendo resoluti, quod vul-
gò consummatum vocant.

Sorbitiones ol. amygd. dulc. recentis pondo
vnc. ÷ cum aliqua portione sacch. rubri, re-
sorbandæ quotidie summo mane.

Inunctiones ad vterum singulis diebus fa-
ciendæ ex ol. amygd. dulc. & sesamino, quod
posterius educit & fatum mirificè, quæ & sub
partum, & ipso connixus extremi puncto di-
gitis primoribus obstetricis in vterum immis-
sis sunt faciendæ.

Observationes alias leges apud Galen. 3.
de natur. facult. cap. 3. Adde & hanc cautio-
nem, ne obstetrices nimio contrectatu, & di-
lancinatu debilitent matricem in opere isto
laborioso.

Aliæ vnctiones peropportunæ sunt ex bu-
tyro vel solg, vel resoluta ad calidas cinerum
sauillas cum ol. amygd. dulc. recent. addito si
velis, & sacch. rubio.

Sternutatoria quoq; commendantur; si fa-
tu-

turæ feminæ non sit imbecille caput.

Solent & in difficili partu laboranti feminæ præbere vinum annosum, aut a. j. naph. in qua sit infusus fœmus falconis, aut accipitris tenuissimè contritus.

Utriusque vero loco fuerit pulvis ex cort. cassiæ fistularis in utroque etiam liquore sorbendus.

Fomenta fiant ad umbilicū, quippe quod ad uterum impressa, maturo iam fœui possent incommolare, tātum infimis loculis tuto potest hydrelæum administrari, quod recip. arthemys. origa. puleg. mercu. pariet. flor. chamem. matric. & labio. ana p. i. ex decocto expressis spongijs ad pubem utitor.

Redacto fœtu ad commodissimum suum locum, ubi iam fœtanti quieuit insolentia doloris, ad extremum enitenti frugiferum irritamentum erit.

Suppositoria salis gemmei madefacti in ol. amygd. dulc. vel tincti felle apri. vel suis, ut quæ turgentine facultatem valent incitare.

Verum pro dolor? forte fortuna mortuo fœtu, labor alius est derrudendi, matris ergo, ne succumbat festinè putredini, sic trochisc. de myrrha pondo drag. i. aut eodem pondo cort. cassiæ fistul. aut rhabarb. tenuissimè contrita solemnia sunt omnia. necnon explorato per tres obstetrices infantis extincti casus.

Fomenta non sunt omittenda, qualia fuerunt ad molam extrudendam enarrata.

Inunctiones valentiores ad locum vtero incumbentem ex ol. de cappar. ol. de absynt. vel commisto suc. cyclam. & trochis. de myrrha per pistillum in mortario inscriatis.

Semina filicis ore pota factū educunt mortuum, eripiunt vinum. sed nil præstātius scrupulis 2. argenti viui, de quo Matthiol. cum non potest educi factus. Quibus nil proficiētibz extremæ, & præiudicatę efficacitatis est embryotome, id est præsectoria factus in vtero mortui chirurgia, de qua Franciscus Ruffetus in lib. de factu Cæsario, Pareus, & Pigreus & qui non scriptores chirurgi? quam ipse etiā cum laude feci Neap. in Castro nouo super vxore Magistri Horatii opificis scloppetta-rij.

Ad inflammationem, & exulcerationem vteri.

PER Galen. com. 23. aphor. 41. sectio sit interne dexteri cubiti venæ ex altero brachio repetēda, non abeunte dolore. mox autem non sedata molestia, bis facta reuulsione tentanda deriuatio rursus est in sectione sapphenæ; constante tamen facultate vitali.

Porro vult etiam incidi Galenus pro deriuatione, non autem pro reuulsione 13. method. med. cap. 2. & libr. de curat. per sang. mis. cap. 18.

Syr. refrigerantes, & reprimētes, ne putredo proserpat in abdito vteri conclaui, sunt eius.

succo fumariz, plantag. endiu. portul. gly-
cyrrh. viol. & ros. cum aqua nymphæz, hor-
dei, cich. lupul. glycyrrh. quæ consulit & cō-
tiguz vesicæ. Acida vitanda aut aq. aut sy-
rupi, vlcerum obledendorum metu.

Medicam. purgans lenituum, & attem-
peratiuum ex manna, vel saccharo violato
dissoluto in succ. ros. persic. vel cass. dissol. in
iure pulli, vel in forma boli cum Diacath.
vt sit potius euacuatio per aluum, quam per
renes, & horum vias.

Inunctiones ex ol. ros. omph. ol. viol. ol. de
cucurb. populinum hyoscyaani, nymphæz,
papaueris, & similibus.

Vnguentum populeum, & rosarum.

Fotus vteri, Rec. malu. althæz viol. hord.
caric. ping. & furs. ana p. i. bull. in aq. fontana
suffic. expressis ex decocto spongijs vtitor.

Pessaria ex frond. mali. & viol. ana par.
æqu. & modicum sacch. n. & tere minute,
fiat pupat. ligata per f. um, & intincta ex ol.
recentius ex amygdal. dulc. elicto inmit-
tenda.

Iniectiones ex aqua plantag. hordei, &
nymphæz, in qua dissoluta portio sit saccha-
ri violati.

Suffumigium concoquens, ac digerens,
Rec. 4. simpl. anodyn. maluz, & althæz caric.
ping. ana p. i. bull. in hydrelço, quod applica
per spong. ad pubem, & ceruicem vteri.

Facta per hæc suppuratione, rursus admi-
ni.

nistrentur iniectiones, quæ sunt huiusmodi,
 Rec. sem. comm. frig. maior. bene contrito-
 rum, aq. decoct. malu. & alth. viol. & hord.
 partes æqu. singulorum.

Pessaria ex adipe anseris, & gallinæ ana-
 par. æqu. croci dra. ÷ malu. althææ cunctæ
 simul eodem modo m. & in nuncio depen-
 dente per oblongum filum in uteri vacuum
 immitte.

Electuaria ex sem. melonum, & pulv. gly-
 cyrrh. & cum sacch. dissol. in aq. capill. ven.
 fiat electuarium, quod digerit, & suppara-
 tionem dirumpit. Cuius delincta portio
 superpotare licet aquam hordei, vel adiacchi.

Inunctiones digerentes ex adipe gallinæ,
 vel anseris, aut anat. ol. utr. lilij de cappar. de
 absyth.

Iniectiones, & lotiones ex melle rosato,
 & aqua hordei recenti.

Emplastr. umbilico circumpositum ex ca-
 ragna gummi distensum in aluta orbiculari
 forma in medio perforatum.

Facit ad hoc etiam emplastr. ex tachama-
 hacæ expurgare valens os uteri. Facit & vul-
 gatum emplastr. è meliloto, & de 4. gummis,
 quæ attenuant, incidunt, & expurgant omnia.

Occallescente utero laudant unguentum
 dialthææ manus iridatum applicitum ad re-
 nes, & pubem. sed emanante iam expu-
 gatione purulenta, tunc opus est potu aquæ
 mulæ, tū in prandio, tū in cæna quotidiano.

Aqua

Aqua salis prunellæ dissoluti aq. plantag.

Iura pedum veruccum elixa cum hordeo torrefacto.

Iniectiones ex aq. plantag. agrimon. arthemysia, portulacæ cum syr. de glycyrrh. vel cum rhodomelle, & infusione rosarum. Quibus & pulueres pro voto, proque indicatione licebit immiscere; si postquam hi fuerint immacerati, destillatio per filterum fiat, aut diligens colatura.

Electuar. Rec. rosarum rubr. immaturæ collectarum vnc. iiii. sem. portulacæ, papau. malu. & lapid. hæmat. ana dra. i. pulu. corall. rubr. dra. ii. sicch. albi dissol. in aq. plantag. aut portulacæ suffi. fiant tabellæ, quarum particula delingitur summo mane ex aqua hordei, vel mulsæ competenti portione.

Emanante materia grauis odoris, vices nos dies lacte vitæ asinino, mox vicienis alteris diebus lacte caprino, quod erit vtrūque pro re chirurgica.

Postremo radicis chinæ decoctum non omittendum erit, ut quod affectibus inueteratis præiudicatæ semper fuit utilitatis.

*Ad defectum, redundantiam, grumos
lactis.*

Cibi quasi fermentantes, & boni succi commendantur in lacte, quod desideratur, prouocando; contra vero in huius reductione

dundantia reprimentes.

Vina deligantur dulcidula non acida, nec acuta, sed oligophora, & lymphata; nimirum ut eo potu penetrent facilius, quæ commendantur ad ubertatem lactis inducendam: abstinendum autem à vino his, quarum habitus gracidis est, & calidior natura.

Cibaria sunt calida, & humida dulcia, & in uniuersum sanguinea, quippe quæ proportionalis lactis est materia, sic abigenda sunt acuta, & acuta, acida, & austera, salsa, styptica, laxatiua, sed media, pessimum legumē à cicere. ex maceratis vitæ partes omnes exangues, nisi quod cerebra credo utilia. carnes iuniorum, & oua sunt optima.

Semina quæcumq; sint edulia, præsertim feniculi, & mundi melonum nuclei.

In potionis usus aq. mulla, vel aq. glycyrrhizæ, vel aq. passul. enucleatarum, & hordei.

Nutrices commendant amyllum torref. nuces auellanas, semina sesami, vulgo dicta giorgiolima, quæ calabræ producunt terræ. quædam à proprietate creduntur cōducere ducētia, sanguinem, ab ipsis verò bibitor, vel aquam passul. vel vinum oligophorum lympharum hordei decocto, vel asparagorum.

Somnus, & quies conferunt prouentui sanguinis.

Brassica cocta cum semine fenic. cumque radic. petrosil. & apij, quorum

Decoctum & usu potest esse fomenti, quod

quod inducas spongijs ad mammas, sub quibus licet apponere cucurbitulas, Hippocratis præceptione in libro de medico ad attrahendum oblongas.

Frictiones dorso respondenti mammis, & rectius ad clauiculas, descendente inde manu paulatim adusque mammas.

Vnctiones ex ol. amygdal. dulc. recens expresso.

Aliæ inunctiones ad mammas ex oleo lumbricorum, quorum in tepido laterculo, vel fumi halitu siccatorum pulvisculus pond. 3. r. vel 2. ex albo olygophoro vino haustus à proprietate lactis copiam facit. Vel potetur ex iusculo ad hunc ritè modum parato. Rec. plusculos lumbricos decies lotos ex vino flauo bono, decoquito in aqua, quæ receperit radices, aut semina feniculi, petrosel. & pusillum croci, ex hoc iure tepido facto mulier foeta resorbeat cotylam, seu mauiſ cyathi plani mensuram.

Salsamenta quamuis à plerisque laudata, quia per aridam stim, lacteam inde potentiam inducunt, apud me suspecta est, & effecti ministræ fortasse contrarij: mentha, & semen, & lac exhaust, nec minus acetum, quod è diametro repugnat lacti.

Dulcis autem sanguinis inopia, bilis amaræ copia præſente pituitæ cruditate, melancholiæ importunitate incommodantibus, humorum commodationi, & adæquationi

vacandum est, a quo adeo per syrupos, & cathartica sepius à nobis exposita, negotiū est nauandum.

Quod si à febre ardente corpus fuerit arefactum, & sanguine exhaustum, auxilijs ad tabescentes multis vltor præmonstratis.

Ad redundantiam lactis...

Sanguinis emissio ex saphena dextri pedis, secundo ex sinistro, tertio, & postremo ex vena dextri cubiti iecoraria.

Cibaria sint assa inspersa limoniorum aurantiorum acerbis saporis, & omphacij succo. in vniuersum sicca, & exucca, & superioribus contraria.

Vina sint nigra, crassa, viseosa, passa propterea, quod & vias obstruunt, & sanguinem incrassant, stipant, & firman, quominus transcurrat, & alta petat.

Aqua verò in vsus omnes coquendi, atq; bibendi hauriatur de cisterna.

Motus, & vigilia plusquam par est vsu vitæ captandi.

Fomenta ad mammas ex paribus acetis, & aquæ portionibus per spongas latiusculas adhibenda.

Ruta comesta siccat, & fortasse plus mentha minutula, & crispa.

Viticis item, siue agni casti, vel coriandri præparatorū ad omnes vius drachmæ pōdo.

Ca.

Cataplas. verò, quod **Rec.** farin. hord. & farin. lentium ana p. i. mentha p. ÷ ruta dra. ii. sem. agni casti dra. i ÷ ferueant omnia in posca m. in mortario, & redige ad formam emplasti, quod appone mammis.

Illitus ad mammas ex melle calido indutus, desuper verò mentha contrita, & vndique inspersa; postremo pânus linteus obdutus resina terebinthina. quod quidem medicamentum non occurrit solum generationi lactis futurae, sed & præsentem dissipare valet.

Illitus ad dorsum ex vnguento populeo, siue, vt nominat **Cordus**, populino.

Vnguentum, quo matronæ quædam vtitur, **Rec.** Gypsi bene triti, farinæ lentium, & hordei ana dra. i. butyri recentis decies loti cum aq. ros. rubr. vnc. iii. ol. ros. omphac. & myrthia. ana vnc. i. terebinth. vnc. ÷ ceræ parum m. & sec. art. fiat ceratum, quo mammae tingantur.

Prouocantia menses, quales sunt pupatellæ frictiores inferiores, cucurbitæ, ligaturæ, de quibus antea suis locis.

Si veniat inde sanguinis affluxus in mamas, quod tenuis humor huc facile rapitur, corrigendus hic medicamentis est incrassantibus, qualia nos aduersus profluentes menses, & ad dysenteriam obtendimus.

Ad grumos lactis.

QUum lac in mammis grumescit, si sit hoc caloris vitio compingentis:

Syr. sint infrigidantes, quales sunt syr. viol. syr. ros. omphacitidum, cichor. sy. endiu. plantag. portul. nymphææ cum aquis earumdem herbarum hordei, coriandr. stellariz, fumariz, & si quæ sunt aliz.

Externa parte superduntur folia menthæ latæ, fol. vitis, plantag. phyllitidos, canabis, cyclaminis, gladioli, marthubij, verbasci.

Sectio saphenarum utriusque pedis, insuper iecorariæ dextri cubiti.

Syr. attenuantes de rad. Gentilis, de capill. ven. de suc. endiu. cum aq. ceterach.

Medicamentum ex cassia, vel ex manna dissoluta in iusculo pulli sufficienti, vel saccharum violatum dissolutum in succo ros. persic.

Potus autem quotidianus aquæ mulsæ, quæ componitur ex vicenis partibus aquæ, & vna mellis, sed de hac Mesuen adi.

Fomenta in materia frigida, siquidem nō intercedit febris:

Componere sic. Rec. sol. brassicæ, sol. beræ, flor. chamæm. fenigr. semin. lini, apij, petros. ana p. i. decoque in hydrelæo, quod spongijs exceptum induc ad mammas crebrò mane, & vesperi.

Infusiones erūt ex ol.vtriusq; liñj,ol.cap-
par.ol.menthæ, ol. rutaceo, ol. de laterib.
singula aut ea, quę volueris, coniunctim il-
line ad mammas tepidè.

Vnguentum autē citrinum etiam exsiccā-
do, & absorbendo valet.

Coagulum lepor. vel hēdinum reprimie
externum lac, vt internum contūpatum li-
quat. quade re vife Galen.x. de simpl. med.
fac.vbi decoagulo, quod alioqui soluitur, aut
diluitur ol.amygd.dule.

Ad lūem Veneriam.

INsequuntur hanc contagionem primum
impressam bubones, pustulæ penis, go-
norrhœa, seu rectius pseudogonorrhœa, viru-
lentus scilicet effluxus e mentiens seminalem
emanationem. At eodem morbo diu confir-
mato subrepunt gummea concrementa, te-
redines ossium, vlcera, tabes atrophia, cru-
ciatus, omnia vitia cacoethe.

Distingues itaq; affectum per bina tem-
pora, perq; bina signa. nam horum priora
symptomata tibi demonstrant affectionem
ineuntem, posteriora consummatam.

Bubonibus igitur apparentibus abstinē-
dum est à venæ sectione, & à medicamento
purgante, quominus natura bonū corporis
optimum ordinans, ab opere distrahatur.
Causaque exitialis. ab. extimo corporis

Q

ha.

habitu fugata ad intima iecoris, & immedullas ossium recondatur. Verum nil impediētibz interdum effusionibus, aut bubonibus, aut gonorrhæis:

Syr. ordinabis interna corporis superuacua digerentes, & nativam iecinoris facultatem roborantes: ex his erunt syr. de fumaria, de infus. rosar. endiu. cichor. lupul. & absynth.

Sic Rec. syr. de succ. cichor. de fumo ter. & de infus. ros. ana vnc. ÷ aq. melissæ vnc. iii. m.

Motus extenuandis, & foras euocandis mali fomitibus non nihil conducit.

Atque ad laxius effundendos humores malos, nō incommoda sunt iuscula, & elixa.

Inunctiones ad affecta loca, si quando ea dolēt, ex oleis amygd. dulc. & chamæm. probata sunt etiam butyrum vetus, at sine sale servatum, & adeps gallinæ, cum dolor interior erit.

Fomenta sint hoc modo parata. Rec. simpl. anodyn. communium an. part. æqu. tepidiore decocto spongijs intinētis, prolue partem laborantem.

Servetur hæc ratio medendi, donec apparuerit rubor, & rigor per nervos spinæ dorſi cum insequa febre; tunc quod signa sint hæc aduentantis suppurationis, ordinandum est

Cataplasma, quod Rec. maluz, althææ, fermenti

menti tritici, caricarum ping. ana p. i. decoque in aqua fontana. materijs optimè contritis adde adipis porcini putrefacti vnc. ii. croci dra. ÷ m. confice cataplasma 4. diebus vtendum.

Facta suppuratione, tum ope medicamentum, tum naturæ:

Señtio fiat mediæ dextri cubiti. Ab hinc verò duos dies

Medicam. purgans ex syr. ros. solut. syr. D. August. cum sacch. viol. & conf. Hamech. cum dosibus competentibus. Post hæc vniuersale.

Decoctum spartz pariliæ descriptione, quam nosti.

Si non consummetur suppuratio critici bubonis, sed potius scirrhescat, & vndeque albescat, expectata maturitate temporis, ordinandæ sunt accommodæ fotiones, & inunctiones ex efficacissimis linimentis. Quæ sunt;

Oleum ceræ, oleum butyri, oleum ammoniaci, singula destillata, & mista, siue seorsim vsitata. Ol. item mandragoræ descriptione Cordi, meo quidem experimento mirum est; quippè quod omnes illius olei materiæ humore singulis intenso nimiam scirrhii siccitatem amoliri valent, atque resolvere. Cedit autem emplast. diachylon maius, nedum ceratum meliloti. Cedit & emplast. de ranis norma Ioannis à Vigo cum addicamento Mercurij.

Interè casum in omnem scire licet ad tranquillandum hominis contagiosi corpus, ad meliorem ei valetudinem procurandam, nil præstantius esse sudoribus, quæ tum artificiosis, tum naturalibus æstuarijs excitentur, non vno quidem semel, sed plurimis rite diebus. sudabulorum autè formas habes in efficaci medicina.

Ad Gonorrhæam contagiosam.

Hætenus de lue primum incunte, quæ corporis exteriora pertingit, nunc de gonorrhæa, quæ fonte manat profundiore. Cui quidè abolendæ nõ est vsui, sed explorato ferme periculo venę sectio, ne materia caecoethes, quæ discurrit adhuc in ceterioribus vijs, cohibeatur in visceribus, & subinde vesana lues purum inficiat hepar. conueniunt autem

Syr. refrigerantes non aperientes, qui cõgruerunt alioqui gonorrhæz. Sunt vero de infus. ros. de succ. cichor. ana vnc. i. aq. lupul. vnc. iii. m. His vtitor aliquot diebus optima cum victus ratione; mox rite properat

Medicam. purgans, quod Rec. syr. ros. solut. & de succ. viol. ana vnc. ii. syr. D. August. vnc. iii. conf. Hamech. vnc. ÷ cum aq. hord. fiat potus.

Duobus autem ab hinc diebus aliqui non parcunt sanguinis emissioni, sed ego maiore eam ratione parcerem. Postmodum paretur

De-

Decoctum spartæ. Rec. Rad. spartæ paril. concisa vnc. iiii. infundatur in sex lib. aq. fontis 24. horas, deinde fiat decoct. secundum artem ad consumpt. duarum part. aquæ, & adde sol. senæ orient. vnc. ÷ flor. borag. viol. cichor. fumit. lupul. maluæ ana p. i. semia. melon. vnc. iiii. In singulos vsus hauri de colatura lib. ÷ viginti diebus, assidue, mane.

Post hæc aqua spartæ tum prandio, tum coena potetur, hoc modo paranda.

Rec. Rad. spartæ vnc. i. infun. in lib. xij. aq. fontis toto spatio 24. horarum, fiat decoct. secundum artem ad consumpt. tertiæ partis aquæ, adde sub finē coriadr. præpar. vnc. ÷ glycyrrh. rasa, & cont. dra. iij. cinnam. elect. & seminum maluæ ana dra. ij. facta colatura seruetur pro potu, quem retineat 30. diebus, æger optima victus instituta ratione.

Sudores nè prouocentur æstuarijs. neque enim porrigenda est obnoxijs inflammationis ansa, verum tamen hic præcisè loquor de recentiore gonorrhæa; cui feruor, & æstus hæret: ceterum enim inueteratis, & obstipatis difficilè succurritur citrà sudationes.

Inflammat hæc affectio quandoq; præputium, & penem exulcerat, & acerbis doloribus glandem excruciat, vt in eo viro, quem cum D. Iosepho Basili feliciter curau. quapropter ijs aduersantes, rationi consentaneū est, opitulemur, tum afflicte glandi, tum operimento exteriori. Iaq; sunt vlcuscula,

quæ latent, quacunque sit suspicio, detergēda, & proluuies vndiq; est proluēda myrtill. rosar. alb. vel plantag. aqua, vel succo, seu puro, seu cum tuthiæ puluisculo. Dolor autē intēssimus obtūdendus erit succo lactuæ. Sēpē etiam opij tantillum dilutū succo plantagin. aut lactuæ, vel solani, vel si mandragoræ oleum à Cordo descriptū haberi possit, dilutum hoc aqua hordei, seu per siphunculum, seu per guttolum, seu per spongionem in apertum vtraque ministri manu præputium.

Ad vlcuscula penis, caries vocata, vulgò tarlos, & inde Tarolos.

Non malignis, at leuioribus penis vlcusculis vnguentum pompholygis, aut de tuthiæ extensum in petiola satis, aut eiusdem, aut lithargyri puluisculus.

Si verò maligna dolore, & inquiete etiam nocturna sint prægrauātia, continuo leuabis hominem medicamento cassiæ recenter extra&æ pondo vnc. i. ÷ cum diacath. & conf. Hamech singulorum pondo ÷ trochisc. de Berberis dra. i. rad. glycyrrhizæ tenuissime contritæ dra. i. ÷ cum sacch. m.

Si verò septa sint vlcera putredine, tū ergo æris, & hydrargyrium, quod appellant præcipitatum, siue pura, siue lota rosarum, a. b. aqua, siue vnguento rosato commista

vitium exhauriunt, & aqua item eius loturæ percommoda est, si sine dolore, conducit & baptitura æris, autore Cæsalpino libro de metallis.

Si verò fuerint vlcera fœtida, & corrupta, protinus intingenda sunt aqua Fallopij, quæ recipit hydrargyrium sublimatum. Sed cum vlcus abstersum, & limpidum fuerit, implendum est carne per modice siccantia, quales sunt

Pulueres ex his materijs, Rec. cort. thur. mastich. corall. rubr. boli arm. orient. sang. dracon. aloes sandarachæ ana dra. i. sumac. dra. ʒ. contrita subtilitè inspergantur, qui pulueres iidem ad cicatricem inducendam in pauca portione bene facient.

Ad defluuium capillorum.

Ioan. Fernelius Ambianus in libro de lue Venerea tres huius species facit, quot sūt scilicet febris. Spiritus enim quæ occupantur in ephamera, & defluuium capillorum. In secunda specie febres putres, & gonorrhœa ex fracescentibus humoribus. In tertia specie hectica, & ossium terebines, & exostoses vsque medullas.

Casus igitur capillorum, quæ leuissima contagionum omnium venerearum est affectio, ex habitu est nitroso & spermaticis infectis partibus elato. quoniam autem tenuis,

ac leuis est ad vsque caput, & capillos diffunditur; detentus autem in radicibus capillorum hos aut deterit, aut corrodit.

Venz sectio internæ dextri cubiti non curatiua quidem est, sed præseruatiua, ventilandis videlicet humoribus, qui subditi sunt ipsi corruptioni.

Syr. de fum. de cichor. de lupul. cum aq. endiu. & stellariz.

Medicam. purgans, quod superiori capite notatum est.

Decoctum spartz, quod sæpe numero descriptum est.

Lotiones vt renascantur, & firmentur, seu ciliares pili, seu capilli. Rec. baccarum lauri, malicorij, balauſt. myrt. nidi hirund. ana p. i. ros. rubr. incompl. p. ii. mell. vnc. ii. pulu. apu cremat. vnc. i. ferueant omnia in xii. lib. aq. font. & lixiuij ex radic. arundinum ad consumpt. tertiæ partis. facta colatura feruetur pro lotionem capitis, & locorum faciei destitutorum ornamento pilorum.

Inunctiones, Rec. pulueris cutis calpæ cochlearum, & apum vſtarum ana vnc. iii. ladan. dr. iii. pulu. baccarum lauri, myrth. malic. balauſtiorum ana dra. ii. mell. opt. vnc. i. ceræ, quod suffic. secundum artem fiat vnguentum illinendum capillitio reſecto, spongia noua ad rubrum vsque colorem perfricato, & loto capite ex dicto lauacro.

Frictiones, & inunctiones capitis adhuc

abstergentiores.

Rec. cyclamen cortice purgatum, & hoc forti manu caput frica, mox iniunge ol. elleborino, quod paratur sic;

R. elleb. minutim incisi vnc. $\frac{1}{2}$ in vnc. vi. ol. ros. & cyatho medio, vel solido vini albi spirituofo, decoque donec expirarit vinum.

Ad Scabiem ex contagio Venereo maligno.

Dicta est hæc scabies nonnulla similitudine scabiei vulgaris.

Cutem exasperat diffusis vndique pustulis cum marginibus qua præduris, qua edematosis, ex quibus emanat sanies quædam tenuis, & serola. & tenuis quidē quodcumque partium circumtigerit virū suo, statim inficit, & exulcerat, atque inde fit contagium, quoddam exardens vitæ, quod appellatur à nostris Elephantiasis, omni late cute reddita velut elephantis verrucosa, & squallida.

Venæ sectio internæ dextri cubiti, & postæ finistri.

Syr. sunt exhibendi violatus, de succ. cicchor. fumar. lupul. cum aquis borag. stellariz, nymphææ, &c.

Medicam. purgans, Rec. syr. D. Augustini vnc. iiii. sacch. violat. vnc. iii. conf. Hamech. vnc. $\frac{1}{2}$ cum aq. decoct. fol. senz orient. si. po.

Vel Rec. senz. orient. vnc. $\frac{1}{2}$ epithym. & gly-

glycyrrhizæ ana dra.ii. agar. troch. dra.i. fiat deco& in aq. borag. & in suffic. colatura dissol. syr. de s. infus. ros. persic. & de succ. viol. recen. ana vnc.ii. cōfec& Hamech. dra.iiii. m. & fiat potus.

Serum lactis caprini incoque quotidie flores borag. fumar. lupul. ana p.i. vel interpellata ternis quibusq; diebus deco&ione. Vicenis, quaternisque diebus diluculo lib. ÷ hauri calidè.

Afininum verò lac quadraginta diebus, vt maiore cum profectu debibat Elephantio- des homo, decimo quoque die voret bolos, cassiæ rec. extr. pond. vnc.i. conf. Hamech. vnc. ÷ confice cum modico cinnam. stoma- chi bibendo; lacte laxati ergò interquicto post longas seri potationes aliquantisper homine, qui tractatur.

Hirudines affigendæ venis sedis.

Balneum subueni homini, quod est Pu- teolis, vel alterum dictum de Scabie per 7. dies affundendum, siuè rectius intrandum in cupa vtendum in oblonga.

Perdurante, & parum se remittente squa- lore mali, confugiendum ad Æsculapij ser- pentem, cuius proprium est atriam bilem; & salis has corpore fodinas emundare, Docto- re Petro Aponensi comment. ad Mesuen., qua de iecoris alie ratione.

Rec. capri ribus, & caudis extractis ceruo- nes angues duos. elixentur in lib.vi. aqu. su-
mar.

mar. vel stellariz. donec discoctæ carnes resoluantur à substratis spinis bis sesquipedalibus mundæ. adde ceterach. capill. vener. borag. cichor. fumar. lupul. endiu. hepaticæ ana p. i. fol. fen. orient. vnc. .i. factæ primum colaturæ, mox forti expressioni adde sacch. albi suffic. fiat syr. longus, cuius delibet homo vnc. iiii. quotidie sub auro.

* Vesperis refouendus est languens electuarijs ex carnibus torosioribus ceruonum, hoc modo parandis, Rec. carnes elixatas, vt dixi, ceruon. vnc. iiii. femin. melon. vnc. i. sem. portul. maluz, lactucæ, stellariz, nymph. ana dra. i. fantal. omnium ana dra. ÷ sacch. albi dissol. in aq. cichor. suffic. fiant elect. in offellis, delingantur tribus horis ante cenam. A quibus delibatis offellis superpotetur

Aqua parata sic. Rec. ceruonum duorum carnes amputatis capitibus, & caudis, mūdā testudinem, cichor. borag. hepat. lupul. sonchi, meliss. ceterach. capill. ven. ana p. i. micæ panis lib. ÷ imponantur materacio vocato vitreo cum aq. cochlearum, cichor. & lupul. eius extra& aquæ pora lib. .i. ingesto iam electuario. Insistatur huic ordinationi dies viginti, vel quindecim ad minimum.

Non referente pedem etiamnum malo deneniendum est ad efficacissimas vipersas, præcipuâ harû vtilitatē promittente Galeno in libello de theriaca ad Pisonem capite iv, sic, Rec. vipersas feminas tres, resectis capitibus,

tibus, & caudis elixa carnes in lib. xxx. aquæ fontanæ, donec mundæ carnibus resolutis ad extrahentes manus veniant spinæ. In qua rursus aqua decoq. lib. iiii. hordei, donec grana discoctione lōga reddita fuerint turgidula. Hoc autem vno carniū, & hordei viperini passu nutricandę sunt iuniores domesticę gallinę, vel capi, quę poturę sūt etiā præscriptam aquam. Sexto ab hinc die prendať esu languens paratas ex his gallinis, aut capis effat; sicut autem de plumis vīses ab estandis viperis gallinas, ita & elephātico videbis excidere demembris (quod nē te moueant, aut illum) pilos porro reponēdę sunt gallinaceis plumę; recursuri scabro homini, qui curatur, pili. Ad hęc nobis instantibus aduersus morbum, viperinum vinū non horreat languēs, ita parā ū. vīperas 3. viuentes, & solidę, id est capitibus, & caudis manētib; in amphoras xxx. meri demittantur, & in his præfocata triduo macerentur, quibus ē vase elicitis vino tum prandēs, tum cenans se proluat egens homo.

Hoc medendi genus vt hercle tetrū sic ex aduerso fructuosū Lectōr habeto, quo nostri maiores, & magistri auctoritate Cl. Viri Ioannis Bernardini Longi, vt confidenter, ita feliciter vsi sunt. Verum tamen aduertas velim, haud præterquam verno tempore viperina hæc affectanda esse præsidia, qua nimirum tempestate potioribus herbarum chymis,

mis, & rore probato vefcuntur aufpicatæ
beftiolæ. Quod autem attinet ad ceruini co-
loris angues, eos in tenui furfure dies xv. ca-
pſula concluſos foraminulenta memineris
detinere. Aliud in calce capitis adnotem;
licet; ſi madida iam primum vlcera, reddita
per tuam hanc curationem ſint falſa, non
contemnendum huius medelæ profectus
argumentum eſſe.

Ad Gummata, & horum dolores.

GRaniffimi excitantur per gummata cru-
ciatus, non alia me iudice cauſa, quam
quod per humores truculentos acrius, &
conſeruius laceſſitur perioſtea membrana,
quæ ſubſtrata malis gummatis, diſſeditur, &
ſoluitur adeò vehementer, vt impos homo
factus angoris ferendi conſternatur. ad quo-
rum acerbiteriam leuandam.

Prima eſt venæ ſectio ſc. internæ dexteri
cubiti.

Syr. nuper adnotati.

Medicam. purgans idem, quod ante vi-
ſum, decimo quoq; die demittendum in ven-
trem, & quadraginta diebus quater.

Vere, aut autumno ſudationes in æſtua-
rijs, ad quas exſudationes adiuuandas, & ad
labem abolendam:

Decoſta præcipua ſunt ſpartæ pariliæ ſic
apparanda. Rec. Rad. ſpartæ pariliæ conciſæ,

&

& lotæ, & ligni Guaiac. limati ana vnc. iiii. cort. eiusdem ligni contusi vnc. i. infundatur spatio 24. horarum in lib. vi. aq. font. coquatur igne lento ad consumpt. duarum partium. in fine decoctionis adde fol. senæ orient. vnc. ÷ flor. borag. cichor. fumit. lupul. stęchad. sampſuchi, beton. & iux artet. ana p. i. factæ colaturæ dosis est lib. ÷ pro syr. continuando dies 40. nisi quantum interponendę sunt decimo quoq; die purgationes.

Tempore hyberno sparta potanda sit ex vino, quod potest duobus modis apparari, vel cum pulvere hoc modo. Rec. spartæ paril. & fol. senæ orient. ana dra. vii. hermodaſyl. turbith. polypod. querc. coriandr. præpar. cinnam. & glycyrrh. ana dra. ii. terantur pulvere subtilissimo, de quo sumat dra. i ÷ in singulos vsus ex vino albo spirituoſo.

Vel eosdem pulveres sumat multos dies infusos in Oenophoro, idest in vase vini. Vtrumque binorum in aurora digerendum ante prædium quinas horas, cum tenui semper dicta spatio tot dierum, & temporis quotum adnotatum est in vsu spartæ syruporum, & sudationum.

Si descriptionem exponi petas infusionis in Oenophoro, Rec. vini albi odor. amphor. xxx. in quam mensuram infundantur hæc omnia; spartæ paril. concisæ, & lotæ ligni guaiac. limari, & fol. senæ orient. minutim incis. in lib. ÷ polyp. quercini, hermodaſyl.

ana ꝑnc.i. ÷ flor. cord. ꝑ.i. cinnam. ele&i
dra. ÷ omnia rudi manu contusa, infundan-
tur, vt præmonſtratũ eſt 24. horis : q̄ quater
agitetur prima die cum tota infuſa materia,
& ſemel in ſingulos vſus. interim ſeruetur
vas perpetuo coopertum. ſerat hoc patien-
tẽ ægrotus bibere tum mane, tum veſperi,
ſeu prandens, ſeu cœnans aqua ſpartæ tem-
peratum. diſſoluentur hoc, & Dei auxilio
gummata, fugabuntur dolores. Qui ſi ni-
hilominus perſentiantur:

R. Theriacæ ele&. drach ii. ol. chamæmēl.
ꝑnc.i. percalſactum igne medicamentum,
affricetur ad partes gummatoſas, ac dolen-
tes, vel hoc aliud.

Rec. ſpiritum vini triplici deſtillatione
elicitum cum o'. de ligno guaiaeco per de-
ſcenſum exſtillato. æquis vtriuſq; portioni-
bus vttere.

Emplaſtum etiam laudatum eſt è ranis,
vel ſimplex, vel cum emplaſti de 4. gummiſ
ſubduplo: ad ignem miſce, valentiſſimum eſt.

Balneum item benefaciet, quod Rec. flor.
chamēm. ſenigræc. ſem. lini, ſampſ. beton. ſer-
pill. frond. citri, roſarum immaturarum ab-
ſynth. ana ꝑ. ii. decoque in atheno amplo
pleno aq. marina, quæ cum fuerit imbuta
ſimplicium eorum virtute, transportetur
intrâ cellam cœluariam, vel in dolium extre-
mo ſuperiore adaperitum, in cuius medio,
& altiore ſcamno ſedens ægrotus diſſuet
ſudo-

fudoribus capite extra posito, ceterum humeros coniecto. sunt hæc balnea repetenda 7. diebus.

Electuarium, Rec. spartæ paril. vnc. iiii. senæ oriēt. vnc. iii. cardui benedi&i vnc. ii. hermodact. turbih. polyp. ana dra. i. conterantur omnia diligentèr, & adde mellis dra. xii. aquæ vitæ vnc. iii. confice ad formam opiata, vel sine huiore mellis, & aqua ardenti cum sacch. suffic. fi. tabellæ, quas dies xx. cōmandat eger, pondo vnc. i. mane, superpotata mox aqua parillæ.

Si morbus extrema exigat remedia, corpore, quod tractatur, commodè ferente, non parcendum est inundationi, quæ salutare recipiat argentum vivum, sed clementi tamen sub Cælo, & vna vitata hyemis tempestate, cautisque tabificis egroti conditionibus, & habitu gracilissimo præ oculis proposito, ut nisi releues hominem, saltem non perdas. Ad summam consultis senioribus, & protectione præmissa necessitatis.

Apparatur hoc modo medicamentum, Rec. Mercurij præparati cum spuro vnc. ii. adipis veruecini vnc. iiii. theriacæ opt. vnc. ÷ incorporatis benè materijs vnge loca dolentia, & corpus omne præter membra principalia. illapsæ virtutis hermeticæ argumentum est, quod affectus gingivæ sædam in emanationem erumpent. & quoniam obue-
nient angores oris, ac tædia sputationum

immensarum tuum erit, si compescere volueris, quod facies primum quidem.

Gargarismis ex diamoro, & diacarydio cum aq. ros. rubr. & plantag. sufficienti. mox Lambitinis ex syr. de cannis granat. dulc. & de hyssopo. tertio

Oleo de sulphure paucis guttis aqu. glycyrrhizæ excepto: compressis gingiuis breui sedat proliuam virulentiam.

Si gummata non resoluantur internis, & externis omnibus hisce medicamentis: sunt aperienda causticis corrumpentibus: exteriorem globum, & committenda chirurgicis: quippe quæ fermento putrido sunt erosa, ac tetra cariei vicio confecta.

Pauca sunt hæc, sed frequentiora symptomata luis Venereæ per nos hoc angusto loco tractata: cætera verò quamplurima sunt enarrata in nostro iusto Commentario de luis eiusce natura, causis, differentiis, iudicijs, & iudicijs, exposita ad summam diagnosis, prognosi, therapia.

F I N I S

*A Deo Opt. Maximo. D. Luca.
ac D. Gregorio Nazianzeno.*

ANALEPSIS

Argumentorum, & Capitulorum
singulorum, quæ in hoc
Opere habentur.

*Primum est Corollarium Aphorismorum
Hippocratis Libri primi.*

*Secunda est defloratio fen. 3. libri 3.
de febribus Aviceennæ.*

*Cuius pertractationis hæc series est
Capitulum omnium.*

Q uid sit febris, Cap. 1.	pag. 9
De Corporibus preparatis ad febres, cap. 1.	10
De temporibus februm, cap. 3.	ibid.
De cognitione temporum uniuersalium, & præcipue status, cap. 4.	12
De febre ephemera, & causis eiusdem, cap. 5.	15
De signis februm ephemerarum, & præcipue de signis ipsarum distinctiuis, cap. 6.	16
De permutatione febris ephemera, c. 7.	17
De	

<i>De signis permutationis ephemera in</i>	
<i>alias febres, cap. 8.</i>	18
<i>De curatione ephemera febris in uniuersum, cap. 9.</i>	ibid.
<i>De febribus putridis, cap. 1.</i>	20
<i>De signis febrium putridarum, c. 2.</i>	24
<i>De signis febris continua, cap. 3.</i>	25
<i>De ijs, in quibus conueniunt, aut differunt febres putridae, cap. 4.</i>	26
<i>De varijs signorum generibus circa febrem, cap. 5.</i>	28
<i>De rigore, frigesactione, & horrore, cap. 6.</i>	30
<i>De scopis curandarum febrium putridarum in uniuersum, cap. 7.</i>	32
<i>De propria febricitantium curatione, cap. 8.</i>	39
<i>De curatione febrium acutarum, c. 9.</i>	41
<i>De febribus biliosis, cap. 10.</i>	42
<i>De tertiana absolute.</i>	43
<i>De dignotione differentia tertiana pura, à non pura, cap. 11.</i>	ibid.
<i>De tertiana continua dignotione, & curatione, cap. 12.</i>	44
<i>De tertiana non pure curatione, c. 13.</i>	45
<i>De cauponis curatione, cap. 14.</i>	46
<i>De febre sanguinea, cap. 15.</i>	47

<i>De febre pituitosa, cap. 16.</i>	48
<i>De febre epiada, & lipiria, cap. 17.</i>	49
<i>De febris pituitosa curatione, c. 18</i>	<i>ibid.</i>
<i>De febre quartana periodica, c. 19.</i>	51
<i>De victu in quartana, cap. 20.</i>	53
<i>De curatione quartanae continua, cap.</i> <i>21.</i>	<i>ibid.</i>
<i>De hectica febre, cap. 22</i>	<i>ibid.</i>
<i>De febre pestilentiali, cap. 23.</i>	56
<i>De curatione februm pestilentialium,</i> <i>cap. 24.</i>	57

**Liber tertius est De floratio Methodi
Pauli Tuccæ de febribus, cuius
hæc sunt Capita.**

<i>De Tertianæ simplicis curatione, cap.</i> <i>1.</i>	59
<i>De curatione binarum tertianarum pura-</i> <i>rum interpolatarum, cap. 2.</i>	62
<i>De curatione unius tertianæ puræ conti-</i> <i>nua, cap. 3.</i>	<i>ibid.</i>
<i>De curatione unius tertianæ non puræ,</i> <i>deuenientis à cholera citrina, idest mi-</i> <i>sta cum phlegmate dulci tenui, cap.</i> <i>4.</i>	66
<i>De curatione unius tertianæ non puræ</i>	<i>in-</i>

<i>interpolata, famosa deuenientis à com- missione phlegmatis, cap. 5.</i>	69
<i>De curatione binarum tertianarum non purarum interpolatarum, cap. 6.</i>	74
<i>De curatione unius tertianæ continua no- thæ, cap. 7.</i>	76
<i>De curatione binarum tertianarum no- tharum continuarum, cap. 8.</i>	77
<i>De curatione febris caufonis, seu arden- tis, cap. 9.</i>	80
<i>De curatione febris sanguineæ, c. 10.</i>	82
<i>De curatione febris phlegmaticæ, cap. 11.</i>	83
<i>De curatione febris quartanæ, c. 12.</i>	85
<i>De curatione febris heëtica, cap. 13.</i>	88
<i>De curatione febris pestilentis, c. 14.</i>	91

Quartus Liber est Epitome Curatiua,
cuius materia sunt hi morbi.

<i>Phrenitis.</i>	96
<i>Letarghus.</i>	98
<i>Vertigo per consensum.</i>	101
<i>Vertigo per essentiam.</i>	102
<i>Cephalalgia.</i>	103
<i>Dolor totius cerebri.</i>	105
<i>Melancholia.</i>	106
	<i>Me.</i>

<i>Melancholia hypochondriaca.</i>	107
<i>Epilepsia.</i>	109
<i>Præservatio futura epilepsia per essentiam.</i>	<i>ibid.</i>
<i>Præsens Epilepsia.</i>	110
<i>Epilepsia per consensum.</i>	111
<i>Dolor dentium.</i>	113
<i>Apoplexia.</i>	115
<i>Catharrus.</i>	116
<i>Angina.</i>	118
<i>Ophthalmia.</i>	120
<i>Dolor aurium.</i>	122
<i>Suffusio.</i>	124
<i>Parotides.</i>	126
<i>Peripneumonia.</i>	128
<i>Syncope.</i>	130
<i>Asthma.</i>	131
<i>Palpitatio cordis.</i>	134
<i>Pleuritis.</i>	136
<i>Phthisis.</i>	138
<i>Empyema.</i>	140
<i>Tussis.</i>	141
<i>Sputum sanguinis.</i>	142
<i>Vomitus, & nausea.</i>	145
<i>Cardialgia.</i>	147
<i>Singultus.</i>	150
<i>Circa, & pica;</i>	153
	<i>Oris</i>

<i>Oris tortura.</i>	154
<i>Lumbrici.</i>	156
<i>Celiaca, Diarrhœa, & Lyenteria.</i>	159
<i>Fames canina.</i>	161
<i>Dolor colicus, & iliacus.</i>	163
<i>Cholera.</i>	166
<i>Inflammatio iecoris.</i>	167
<i>Dysenteria.</i>	169
<i>Hydrops.</i>	173
<i>Schyrrhus iecoris.</i>	176
<i>Inflammatio lienis.</i>	179
<i>Scirrhus lienis.</i>	180
<i>Inappetentia</i>	182
<i>Obstructio Hepatis.</i>	184
<i>Suppressio urina.</i>	186
<i>Diabete.</i>	189
<i>Calculus renum, & vesica.</i>	191
<i>Impotentia coeundi.</i>	195
<i>Priapismus.</i>	197
<i>Inflammatio renum, & vesica.</i>	199
<i>Gonorrhœa.</i>	202
<i>Ulcera renum, & vesica.</i>	206
<i>Retentio mensium.</i>	208
<i>Profluuium mensium.</i>	211
<i>Profluuium alui.</i>	214
<i>Vteri procidentia.</i>	215
<i>Strangulatio vteri.</i>	217

Mo.

<i>Mola uterū</i>	219
<i>Sterilitas.</i>	221
<i>Abortus.</i>	226
<i>Difficultas partus.</i>	230
<i>Inflammatiō, & exulceratiō uteri.</i>	232
<i>Redundantia grumorum lactis.</i>	235
<i>Redundantia lactis.</i>	238
<i>Grumi lactis.</i>	240
<i>Lues uenerea.</i>	241
<i>Gonorrhœa contagiosa.</i>	244
<i>Ulcuscula penis caries uocata, uulgo tato li.</i>	246
<i>Defluuium capillorum.</i>	247
<i>Scabies ex contagio uenereo maligno.</i>	249
<i>Gummasa, & horum dolores.</i>	253

FINIS.

D E
PAEDANCHONE
M A L I G N A,

S e u
DE THERIOMATE FAUCIVM
PESTIS VI

PVEROS PRÆFOCANTE.

AVTHORE MARCO AVRELIO
SEVERINO.

Medico Philosopho in Regio Lycao Nea-
politano, Anatomes, & Chirurgia
Professore longè Celeberrimo.

Cui accessit Commentarius Cl. Viri
THOMAE BARTHOLINI
Danorum Regis Archiatri.





ΜΑΙΑΛΓΧΟΝΗ ΛΟΙΜΩΔΗΣ

Seu

De pestilente, ac præfocante pueros
abscessu.

EIVSDEM MARGI AVRELII
SEVERINI.

Ad ingenuum Lectorem Præfatio.



Nter omnes animantes, quæ à
Deo Opt. Max. Conditor primò
prodire, nulla fuit homi-
ne, vel dignitate celsior, vel am-
plitudine maior, vel formæ de-
core probatior, vel ornamentis omnibus
cumulator. Argumento est, quod in huma-
ni opificij creationem, & conformationem
summus ille Architector in cōsiliū, ope-
risq; societatem Sacrosanctam Trinitatem
adhibuerit. Declarat autem & præstantiam
procreationis ordo. quippe fuit editus in
lucem homo post cuncta; ac si maximum
quidpiam, & supremum plenis prærogati-
vis numeris efficiendum fuisset. Docet & exem-
plar, ad cuius ideam efformatus fuit idem:
quandoquidem est microcosmus hic fictus

ad archetypum macrocosmi, in quo cœlestia, terrena, & media velut in parua picturæ mappa inexplicabili prope compendio cōtinerentur omnia. quo factum est, vt summæ cuiusdam rei, diuiniq; miraculi loco sapientes omnes habuerint hominē: qui solus immortalē Dei portionem obtinuit: qui rationem, orationem, versatilem ingenij dexteritatem, futurorum prouidentiam, societatem civilem, hospitalitatem, pietatem, sanctitatem, fidem, & quas non virtutes, exercet, & colit? qui principatum in omnia mundi viuentia, & non viuentia, quie imperium pro libitu voluntatis in omnia concreta corpora diuinitus exercet.

Cuinam enim motu perpetuo ciētur Cœli? cui Luna noctu lucent, & astra? cui Sol modo accedit, modo recedit ab Oriente latus ad Occasum? à Polo Arctico ad Antarcticum, à Capricorno ad Arietem, à Cancro ad Libram? nimirum inuecturus temporum vicissitudinem, æstus, & frigoris, & horum medias stationes, lucem, & tenebras, pulchram formarum productionem, & necessariam rerum corruptionem. Adhæc cui tenuis aeris substantia fluit, refluitque? cui pelagus, & flumina pisces alunt? cui vegetantium tot species, metallorum varietates, bestiarum, & iumentorum ordines seruiunt? Finiam denique sermonem; si dixerim opificem mundi sapientissimum ab omni naturæ
sa,

fabrica, tum demum manum summouisse, ac vacauisse, cum in medium productus est homo; perinde ac complementum absolutio, & summa rerum omnium euenisset. Verum ò felicitatis humanæ leuitatem! diuino huic mundi miraculo, rerum omnium ornameto, finique; subito suo vno præuaricatu multi subinde suscitati sunt hostes, & nulla ex omnibus fuit creatura, quæ velut liuore percita aduersus vnum hominem non exurgat, ac pugnet. Enimverò nostri malignorum syderum aspectus, influxus eorundem nostri, post quos obstant coinquinatus cometis aer, noxij terrarum halitus, elementorum transcurfus, pestilentiarum excursu, stirpium venena, fossilium miscellis infectæ aquæ, ferarum morsus, terræmotus, infelli venti, pluuiarum madores, sub syrio squalores, brumæ rigores, variæ denique Cæli permutationes, nedum in dies, sed interdum in horas: quarum omnium vi, & inuitabili insolentia languescat, & ægrotescat, discrimen subeat, & oppetat homo. Quod exitium, & quæ mala vbi humorum quaternio non inuenerit dissidentium assidue sub venis, præter hæc extra stagnantes alij velut in lerna palude multiplices, & horredas eruptiones, & monstra producant, quibus exosam perpetuo vitam miser transigat homo. Sed innumera, biles alias hominis calamitates quis memoraret satis? Vnam ex tot omnibus comme-

6 *De pestilente, ac praefocante*

morabo potissimam, quae dicta est nobis
 ἀρχὴν λοιμῶν, conflagrans pestilentes, ab alijs ve-
 rò nostris aut strangulatorius faucium affe-
 ctus, aut carbunculus pestilens, aut laqueus
 gutturis, à plerisque passio anginosa barbarè,
 & inscītè: quibusdam aut vlcus syriacum cū
 Αρετῶ, aut τὸ σίλλε pestilentes cū Aetio Ami-
 deno. Posset verò, siquidem insolentiam, &
 diritatem huius vitij spectes, nominari Dei
 vindicis ira, flagellum augefcentis immeri-
 to mortalitatis, sacra lues, diræ, supplicium,
 furiale venenum, Persephones gladius, cha-
 rontis vectura, limbus exlaturatus, & alijs
 eiusmodi notis notari. Enim verò ex huius
 vnus pestis vi plus myriadis præreptos de
 matrum gremijs, de parentum complexi-
 bus querimur, quam fuerint in bello Troia-
 no furore gladij iugulati. Porro Deus Opt.
 Max. antiquitus indignatus humanæ gentis
 criminibus, hanc aquarum illuuiionibus, &
 igni dederat perdendam; nostro verò ævo
 mercurius execrando teterrimæ huic pe-
 stilentiae laxas dedit habenas, ut non faci-
 norosos, & perditos, verum innocentissimos
 hominum, & malefaciendi nescios, & sce-
 ris puros pueros commutatis quasi vicibus,
 & inuersis imperscrutabili certè fato cun-
 ctos absumeret, & auerroncaret. Quod sanè
 malum, durior sit cautibus, sauior hyrcanis
 tygribus homo, qui ferio non lugeat, ac to-
 tis animi sensibus nō commiseretur. Theo-
 do-

dotus verò, qui commiseratus humanitati,
miseris tempestiuè succurrat, & opituletur.
Vtinam igitur liceat quandoq; nobis quam-
piam comminisci rationem, quæ futura sit
vſui; profectam videlicet ab eo fonte, vnde
& morbum modo dixi profectum. Porro vel
apud Ethnicos extat, bina Ioui pro pedibus
eſſe dolia, alterum boni condum, alterum
mali. Quoniam igitur ab Ioue arbitro rerû,
expectare maturam opem haud in noſtra
ſacultate reponere debemus: anne ſubſidium
ab ipſo deſides, & ignaui maneamus? Verû
huc nos monuit alicubi Maro.

Vixit vitium, creſcitq; tegendo

Dum medicas adhibere manus ad vulnera
paſtor

Abnegat, & meliora Deos ſedet omina
poſcens.

Quamobrem allaboremus, & vires no-
ſtras omnes intendamus: Nam facientes
adiuvat Deus, autore Varrone Latinorum
omnium doctiſſimo. Sic fortasſe futurum eſt,
vt noſtris humanitatis miſeræ promerendæ
ſtudijs aſſeſſe velit dignatum Numen. Age
igitur ad rem eominus accedamus: primum
autem de præſcripta nobis lege, ac compe-
tenti demonſtrationis modo dicamus.

Aggreſſurus ad diſputationem mihi pri-
mum ipſe præſcribo modum, nec non ratio-
nem philoſophandi conſtituo, qua fines me-
dicos non exorbitem inueſtigando, ſed intra

8 *De pestilente, ac præsocante*

quos laxitatem omnem inquirendi contineam; nè quando aliter agens, quam ex munere debeam, minimè spectantis ad rem officij deprehendar. Quippe ex vnaquaq; facultate, in qua est quaestio, non aliunde ducenda sunt argumenta, atq; adeo de rebus medicis medicè, deq; physicis, physicè disputandum est, quantum rei subiectæ natura petit, ut hæc indagetur, sumendo scilicet non probando. Quid autem ex alijs facultatibus, quæ genere non communicant, neq; principia habent syngenea, petantur argumenta? Porro magnus Hippocrat. in l. de principiis scripta reliquit hæc initio. Ego ad hunc usq; sermonem communibus sententijs vtor, tū aliorum, qui me præcesserunt, tum etiam meis. Necessè enim est cōmune principium sententijs supponere eum, qui velit hanc de arte medica tractationem componere. Verum de rebus sublimibus in aere, ac Cælo, neq; opus habeo dicere, &c.

Qui idem vir & libri de natura humana principio præfatus est: quicunque de natura humana amplius differentes audire consuevit, quam eius ad medicinam pertinet, huic commodum non est hunc meum sermonem audire. Tertio etiam in l. de veteri medicina monuit, oportere de arte tradere vulgo nota γινώσκῃ ἀλλ' ἢ τὸν αἰσῶν ἀπὸ τῶν αἰσῶν: quod & alibi solenne, ac frequens summi dictatoris præceptum ego spectans in hac mea de pestilē-

lente, ac strangulante pueros abscessu disputatione serua bo . Itaq; abstinendum iudico astronomicis, metaphysicis, diuinis, & hoc omni genere alieno. Quamquam obtrudes fortasse, quod idem Hippocrat. in l. de aere, aquis, & locis, disertis verbis dixit, sanè non minimam partem cōferre in re medica Cōsultam astronomiam. Verumtamen quid ipse senserit astronomiæ vocabulo, declarauit protinus, cum ait; quum vna cum temporibus, & ventriculi in hominibus commutentur. Nimirum astronomia est Hippocrati certa ratio mutandarum tempestatum à syderum ortu, & oecasu, & à commotis ventis, & aere inalterato nascens, non ab astrorum, vt dicunt, aspectibus, & configurationibus, quæ dānata fuit sēper, vt Seneca prodidit in apocolocyntiide. Hæc quidem causarum inuestigatione gaudeāt, vtanturq; quicunq; velint; nos medica tantummodo lance pendemus omnia, quæ incident in rem istam.

Aliud quoq; præscriptum sapientissimus idem, seu contemplandi, seu scribendi dictator imposuit libro de carnibus ante citato, dicens; se thesin aliquam ostensurum aliorum sententijs in hypothesin vti suetum: quem vulgarem ego morem, vt seruem, necesse est, nisi æctum agere debeam. Quare cum scriptores præstātissimi de hac eadem re pleraque comprehenderint, à cunctis
idem

iam recepta, & vulgata: hæc ut recipiam, supponens, & non inculcem, iure fiet, quæ sunt hæc. Primum historia mali cum circumstantiis omnibus accuratè descripta, quæ monstratum est ab anno 1618. erupisse insuetum inter nostras gentes affectum, qui homines, potissime pueros extincto, vel præcluso spiritu nonissimè interimeret. Deinde velim apud istos eosdem autores legi, quæ præcesserint constitutiones, siue austriæ, atq; humidæ, siue, ut alijs placuit, squalidæ, & siccæ propter cometas. Video autem plures, & prudentiores Autores in priorem accessisse sententiam, quam & ego sequor.

Tertio non infumam anxium laborem in declinanda sede affectus, aut vitio ipso, cum vniuersa descriptione interni, externiq; characteris, cumq; infinitis planè modis, & accidentibus eiusdem, quæ res, & nulli non comperta sunt, & ad stomachum vsq; exposita per omnes, quos dixi. Verum contentus ego sola diagraphæ veterum autorum, quæ communis ad vnguem est vitio, quod in præsentis visitur. Hypotyposis autem morbi nostra hæc esto.



*P A R S I I.**Deſcriptoria, & Simiotica.*

MOrbo huic *τὸ θῆλον*, quod Hippoc. primus adſtruxit, nos diuinum dicere, conſueuimus, eſſe nemo dubitauit ad hanc diem, ſiue quod Dei prouiſoris vindi-
cijs immiſſus, vt initio præfati fuimus, ſiue quod aere communicetur, ſiue quod occultæ ſit naturæ: quæ tres effatus diuini ſunt interpretationes medicorum communes. Nimirum hunc An. Chriſti ſupra MD&XLIX. in noſtram gētem ingreſſum anteceſſit boū annua lues; quo mirum in modum ſtrangu-
lati concidebant. Cum enim primum homines inceſſit iniqua lues, demirati ſatis non ſunt tam medici, quam naturæ interpretes omnes immanem tum afficiendi, tum confi-
ciendi modum. Extant de hac re propria, & peculiaria Aretæi Cappadociſ monumen-
ta, quæ, quoniam breuia, compendioſa, lucu-
lenta, accomodata, rata & grauitatem, & maiestatem Hippocr. referunt omnia, præ-
ſtiterit ſemel integra, quam concifa ſæpius, ac diſiecta produci: tum vt antiquæ morbi Idea, quantum hodierna coeat, perſpici poſ-
ſit, tum vt ſuo quaſi prototypo, & exemplari norma ad exercitationem hanc omnem pa-
ratò nobis liceat vti. Interim. autem audie-
ris

ris summum virum quasi vices nostras loquentem c.9.l.1. de causis, & signis morborum, in hunc modum versione Iunij Pauli Crassi. Ulcera tonsillis fiunt aliqua mitia, familiaria, non ludentia: aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia quidem sunt munda, exigua, non aliò descendencia, non inflammata, dolorem non excitantia. Pestifera sunt lata, caua, pingua, quodam concreto humore albo, aut limbo, aut nigro sordentia. Id genus ulcera Aphthæ nuncupantur. Quod si concreta illa sordes altius descenderit, affectus ille Eschara est, atq; ita græcè vocatur, latinè crustra. Crustam verò circumueniunt rubor excellens, & inflammatio, & venarum dolor, quemadmodum in carbunculo, & exiguae, raræq; pustulæ, quas Græci Exanthemata vocant, orientes, hisq; aliæ superuenientes in vnâ coalescunt, atq; inde latum vlcus efficitur. Id si interius in os depascendo serpit, ad columellam vsq; peruenit, ipsamq; exedit, & linguam etiam occupat, & gingiuas, & frenas, id est, dentium alueolos, dentesque inde labefaciuntur, & denigrescunt. In collum etiam phlegmonè erumpit, atq; isti haud ita multis diebus post phlegmonè febribus, sætore, inediaq; consumpti intereunt. At si in pectus per arteriam id malum inuadat, illo eodem die strangulat. Pulmo enim, & cor neq; talem odoris foeditatem, neq; ulcera, neq; saniores humores su-

ſuſtinent: ſed tuſſis, ſpirandique difficultas enaſcitur. Cauſa maleficii tonſillarum eſt frigidorum, aſperorum, calidorum, acidorum, adſtringentiumq; deuoratio: quandoquidem hæ partes pectori ad vocem, ſpiritumq; edendum inferuiunt, & ventri ad alimentum tranſmiſſionem, & gulæ ad eiſdem deuorationem obſequio ſunt. Internis verò partibus ſi quod contingat incommodum, ventri videlicet, gulæ, & pectori, ad Iſthmum, & tonſillas, & loca ibi poſita mali conſenſus, & eructationes perueniunt. Quapropter pueri uſq; ad pubertatem maximè hoc morbo têtantur: præcipuè namq; pueri multum frigidum aerem inſpirant. Quoniam in his plurimum caloris ineſt, & ad cibos intemperantes ſunt, & varia concupiſcunt, & frigidam potant, & excandefcentes, ac ludentes altius vociferantur. Puellis quoque uſq; ad menſtrux purgationis tempora hæc vitia uſitata ſunt. Regio Ægypti horum affectuum planè fœcunda eſt: aer enim ſpirando ſiccus adducitur, varios præterea cibos ſuggerit. Radices enim, herbæ, atq; olera ibi largè proueniunt, & acria ſemina, & potio craſſa, utpotè Nili aqua. Sibi verò Ægyptij ex hordeo, & ex floribus ſcilicet vinaceis potiones acres conficiunt. Syria quoq; maximè illa, quæ Cœle, i. e. caua nominatur, Symodi morbos procreat. unde Ægyptia, & Syriaca vlcera id genus appellant. *Modus verò mortis*
quam

14 *De pestilente, ac præsocante*

quam miserrimus accidit, dolor quidem acer, & calidus, qualis in carbunculo, spiritus viciatus: exhalant enim maxima putredinis odorem, eundemq; vehementer in pectus spirando adducunt. Immundi adeò sunt, ut neq; suum ipsorum odorem ferre queant. Pallida his scilicet livida facies, febres acutæ, sitis, ut igne accensi videantur. Potum veriti, dolores non admittunt: tristantur enim, cum tonsillæ comprimuntur, aut potius innarcs resiliunt. Cumq; decumbunt, surgunt, ut sedeant, decubitus non ferentes, quod si sedent, quiete carentes, iterum decumbere coguntur. Plerumq; autem recti stantes obambulant, nam quiescere nequeunt, solitudinem fugiunt, dolorem tollere dolore tentantes. Inspiratio magna est, frigidum enim aerem ad refrigerationem desiderant: exspiratio verò parva. Nam veluti igne exusta vlcera cum sint, à calido præterea spiritu incenduntur, raucitas adest, vox nihil significat. Atq; hæc in peius ruunt, cum subito in terram collapsis anima deficit. Hæc Aretæus: quæ nos quidem, quantum tractatuli brevis angustia permittit, enarrare primi experiemur. Exorditur Autor κατά τήν διακριτικὴν τῆς ἐν μέθοδον à discriminibus tonsillarum, summa. s. & prima tractandi omnium hypothese; sine qua luce, aut duce neutiquam bene processisset ὁ Ἀρέτειος quasi αἱ ἀληθοὺς ἀνὰ. Aliqua aliena pestifera necantia alterum membrum. Fini-

ta a. ſi rectè dicta percipimus, vtraq; non lædētis læthaliter vno, & necantis altero termino. Mitia igitur non lædens genus ritè ſequitur, vt qui minimè crudum, ſed coctionis particeps eſt, à fructibus, & pomis ducta ſimilitudine, & vocabulo. Propriè enim, quod coctum, & dulce eſt guſtabili cuiquam, id mite eſt pomis, ſi quando dictum eſt Poetæ, *Sunt nobis mitia poma.*

Viſe autem, quæ de miti vocabulo diſſeruit Ludouicus Duretus in Coacis.

Iam verò mitium claſſem, & comitatum infra accenſebit Author. Interim, amice, aduertis, hic tractari, proponiue tonſillas eateus, quatenus vlcerofæ, vel vlcera ſunt, haud verò, vti tubercula. quippè poſt vnā inflammationem in hac non conſiſtentes pergere conſueuerunt in vltiorem abſceſſum: quinimmo, vt in c. 9. lib. 1. de morb. acut. curatione ait; Illiciones acrium medicamentorum faciendæ ſunt, neq; enim vlcera quieſcunt, neq; cruſtæ in ſuperficie ſunt: q. d. ſed intimis glandulis familiaria. Sunt quippè tonſillæ pleriq; inquilina, & conſuetudinaria, vt puellæ cuidam è Caracciolis, & Marchioni Mirabellæ, quod ſic ſcilicet propria, & priuata capicis, & cerebri craſi, & confirmatione. Quemadmodum enim externo collo luunt ſtrumas, qui compreſſis vtrinq; réporibus, latiſq. genis, & maxillis ſunt homines Alberto magno autore, ita & interno

guta.

gutturē sub malē constructo capite debent
 incurrere tonsillas: alij fortassis autem quod
 familiare est Aræteo, illud est, quod spectauit
 Aetius dicens; aliquando fieri tonsillas
 consuetis inflammationibus, familiaribus
 autem tōsillis ἀντιστήματα respondentia sunt,
 quæ mox subdidit Author aliena.

(*Pestifera necantia*) Latinibus homini-
 bus eadem ferè sunt hæc utraq; laxius scili-
 cet usurpatio pestiferi nomine. Verum non
 ita quidem apud physicos, & medicos, qui
 pestiferi vocem volunt pressius esse, id quod
 est à peste: hæc verò quoniam non perpetuo
 necat cunctos, perpetuo, verum hanc pleriq;
 seu natura, seu arte præterfugiunt: idèò sub-
 ditum aliud, (*necantia*) Noto autem grada-
 tim hæc proposita, aut potius disposita: quā-
 doquidem ab alieno gradu ad pestem itur,
 ab hac verò ad interitum. Pergit autē κατὰ
 τὴν ἰατρικὴν σαφηνίαν noster author. exponitq; mi-
 tium ordinem, quæ sunt (*Munda*) id est, pau-
 ca, & exsortia fordīs, de qua non longinque
 dicturus est. Attinet autem hoc ad habitum,
 & qualitatem. Ceterū quod ad τὴν ποσότητα τῶν
 σπορίων attinet, adscribit & exigua: porrò exi-
 litas si quo in vitio laudabilis est, in tonsillis,
 & locis alioquin isthmi μικροκοσμοῦς lauda-
 bilis est cum maximè; præterquam quod
 exilitas tumoris vna præsert vitij mendi-
 citatem sua natura. quamquam haud igno-
 ro sæpissimè fieri, ut sub pusillulo tuberculo,
 & vitij cicerculo latitauerit, & conclusa fue-
 rit

rit vis veneni magna: quam equidem ad corporis miculam ferociæ dissonantiam ostendi luculenter in perdolentibus impressuris recondi. l. 4. de recôd. abscess. nat. Rectè hoc, inquam, fieri. Verum exilitatem probari per Aretæum, quæ accedat ad puritatem etiam, & ad τῆς δυνάμεως καὶ τῆς ἐμπειρίας. ubi videlicet ulcera non sunt altè descendunt, adde, neq; inflàmatione, neq; dolore septa, quibus vtrisque affectibus expertia: non sunt tubercula, quæ ambitu minimo ingentem complectuntur malitiam, & quibus vtrisque affectibus tonsillæ, vel quæ mites fuerant, efferantur.

Pestifera post hæc describit à latitudine, atq; altitudine, excavata quasi dicat per omnes spatij dimensus extensa putredinis infrenis depastu, quæ nomen dicitur græcè, ab Authore nostro paulo posterius exponenda, eo quidem futura deterior, quo se in exanguis, & spermaticas particulas, id est, in nervos solidos, & in membranas, nè dicam in ossa descenderit.

(*Pinguia*) non natura me hercules, sed putredine, quæ in ossa de fixa hæc etiam pinguia reddit, authore Cornelio l. 8. cap. 3. Est autem pinguitudo ista resoluta substantia per vim caloris extranei. Postquam enim calidum τῆς πυρρός elisit, atque exterminavit; vinculo, quod partes exhausti corporis colligabat, abacto: secedunt ea-

dem, & nullo præsidio forte secedunt in-
limosam quandam substantiam, quæ pin-
guedinem refert: & refert quidem potissimè
pinguedinè colore subpallido, vel inter pal-
lorem, & alborem medio: sic notat hanc
Author.

(*Concreto quodam humore albo*) Quam-
quam, & albo colore, qui minus inuisus est,
prætergresso, in liuidum primum, mox in ni-
grum abit hæc sordes, quam modo depinx-
i pessima scilicet vlcis sorte, quemadmo-
dum Hipp. l. 2. prorrh. nota 17. nos docuit.

(*Id genus ulcera aphthæ nuncupantur.*)
Elicit ex dictis aphthæ naturam, quasi defi-
nierit aphtham vlcus latum, cauum, pingue,
ex concremento quodam humoris albi, aut
liuido, aut nigro sordescens. Cui definitioni
refragari videtur author definitionum me-
dicarum, cui aphthæ est ἰλκωσις ἀπὸ πολλῶν ἐν
τόματι: ἡ γὰρ μὲν ἀπὸ πολλῶν ἐστὶ αὐτὴ ἡ ἰλκωσις μάλιστα
παίδησι. Quæ latinè sunt: Aphthæ est exul-
ceratio superficialis in ore puerorum. Ac-
cidit autem hæc secundum superficiem vl-
ceratio maximè pueris. Refragantur, inquā
eis, quod dixit (*caua*) hæc, quæ grecè sunt
ἰπιαὶ λαῖες ἢ ἐπιπολάζουσι. Veruntamen ut hunc no-
dum dissolvas, meminisse te oportet, quod
sermo est Aretæo de aphthæ pestilentibus,
& malignis: alteri verò definitori obuersatæ
sunt animo aphthæ leuissimæ, & nulla cum
putrescentia, vel proserpentina coniunctæ.

Ad.

Aduertis autē, quod Aretæo genus aphtharum vlcus fuit; definitori verò secundo exulceratio: distant autem interuallo nō modico τὸ ἕλκος καὶ ἡ ἀφθὴ. Nempe exulceratio minimè perfectum vlcus arguit, neq; numeris omnibus absolutum. quamquam contra est Actius, qui l. 8. c. 39. dicens; porro si in putredinem aphtha vertatur, non conuenit amplius aphtham eam affectionem appellari: Verum huic ego inquam, ecquis nominum imponendorum inhibeat, præscribatq; rationem? præsertim cum anxiam nominum curam sapienti viro abnuat Galenus quam sapissimè).

(*Quod si concreta illa sordes altius descenderit, affectus ille eschara est, &c. usq; ad exanth. verbum.*) Quoniam quidem hanc crustam carbunculo comparat Aretæus, delineatam hanc accipe ex vno Cornelio, qui l. 5. rei medicæ cap. XXVIII. quod est de carbunculo scripsit hæc. Circa quam quasi crusta est, eaq; inflammatione cingitur, neq; in eo loco leuari cutis potest, sed inferiori carni quasi affixa est. Idq; vitium subteractis quasi quibusdam radicibus serpit: interdum celerius, interdum tardius supra quoq; procedens in albescit, dein liuidum fit, circumque exigux pustulæ oriuntur; etsi circa stomachum, faucesue incidit, subito spiritum, sæpè elidit. Hæc quidem Celsus: quorum enarrationem si cupis, hanc in nostro super

hunc authorem commentario habebis.

(*Orientes hisq; alia superuinentes in unum coalescunt, atq; indò latum vlcus efficitur.*) Calore ad putredinem primū agente concurrentes pustulæ complures in vnum dissoluuntur, deinde nomin. id est depaſtum moliente latum vlcus redditur.

(*Id si interius in os depaſcenda ſerpit ad coluthellam, &c.* Nomæ ferinę vi uimicum, quam & h. l. de curandis acutis morbis c. IX. R. describit etiam per hæc quibufdam & columella vſq; ad palati os exefa eſt. quin etiã conſillæ ad baſin vſq; et epiglottida, ac propter cicatricem deuorare, neq; ſolidum, quicquam, neq; liquidum poterant, ſed & iplum, quod bibebat, interdum repercuſum hominem fame necauit.)

(*At ſi in peſtus per arteriam id malum euadat, illo eodem die ſtrangulat.*) Pulmo enim, & cor neq; talem odoris ſœditatem, neq; vlcera, neq; ſanioſos humores, ſuſtinēt. Hac ab Aræto reddita cauſa mortifera deſtillationis. Cui tamen aduerſantur experimenta; quod pulmo quidem vomiceas, & tubercula diuturna, & vſq; etiam vlcera, ſuſtineat perſtante vita hominis ad decades annorum etiam vna plures. Cor verò, vt oſtendimus hoc eodem opere, vitia pleraq; hoc eſt, tubercula, ſclitromata, vlcera, concremēta multigena, & horrenda patitur. quanquā autem eius facti multiplicis plenam, & ſatiſfa.

facientem ibidem expoſuerimus rationem: nihilominus placet magis *ua* ratio, quam idemmet protulit author in l. i. de curatione acutorum, cap. 9. per hæc; Verum ſi ab his tonſillarum vlceribus, puta, ſanies ad interiora deſiſſet, celeriter partes etiam, ſi integre ſint, exulcerantur, celerrimèq; vlcera interius depaſcendo ſerpunt, atq; hominem perdunt.

(*Cauſa maleficii tonſillarum eſt frigidorum, aſperorum, calidorum, acidorum, adſtringentiumq; deuoratio.*); Aretæus quidem cauſam maleficii demonſtrare volens, prauam viſus rationem compluribus adſtuit argumentis. Cuius vniuerſæ argumentationis capita, & propoſitiones cum non ſint declaratæ ſatis, neq; explicatæ, præſertim ſecundum noſtram inſcientiæ exigentiam, pace grauiffimi viri, difficile ſit attendentibus, aut deprehendere primum ſententiam ipſius, aut vim rationum, atq; vniuerſam demonſtrationem comprehendere. Itaq; ne tanti viri ſcriptis uſi fuerimus gratis: eius uſuram dare conabimur cum fructu ſic, ut aliquando operæpretium feciſſe videamur. Igitur, ut intelligatur Aretæi diſſertatio, proponendum eſt ante nobis eius propoſitum, primum, & vniuerſus progreſſus gradatim animo percurrendus. Primum peſtilentium tonſillarum virioſus viſus eſt cauſa demonſtranda. ſtaturis pariſthmia, faucetq; com-

De pestilente, ac præsocante

plexim sumtas pro alibilib. simul, & spiritua-
libus vijs ianuam esse, tū plerisq; subeuntibus
in corpus tum egredientibus substācijs, quæ
nihil quidem exasperando; nil pariter etiam
lædunt transitu partes; cum verò exasperāt,
& labefactant, in promptu concitatu-
n-
tonsilæ senserint malum. Atq; pleraq; sunt,
quæ exasperant, tum quidem per se particu-
lam, tum internis partibus incommodando;
quæ cum postmodum incommoda refundūt
in eandem partem vicissitudine quanda n-
facta. Exasperant, inquam, alimenta præter-
euntia, dum subeunt in ventriculum, frigida
nimirum, aspera, acria, quæ vocat calida,
acida, adstringentiaq; Quo facit illud Ar-
chigenis ap. Aetium hoc sermone, c. 47. oc-
cultæ anginæ causam esse in quibusdam ner-
uos, qui ad stomachum feruntur, dum malè
afficiuntur, & post inferioribus membris,
pulmoni, inquam, & cordi respirandi prin-
cipium inflammant, arterijs verò, quæ caro-
tidas appellant, itemq; alijs adiacentibus
indè inflammationem transmittant. Cum
hoc autem in omnibus ætatibus promiscue
fiat, potissimum in pueris fit sæpissimè, qui-
bus inspirandi frigidissimi aeris vsus multus
est, ut qui calore multo exæstuent. Deindè
sua ipsorum viuendi intemperantia, & cibo-
rum varietate labefactantur, & corrumpun-
tur succi, qui accessu suo partes pariter labe-
factant, atq; corrumpunt. Tertiò, quia frigi-
dam

dam potant, quartò, excandefcentes, & lu-
dentes altius vociferantur.

Dixit hoc genus vitio pueros, & puellas
impuberes obnoxios, mox dicit, & Regionē
Ægyptium, & Syriam valloſam eidem malo
compáratam eſſe propterea, quod incolis
aer ſpirando ſiccus adducitur: Deinde va-
rietate ciborum, olerum multorum, item
variorum ſeminum, id eſt, leguminum, qui-
bus & Alexandrinis prauos gigni ſuccos ob-
ſeruauerat Galenus. Item aquæ Niloticæ po-
tione craſſa, nec non ex hordeo, & vinaceis
conſectis potionibus acribus bilioſus crea-
tur ſanguis, qui ad tonſillas nempe laxas, &
imbecilles delatus has inficit, & conterit fa-
cilè. His ſic per nos diſpoſitis, & enuclearis,
vides iam lector, tonſillarum peſtilentium
binas in vniuerſam cauſas, ſiue pueris, ſiue
certæ genti perpetuas eſſe, aut exaſperatis,
inquam, aut alimenti vitio variè corruptis
partibus. Itaq; cauſa primum redditur vni-
uerſalis, mox puerilis ætatis, & regionum
peculiaris.

(*Modus verò mortis quam miſerrimus ac-
cidit.*) Suspendio nimirum ſimilis, & quod
non aliter, quam laqueus præſocans interfi-
ciat: nam Græci anchones ſuspendia voca-
uerunt; quæ ſermè verba ſunt Aureliani lib. 3.
acur. cap. 1, quod eſt de cynanche: exoſa, in-
quam, moriendi ſors, adeò hoc moriendi
pauore conſternati fuerunt magnanimi He-

roes ap. Homerum Laodamus, apud Virgilium Æneas, de quo cecinit Poeta:

*Extemplo Ænea soluitur frigore membra:
Ingemit & duplices tendens ad sydera
palmas.*

*Talia voce refert: ò terq; quaterq; beati,
Quis ante ora patrum Troia sub mœni-
bus altis*

Contigit oppetere.

(*Dolor quidem acer, & calidus*) incensius Auicennæ more l. i. doct. i. sum. i. c. i. rectius autem incendiōsus, latè, vndiq; exspirante igneo feruore, qui inseparabilis est aphthis, quas exulcerationes habentes in se quiddam igneæ caliditatis dixit Aetius VIII. c. 39.

(*Spiritus vitiat*) Dixissem equidem, potius halitus, alaine Gallicè. Exhalât enim maximè putredinis odorem; id quod fit quidem certè pestifera corruptione; verum is fœtor vberrimè nanciscitur causam ex conditione partium affectarum, quæ sunt adenes, carnes puta humidissimæ, & flauissimæ; in anguloso præterea loco conclusæ, quæ inter omnes minimè possunt respirare.

(*Eundemq; vehementer in pectus spirando adducunt*) vt gaudet porro spiritalis, vitalisq; præcordiorû natura puro, limpidoque aeris attractu: sic contra tetra, & coinquinata tristatur. Iam audi diligentiam, & emphasin Arætiæ; namq; addidit qd aû cogi

naturam, ut abunde attractum aerem fœdū cogatur attrahere; attrahit autem abunde in tanto æstu, in quanto sunt anginosi, præcipuè pueri, naturā calidissimi, ut præmonuerat dudum.

(*Immundi a. f.*) Exaggerat immunditiē, quæ est tanta, ut neq; ipsi suarummet carniū fœtorem ferre possint, q. d. quanto igitur gravius ferant appropinquantes.

(*Pallida f. livida facies*) vitio præcordijs incumbente, à pulmone præsertim, qui de proxima vicinia, qualis ipse est, tales, & genis refundit colores.

(*Febres acuta, sitis, ut igne accensi videantur*) facta compressione, & putredine, inita partium respirationi dicatarum, & sæpe etiam præcordiorum ipsorum. Id equidē per initia fieri vidi, rarior autem causos febres nostro tempore: quin, ut verè dicam, videntur repentiniores, atq; ut capite septimo vocat hic idem Author, ignaue, molles, nihil proficientes.

(*Potum*) & hic emphasis etiam est, quippe quod maximè auent per sitim, idem per alia incommoda refugiunt, & exhorrent: adeò præponderant hæc incommoda frigidi, humidique appetentiæ. Sunt autem incōmoda duo gravissima, & potu rōsillas comprimente, & eodem per nares à faucibus refluyente.

(*Cumq; decumbunt.*) Pergit Emphasis, quod,

quod, quem maximè appetant, & consultum sibi credunt componendi corporis modum, hunc experti continuo renuunt, atque uno, eodemque tempore decubitus cum sessu commutato, mox sessum cum decubitu commutant, & rursus neutrum experti commodum rectè deambulant domo, quietem odientes, quæ ambulatio offensa iniquis est continuo. Adeo nullus corporis continendi commodus usus est.

(*Solitudinem fugiunt.*) Consuetudines hominum consequuntur, in qua cum doloris pars sit, se solos cernere grauat, nihilominus hoc dolore priorem dolorem repellere tentant, sed sine fructu.

(*Inspiratio.*) Magna est frigidi aeris usu, & inopia, sed nihilominus amplè inspirati non tanta identidem est respiratio, quæ d. (*ἐμπνεῖσις* *ὑσπνῆσις* est) ingressus, & egressus ratio par, monstrante Gal. in l. de respir. at ne respondet tamen regressus ingressui propterea, quod plus attrahunt refrigerandi æstus studio, quam reddere possint, non reddunt autem mali cuiusdam fuga, & concepta omnino cautela, nè retorrída vlcera retorreant insuper efflatu feruido.

(*Raucitas*) est alluvione humoris.

(*Vox*) nihil significat, corruptis, & peruersis eloquij particulis effectricibus, plerisque, quæ sunt gargarion, &c.

(*Atque hæc in peius ruunt.*) Sic cum sta-

tus

tus languentis semper in peius ruat, neque nocentis luis ullus modus sit pessandatis, & prostratis virtutibus repente spiritus deficit miseros.

Cappadoci successit scriptor Amidenus, cuius & è re nostra fuerit pleraq; ordine imitata huc transferri. Crustola, & pestilentia tonsillarum ulcera, ut plurimum nullo præcedente tonsillarum fluxu incipiunt: aliquando à consuetis fieri inflammationibus maximè efferatis perficiuntur. Fiunt autem frequentissimè pueris, atq; etiam ætate iam perfectis, maximè his, qui viciosis humoribus abundant, in his, quæ verè contingere solent, pestilentibus constitutionibus. In pueris verò, oris ulcere, quod aphtham vocant, præcedente omninò perficiuntur. Sunt autem partim alba, maculis similia, partim cinereo colore, aut similia crustis, quæ ferro inuruntur. Accidit autem ægris siccitas intransglutiendo, & suffocatio coaceruatim incidit, maximè quum rubor subeat mentum, aut ubi hæc acrimonia præterierit. Nomen, quæ depascitur locus, excipit, succeditq; una putrefactio. Cui græcanicæ morbi figuræ dispar haud est Italica nostra, nisi quod paulo auctior per Symptomata capitis, quæ minimè recensita veteribus hisce scriptoribus visuntur, non infrequenter in nostris hominibus malè affectis: præsertim viris, & fœminis natu iam gradibus. Equidem inter ceteros

teros notaui duos, qui non sine comate, stupore, caribaria, atq; alijs hoc genus occubere. Neq; enim Szua proserpina pepercit capiti Medici, credo, quadragenario maioris, cui nomen Philippo Luciano, cuius & medicorum suorum, vt complurium aliorum inertiam non possum non accusare. Altera fuit Laurentij Pharmacopæi coniux, quæ delira per morbum sæpè apparuit, morbo commortua. Excretionēs ē naribus consuetę, putridę, puitosa, ichorodis, aliquando cruori commista, aliquando dumtaxat cruentę merrę: Qua de re audi nobiles historias. Puella nubilis in parthenophylacio Spiritus sancti eodem affectu dirē gravata cum exitum ē strangulatu expectaret, ex subita hęmorrhagia profusione praesentaneam opem sensit, postremo verò ex malo ori venefico servata, incertum qua noua morbi vi fuit inopinē sublata. Verum ea fortas ē causa, quam ab Actio traditam paulo posterius exponemus. Interim scire licet, vnum ē tribus pueris, qui pessimē habuit inter cęteros, & nervorum languore relictum cruribus apprimē imbecillum, atq; oculo strabum transuortatu verò sic impeditum etiā a diu præterito affectu, vt vix emollitum humore panem demittere valeret: quamquam duriusculas panis offas, & solidas ir olles fabas ingereret commodiusculē. Quorum deorum paradoxorum symptomatum, problematumq; ratio.

tionem grauissimè declarauit Andreas Cæsalpinus in l. 2. cōtrouerf. med. c. 13. quē referentem, quia mihi nunc referre non vacat, adi. Qua eadem sanguinis per nares excretionē facta puero decenni Ioan. Laurentij Bozauotræ filio, salus perfectè reddita est: quamquā hic iugularis venę sectione fuerat egregiè leuatus: obseruante hæc Mutio Cæpalbo Medico, qui ad Galenicam medicinā Hermericam peritiā bellè addidit. Indicāt hæc porro non obscurè superiore consillis loco sedem affectam, quæ cerebrum est. Cui nostræ suasioni fauet anatome, complurium corporum vi morbi enectorū, in quorum capitibus exectis reperi geumi sanguinis lato schemate diffusi sub maximos siqus membranz crassioris. Accedit & quod in duobus filiis Iacobi equitatoris extra portam regalem pueris prouectioribus, & in Dionysio Saperino quinquenni puero diræ lues nares utraq; compleuerit putridis, & præaltis aphthis, quæ viri putidissimo manabant. Quid? quod cum putrilaginem reddere visa sunt nares, vt cerebri substantiam retulerint, testante Ioan. Baptista Ferrario, Medico nostrate ingenij singularis. Sed & illud silentio non inuoluendum, quod et si consillas pestilentes, & vlcus Syriacum hocce vitij vocitemus; nihilominus obseruatum est sepe supra strangulatum, & puris iam viceribus sublato pueros morbo, qui liberi fue-

30. *De pestilente, ac praeſocante*
fuerant reputati. Quin immò poſt xxx. dies,
& xl. iam prærepti morbi furoribus præter
omnium opinionem ex improviſo ſunt ex-
tincti. Adeò ſcilicet latitans, & recondita
veneni vis eſt.

Sed cum his etiam morem morbi vene-
mus præcipuum. eſt enim & aliud diſcrimen
nobis obſervatum a pertis formis, quarum
altera eſt acuta, & fermè furioſa: altera pro-
pè ſedata, & lenta, quas utraſq; fortàſſe de-
terminat réperatura corporis, humor præ-
valens, habitus, ſenſus, mos; & hæc quidem
in eadem vrbe, oppido, pago; Cæterum in
longinquis, & diſſitis locis biſſos hos duos
mórbi mores definiverunt quoq; conſtitu-
tio, & tempus anni, aer, aqua, loci viſus, &
cæteræ quædam occaſiones, aut cauſæ. Acu-
tus quidem morbi mos, & ſeruentioribus
ſymptomatis, & febre ipſa ſepes eſt acriori:
côtra verò lentus, & ſerotinus mos ſedatio-
ribus eſt motionibus, & tranſcurſibus ad té-
pora. Reliquū verò, quāvis concitator in-
flammatione, & acrimonia non ſit; nihilo-
minus neq; ſua deficit nocendi vis, & virulen-
tia, ſi quis ſit, qui ſagaciter, & oculatè di-
judicare vitium per leves ſuas conuerſiones,
& immutationes norit. Porro dolor altius
nūtrit, & tacitam improvidæ naturæ perni-
ciem ſtruit. Ità ſit plerumq; ut puris appa-
rentibus locis vlcerum, & crūſtarum opinio-
nem boni faciens, tamen exugit viiſificum.

genio nectar, & ceu falsus Dux vitam in-
præceps deducit: quem in multis ludifica-
tum superiori nos sermone retulimus. Quã-
quam, & in hoc sæpè transcurso innocens, &
infraudulentus est idem morbus, quam sin-
ceritatem etiãnum agnoscere, ac depre-
hendere debet is, q dextrè curat ne suspicio-
ne malorũ adductus medêdo pleraq; faciat,
quæ fuerant minimè faciendâ, tum quidem
aduersus creditam vitij vim pugnans chi-
rurgia, & medicamentis grauissimis, tum
ne naturâ in cõpetenti vi&u foueat, & laxet,
vbi nõ licet. Verũ hæc ad medêdi providen-
tiam, & ad cautiones pertinent, de quibus
suo loco. His adde per nostros omnes Scri-
ptores obseruatum, noctu magis quam in-
terdiu grauari decumbentes: & horum ple-
rosque rectâ ceruice respiratum carpere,
cum patõre, vò Scribonius loquitur, maiore
narium, & diductione. Præterâ collum, &
glandulas, & per se totum extumescere, quin
& ad superiorem thoracem excurrere latũ
œdema. Quæ autem in Sporade angina in-
diciũ erat boni extumescencia: hoc pesti-
lennis argumentum est certissimum, saniem,
& cruore confusas pustulas nigras hoc illo
loco paruas, Ectymata, & pustulas pulicum
morsus referentes, tumbricos, vomitus, fe-
brem: postq; omnia seruatus homo restat lâ-
guidus, stupens, & in multum tempus im-
becillis.

PAR-

PARTICULA III.

Disquisitionis causarum .s. etiologica.

IAM verò maiore labore dirè depopulantis affectus naturam, ac τὸ γὰρ ἢ peruestigemus, de qua re nostri omnes certant, & adhuc sub Iudice lis est. Constitutum est apud vniuersos ab aucto philosophos, vbi rei cuiuspiam est abdita natura, hanc à suo proprio, & inseparabiliter assidente conditione venandam, & cognoscendam esse: Hanc vnā, & singularem in obscuris inuestigandam, viam esse. Atq; si propositi mali, vel verè proprias, vel proprii locum obtinentes conditiones acriminis indagine perscrutemur, facileprehendemus, & contagiosum, & pestilentem affectum hunc esse. Quod autè ad contagium attinet, hoc tum communi omnium consensu, atq; experimento euincitur, tum etiam comprobatur ratione triplici, à priori nimirum, & à posteriori. Ratio quidem à priori paulo posterior exponetur. interim contenti sumus à posteriori illa, quae docetur, insigni, & tetra putredine septos morbos omnes contagiosos esse. De quorum numero sunt exponendae conditiones: quae doctis omnibus & Hieronymo Fracastorio recensentibus numero sunt tres. Prima est, quod contagium nititur, & sese promouet.

mouet seminarijs, quæ calida sunt, & humidæ particulæ, putres, diuaporantes à subiecto corpore. neque autem inconsulto binæ istæ ad infectionem qualitates coniugatæ ponuntur. Humidum enim partes eius corporis, in quo est, emollit, & laxat, ad facilem harum separationem quasi præparando: calidum verò sursum attollendo separat easdem: quas ob res craseos totius, seu mistionis resolutio sequitur, calido innato, innatoque humido effluentibus: Sic certa iam est seminariorum, duarumq; qualitatum in his coeuntium necessitas.

Præter qualitates autem has primas sunt & aliæ, tum secundæ, tum tertiæ seminarijs. Porro compactam admodum mistionem habent, cum qua lentor quidam glutinosus coniunctus est, & cum lentore tenuis, acrisq; vis putredinis vnius ministerio profecta. Quæ quidem acrimonia, ac tenuitate substantiæ fit, ut isthæc seminaria facile penetrare, propagariq; possint in aliena corpora. Penetrationis autem modi sunt tres. Vnius per vim analogiæ, secundus per attractionem aeris, siue inspirationem. Tertius per arteriarum, & venarum dilatationem, quem dicunt transpiratum.

Secunda seminariorum proprietas est, quod in constituta, certa que subiecta nutum quendam, & propensionem habent, quæ dicta Græcis analogia est. Hæc autem est mul-

tiplez, & secundum superiora genera; medialisque species, & secundum infimas etiam. nimirum nunc ad arbores, & ad fata, nunc ad certas animantium species, & ad hominem spectat. & ex humana specie partim ad leues, partim ad ætates, partim ad certos humores, & ad certa membra occupanda naturaliter comparata est.

Tertia seminariorum proprietas est, quod sordidam, conclusamque putredinem habent. Sordidam intellige, in qua non superficialis, sed profunda, & secundum totum fit putrefactio, euaporatioque corporis putrescentis. Conclusam autem dico, non abeuntibus à corpore, quæ euaporant, sed sese agitantibus, & feruescentibus intus. Cuius quidem rei causa est lentor, & tenacitas materię putrescentis, qui lentor adhaesum firmo non finit quidpiam extra mitti.

Hætenus de contagij complexu, & proprijs conditionibus: nunc ad pestilentem morbi conditionem breuibus enarrandam accedo. Atque hæc etiam plana est per definitionem à probatissimis Authoribus traditam, & sub tribus, ut vocant, additamentis comprehensam; quarum prima est epidemij mentio, secunda putrescentis aeris ambientis, tertia functi exitus à malignitate. Hæc inquam omnia subsunt in proposito malo: quare iam pestilens idem sit, oportet.

Quibus iam constantibus accedo propius

pius ad rei caput, & primum ad morbi procreationem. & quoniam, inquam, monstratum est, luem per analogiam ad ætatem, ad certas partes, certosq; humores spiritu attractos insinuari: dico labis istius analogiam spectare ad puerorum naturam, ad sanguinẽ crudum, & ad cerebri domicilia. Hæc singula accommodata, & propria illi silenti malo nostro esse videntur.

Analogia quidem ad puerorum naturam longa observatione certa est; ratio verò incerta. An enim fortasse fit, vt sic comparati pueri sint propter exceedens calidum, & humidum: temperaturam nimirum ad putredinem, & ad pellem concipiendam, vt Mercurialis notauit, quam maximè accommodatam. An verò huic affectioni sunt obnoxij pueri propter naturalem impotentiam obfistendi causis istis morbificis, præditi scilicet imbecillo, tenero, laxo, spongioso corpore, & multo maximè cerebro. An fit inordinati vitæ, & vitæ causa: qua subindè sanguis redundat crudus, atq; adeò coinquinatus hic, & impurus fit paratior ad putredinem, & exindè ad luem recipiendam. Quo loco dicam tempestiuè de analogia, quam lues hæc habet ad eundem, crudum, coinquinatumq; sanguinem. Analogia, inquam, non aloga, id est, irrationalis, sed certè consentanea: quandoquidem in habentia symbolum facilis est transitus. Atqui habent hæc

symbolum, semina scilicet calida, & humida in sanguinem item calidum, & humidum, & impura in impurum.

Restat exponenda analogia peculiarem sibi vendicans partem, necessaria quadam lege præscriptam, ut disertissime demonstravit B. Falloppius, l. de morbo gallico c. 36. quæ mea quidem opinione cerebrum est, hinc argumentis. Nam eo primum supposito, quod probatissimorum omnium Authorum consensus docuit, contagium ad distans, atque omnem pestilentiam communicari per aerem coinquinatum; porro aer Hippoc. l. de morbo sacro primum admittitur à cerebro, relinquens in ipso suum ipsius vigorem. si enim, inquit, in corpus primo adveniret, & posterius in cerebrum dignotione, aut iudicio in carnibus, & venis relicta: ad cerebrum calidior iam existens perveniret, & non sincerus, ac purus, sed admixto humore à carnibus, & sanguine. Hæc ille; quibus accedit, quod cerebrum ad patiendum, & ad suscipiendum maxime imbecillum, & minime obfistens, molle, scilicet laxum, ac præsertim humidum, & glutinosum est, quod vnicè facit ad concipiendam labem humidam, & glutinosam. Ad hæc cerebrum est glandulæ consimilis, nisi nos fallat Hippoc. l. de glandulis n. 7. atque glândulas apprimè corripit pestilentia; nimirum parotidas, alas, inguina, quod experimento quotidiano docemur.

Po.

Postremo constat sanguinem fœdum, putridum, putidumq; manare sub ista lue de naribus, & vocem rancidam ex his prodire: quod partim humorem, ut dixi, crudum, partim affectam sedem ostendit. Atq; hæc de generatione sint satis. Quæ cum demonstrare voluerim naturalibus adductis causis manifestarijs, nō est tamen, quod occultæ morbi formæ fuerim oblitus.

Generatiōis nunc modus tractandus sequitur, qui sic habet. Deductus aer putris per canales priorum Sinuum cerebri pervenit ad retiformem plexum arteriarū, & venarum. Ibi primum corrupto sanguine mox secedit, & penetrat corpus cerebri: Quod corruptum restat à postremo contagio. Quo tempore consummatur status, & forma, siue idea morbi. Hæc enim, inquā, sphacelismus est, & corruptio cerebri, ex qua deindè sequuntur affectus alij, ac symptomata omnia. Quod autem corruptio sit cerebri, ne quid te moueat: audi Hippoc. qui l. 2. de morbis n. 1. Corruptitur, ait, cerebrum, cum aut nimium calefactum, aut perfrigeratum, biliosum, aut pituitosum plus solito factum fuerit. Et de coacis pag. 117. col. 1. cerebro corrupto alij in tribus diebus, alij in 7. moriuntur: Hos verò si effugerint, seruantur. Cuius est similis sententia in aph. 5 1. l. 7. quo loco Galenus corruptionem non accipit vulgari modo, sed ut docet Marinellus, na-

riui caloris exsolutionem à materia praevalente. Ad quam quidem opinionem si accedimus, non mirabile fiet, quod morbi quidam, & laesiones cerebri non consequuntur perpetuò, ut apoplexia, catalepsis, & ceterae organicae passiones, quae obveniunt secundum nervos, & sinus, ductusque cerebri. Haec alioquin passio fit secundum cerebri substantiam aequaliter. quemadmodum autem ab hectica febre non agnoscitur dolor, aut alteratio aliqua praecellens: & sine his etiam ad mortem itur: sic & in re nostra non est cerebro praecellens officialis aliqua laesio, praesertim exordio: sed conclusa illa, & profunda labes, cuius memoriam ante fecimus, tacito quodam exitio perdit omnem eiusdem crassum, quae dum sunt, communicatur & subiectis partibus vitium, id est, vicinae tracheae, pulmonibus, ac subinde cordi. Postremo, quibus omnibus ordine propositis facile patet, naturam affectus uniuersa, facilisque etiam fit inuentio definitionis, quae fuerit, si placet, haec. Morbus hic, quocumque tandem nomine indicetur, nominandus autem facile à promptiore symptomate, tonsillae crustosae, est syderatio cerebri pestilens, contagiosa, à seminarijs impensè putridis delatis cum aere per ventos praesertim australes ad glandulas puerorum partes analogia. Ex qua definitione, seu maius descriptione, & ex qua priore nostra enarratione subinde com-

pre-

prehensæ sunt & causæ omnes, præter vnâ
finalem, quæ medica in contemplatione nō
extat. Formalis, inquam, causa est sideratio
pestilens, contagiosa. Efficiens verò semina-
ria impensè putrida delata cum aere per
ventos australes. Materia verò siderationis
sunt humores, seu succi perdentes, vt Aretæus
vocat, intra corpus subiectum puero-
rum, & sanguis earum crudus pesti maximè
obnoxius, & accommodatus propter eâ, quæ
cōmemorata iâ fuit, analogia. Possunt, & fa-
cilè per hæc enodari problemata quamplu-
rima ad singulas omnes causas, & ad gene-
rationem generationisq; modum attinentia;
quæ problemata propositi nostri nō est, hoc
tempore explicare. Interim tamen non ob-
lici ceterarum disputationum, quæ cum hac
epidemia coire solent: Harum quædam in-
tra nos sæpè, aliæ & longè plurimæ sunt ex-
tra nos positæ, quæ potissimum etiam à no-
stris omnibus sunt commemoratæ. Illarum,
quæ intra nos extant, aliæ permanentes, aliæ
mobiles. Harum exemplū apud Aretæum
l. 1. de acutis affectionibus cap. 9. fuerit for-
tasse, quod puellis vsq; ad menstruæ purga-
tionis tempora hæc vitia vsitata sunt. Earum
verò, quæ in nobis sunt permanentium exē-
plo sunt endemicæ tonsillæ, quæ Actio au-
thore in Tetrab. 2. serm. 4. c. 45. frequentissi-
mè inflammationem incurrunt: Calidi, &
humidi cum sint earum loci. Item quod hac

affectione corripuntur, hi maximè, qui plurimo abundât sâguine, ac pueri, utpote crassinâ tenerâ habentes. 3. q. à consuetis fieri inflâ-
 mationibus maximè efferatis producuntur pestilentes tonsillæ. Ita quidem; hi bini scri-
 ptores, quibus nos addimus aliam à nullo notatam, sed à natura ipsa clarè docente nō dicente dictatam: quæ causa est praua capi-
 tis constitutio. Nimirum cum existente ma-
 gna capitis prominentia postica, deest anti-
 ca, cum compressis temporû lateribus, ac
 syncipite, quibus meatibus coarctatis, cum
 non habeat effluxum humor per transitus,
 & emissaria anteriora, recurrere cogitur in
 posteriora, & ad glandulam pituitariam, vn-
 de vitium in fauces traducitur demum. Ad-
 hæc est debilitas capitis nativa, his præser-
 tim pueris, quibus diu manserunt inconsutæ
 futuræ, & incommisæ commissuræ. Insuper
 est impuritas corporis, & adhæsus superflui-
 tatum primarum, à parentibus relictarum:
 quæ superfluitates educuntur maximè per
 exanthemata variolarum, & morbillorum.
 Horum igitur inexpurgatæ materiæ, & ad-
 huc fortè corpore nonnihil adiuuant hoc
 morbi genus, de qua re in nostra Pædartho-
 race fusè traditum est. Adiuuat & cachexia,
 siue semine parentum, siue lacte nutricis in-
 ducta; cum hac autem cōprehensa velim &
 corpora languidis visceribus instructa, quæ
 dicta sunt Hippocr. 2. prorrh. καὶ ἐπ' αἵματι.

Adiu-

Adiuvat & cacochymia. Ad summum debilitas, siue imbecillitas, præsertim, quæ fit propterea, quod ex vetulis parentibus geniti fuerunt apoplecticis, epilepticis, rheumaticis, podagricis, cachecticis, &c. Quas interne latentes causas si quis inspicere norit, mirè discreuerit profecto difficillimè seruandos à facilius euasuris. Equidem, quod ad me attinet, maximum est istorum discriminum, & huius physiognomiæ vsum indies medendo nausum. His adde strumosos, & tincosos, & quibus vitiata pars est consillarum, ab alio vitio fuit, vt apthis, ulcere columellæ, carie syphilia, &c. Succedunt extraneos causæ, è quibus vna suum est sydus cælestē, quod astronomi taurum statuunt, dominans huic parti peculiariter, insensum pro tempore. Secunda causa est regio calida, & humida meridionalis, ventis perflata australibus, & calidioribus. Quod miris confirmatur experimentis, nimirum Hispania primum adnotantibus suæ gentis scriptoribus, primo, & doctissimo Ioan. Alfonso Ponseca, mox etiam Andrea Tamaio in tractatu de Garotillo, q.d. de strangulante funiculo perveñtē intorto. Prima fuit, quæ mali vim huius acerbè sensit: posthæc Melita, Sicilia, Sardinia, Hydruntum, Apulia, Calabria, Latium, tota denique ditio Neapolitana, cui post annos XXII. mordicus sic adhæsit, vt plerique credant, post longa etiam secula
non

non abscessuram luem. Quod autem ad ventos attinet meridionales; quia lues hæc per intervalla, perq; stata tempora insurgit, observatum à nobis est, sub austrinis constitutionibus eius maximè sævitiam prævalere. Ad has causæ aliæ sunt, vt Aretæo placuit, refrigerationes magis, exustiones minus, plagæ frigida, potus, ebrietates, saturitates, & mala à respiratione prodeuntia. Ab Actio verò nominantur, & tempestas frigida, rigidaq; feruida, & æstuosa succedens. Ita quidem ille, quibus equidem addo, venatus matutini pernoctatio sub dio, præsertim sub Lunæ radijs, ventosa, & frigida, aquosa, palustris-hospitatio, fungorum abliguritio: Post hæc victus ratio est, de qua, sicut iam legimus, Aretæus. Addunt & Spagyrici, è quorum numero primus Theophrastus est, l. 2. Chirurg. Magn. cap. 1. sub F. ex maiore mundo in minorem deductam prunellæ causam suo ipsorum sermone vulgatam, quæ est arsenicum, & realgar resolutum; de qua re lege Chirurg. Spag. S. 1. cap. 9. Ioan. Petr. Fabri, Doctissimi Medici, Philochymici præclari.

Ceterum sunt aliæ causæ à principibus nostris scriptoribus assignatæ, maligna inquam, & epidemica destillatio, quam nitrosam Hippocr. voluisse certa suadet coniectura: de cuius usu, & atrocità vide l. 1. epidem. sect. 7. & enarratorem Galenum. Vide-
tur

tur & alia causa producta à Theopraſto, qui, cum conſtituerit tres peſtis ideas, vnā à reſoluto ſale arſenicali, à quo peſtis eſt communiter dicta; aliam à ſale ogertino. i.e. auripigmento, cuius vitio fit pleuritis peſtiferā; tertiam à ſale vitriolato, per quā eſt prunella, ſic iſtam definiuit, quod fit paſſio principalis cum paroxyſmo proprio exiſtens in caloribus, ducens originem ex ſalibus vitriolatis. Ad hanc autem prunellam cum maximè analoga ſit noſtra pædanchone: hæc ſimiliter vt prunella, cauſam agnoſcet ſal vitriolatum extra regionem propter ſubtilitatem de ſua teſta, alias ab Iliado reſolutam, vt in fragmentis c. proprio p. 306. quæ fragmenta ſac videas compendij noſtri gratia. Lector.

PARTICVLA IV.

Prefagitoria.

Sed iam tempus, vt cautiones aliquot, & iudicia lætiora proponamus. Quare mutuabor, quæ tradiderit Cappadox oraculum primum l. i. acutorum, cap. 7. Tumor foras in ſublime elatus à pulmonis inflammatione liberat: intus verò abditus anginā patientibus pernicioſum malum eſt. Quamquam autem id de conſuetudinaria non peſtilenti angina prolatum ſit; nihilominus ad
pe-

pestilentem transferri quid vetat? Quiduè etiam, ut illud, quod capitis principio proposuit, huc transferamus? Anginæ, quæ compressis, & submissis paristhmio adiacentibus partibus, id est, lingua, gurgulione, palato, sed interius compressione maiore inflammatione, & strangulatu fit: quam celerrime succurrendum; quod hac ægrotantes, celerrimè rapiantur. Audi verò Cœlium Aurelianum, acut. morb. l. 3. c. 2. si peius increuerit, linguæ vltra dentes ad exteriora prolapsio: ariditas, siue siccitas faucium, articulorum gelidus torpor, pulsus celer, densus, iacendi difficultas, & magis in supino schemate, vel in latere, frequens etiam sedendi cupiditas, item loquutio non articulata, sed confusa, atq; cum dolore. At si in exitum passio cœperit ferri, liuor vultus, vocis amputatio, gutturis, atq; pectoris stridor, & recursio, siue recursus poti liquoris, pulsus defectio, quam Græci ἀρεγυμία vocant, & quibusdam caninus vocis sonitus, quibusdam oris spumatio: tunc etiam necessario mortis effectus. Nunc autem ex Aetio iudicia, & cautiones audi dicente, c. 466. p. 482. Sunt quibus etiam corroduuntur gurguliones, atq; ubi diutius persisterunt, vlcerationes, & in profundum proserpserint, cicatrice iam indurata adstrictiorem vocem edunt, reflectiturq; ipsis potus in ipsas nares. Nam & ego puellam noui, quæ post quadragesimum tandem

dem diem cōſumpta eſt, cum ſe iam à morbo colligeret. Verum ad ſeptimum vſque diem plurimi periclitantur. Concordat Aretæus l. 1. de cur. acut. mort. c. 9. p. 80. Iam autem ea, quæ antehac propoſuerat idem Aetius, referre non grauabor: Sunt autem hæc. Febrim quoq; curam habere conuenit: vehementes enim incidere ſolent, atque in repurgandis, explanandiſq; vlceribus maxime ſollicitum eſſe. Conuulſionem enim infantes plurimi paſſi ſunt in vlcerum repurgatione: aliqui verò via tranſglutiendi eſchara ſunt ſtrangulati. Admonuit autem, & de metaſtaſi aduertenda funeſta idem Author, c. 48. F. quæ eſt hæc: Valde autem magna ſollicitudine, & contentione opus eſt, etiam tum, cū malum remitti forte videtur. Etenim ea, quæ iam ex profundo corpore circa fauces attracta ſunt, ex improviſo in pulmonem transferuntur, ſi negligātur, atq; ità repente mors ægro inferitur. Verum eadem vlcera cum modo memoratis, aut cum compluribus ipſorum, mala. & præterea, ſi cum inſigni putredine, putore, nigrore peſſima. facile paſſio hæc ex occasione parua recurrit. Aurel. l. 111. c. 111. Recidiva autem inflammatio ſub hoc morbo, malū, quod ſe prodit tum experimento verum: tum teſtimonio Auicennæ, qui l. 4. ſen. 2. tr. 1. c. 20. Peior, ait, eſt recidiva ſua radice, cuius rei rationem reddit, c. 25. dicens, q̃ fiat recidiva ſua

46 *De pestilente, ac præsocante*

sub virtute debili. Contra verò consillarum
vlcera citra pustulam albam, nigram putre-
dinem, putorē, febrem, dysphnēam, œdema,
salutaria.

Diu, & vsq; etiam ad tedium, & diffiden-
tiam durare probatissimis medicamentis
tractatam, & sedulo prouisam; fœdam, & te-
tram escharam, malum; cito, & quibusq; le-
nissimis medicamentis, gargarismis, & con-
tactibus dissolui crustulam optabilus est, &
melioribus ægri rebus: præsertim, si non re-
currat eadem. Respiratum homini extenua-
ri, remitti, naribus elatis trahi, per has verò
recurrere sorbile, vel potabile, ad strangula-
tum opprimi, gargarisatu destitui, ingestum,
& appetitum alimenti prorsus abijci, tumo-
rem ab altera ad alteram auriculam exten-
di, æstare internè, frigescere externè, corde
dolere, nullis vnquā modis concedere me-
delæ vitium, vigorem omnem absumi, fune-
sta omnia, atq; etiam plerunq; singula.

Præter hæc sunt & alia, quæ ex antiquis
antecedente sermone tradita possunt huic
præsentionum parti seruire, quibus tuo ipsius
iudicio, Lector amice, fretus, dum ego neces-
saria prosequor solum, dexterè vtaris licet.



*P A R S V.**Indicationum inuentoria.*

HÆc de externis, internisq; causis, de iudicijs, deq; vniuersa affectus peruestigatione, ac dignotione iam satis: quare iam ad solennem, atq; expetitam vsu curationem aggrediamur: quæ nostra medendi ratio tametsi plurimum à vulgata dissenferit: nihilominus rationi, atq; experimento probatur, non dubito apparebit. Cuius hæc sunt fundamenta.

I. Morbus hic nos oppugnat prauitate non plenitudinis excessu: Ergò remedijs prauitati obfistentibus abigendus; Alexiphar-
macis quippe, quæ vitij vim ex aduerso frangunt.

Quoniam autem humores puerorum corporibus mali subsunt: hi propugnandi sunt catharticis, quorum Authore Galeno com. 12. lib. 1. aph. proprium est, succos malos à bonis secernere.

II. Verum quia sordes putrescentium humorum densa nimis, & altè hærens est substantia: exigit hæc catharticorum vim valenter commouentem, & de partibus omnibus extrahentem, & tam, inquam, ex inferioribus, quam ex superioribus.

III. Quoniam autem morbus cacoethes
est,

est, ne transcurrat malitia: nulla planè mora differendum est catharticum, verum continenter exhibendum.

IV. At quia affluxus iste sanguinis in cerebri membranas vno proprio, & peculiari suo remedio tollitur, quæ sanguinis est detractio: hæc etiam est administranda.

V. Verum, quia affluxus hic propèus est, sitq; ad partem principem, hæc confer-tim est providenda, leuandaq; primordio, quæ primordio sanguinis hoc accursu gra-uatur. Etenim indiget, Aurelianus ait, passio repentina sanguinis detractio, ob celerri-mum laxamentum.

VI. Quoniam autem mora diu tracta-periculum est, nè continuo prægrauetur eo confluxus: haud est è partibus lóginquis au-candus sanguis per venas pedum, & manuum: sed à parte viciniore, quæ iugulū est, adeoq; ex iugulari vena, quæ cito, & abundè, & effi-caciter exhaurire sanguinem profluentem valet, interceptione, & auocatione quadam facta. Confirmatur & ea insuper ratione phlebotome hæc, tum propter antedictam adiuuandi vim, tum quia ceteræ phleboto-me, & visæ sunt per vigennalia amplius spa-tia nil iuuasse, ac præterea nocuisse, quia ca-lorem natium, & vires mollium alioquin- puerorum dissipant, & euertunt. Satiùs ergo per vnam, & efficacem, quam per multas, & inefficaces, immò nocentes fieri euacua-tio-

tionem. Efficax, inquam, adeò est phlebotomie iugularis, vt miraculo leuasse tres pueros Laurentij Bozauotæ Carpentarij Neapolitani, pone forum charitatis, visa fuerit nonissimè Murio Capalbo Medico probatissimo Neapolitano.

Præter autem experimenta, & rationes modo recensitas, sunt & testimonia primorum rei medicæ authorum, qui tum ad perniciosos omnes peætoris, & capitis morbos profligandos confidentissimè descenderunt ad huius venæ sectionem, tum etiam præcisè medentes huic affectui præfocanti, tum Arabes, & Arabistæ, tum Latini, tum Græci primi ordinis, secundi, tertij, vsq; etiam Egyptij nostro æuo nouerunt huius præsidij præstantiam deducto fortasse more, ac disciplina ex primo Hippocrate, quemadmodum opinatus est Prosper Alpinus in libro tertio de medic. Egypt. cap. 12. vtq; etiam eius gentis esse fidem certissimam retulit mihi Ioannes Veshogius, rei Botanicae, & Anatomicae Patauij Prælector eximius, qui & ad ea loca diu peregrinatus est, & rationis linguam adeptus. Præter hos autem fauere sententiæ nostræ videtur, & inopinato Theophrastus, qui Chirurgiæ minoris l. 3. C. XV. quod est de Aicola, monuit hæc: Venarum ductus, atq; meatus deflectendi sunt per transversam secundum regionem, & postmodum hoc vnguento fuerit inungendum,

alias frustra curabitur. Rec. Realgaris præparati, succi chelidonij q. s. m. f. vnguentum.

VII. Adhæc autem, quoniam excutienda, & effundenda modis omnibus est malignitas humoribus, ichoribusue purridis, & corruptis, tum per pestilētia seminaria, tum per prauam viuendi rationem inducā; & quoniam via nulla potior, quam per halitū, & per sudores: eapropter sudorifica, & per habitum corporis diuaporantia sunt administranda continuo, donec vis morbi finiatur. Quanto autem hæc gratiora, pauciora mole, tenuiora, viuidiora, eo meliora. Talem putes necesse est aquam terræ sanctæ per Martinum Rulandum feliciter administratæ in Cent. 4. Curat. 41. item decoctum Cardui benedicti, ad lib. dimid.

VIII. Ceterum & vlcus priuatis suis medicamentis tractandum, & percurandum est. Et quia cacoethe est, cauendum est omni studio, nè proserpat, neue, vt Authores duo nos monuere, destillet in subiectas partes: quandoquidem inde grauissimum suffocandi periculum. Quoniam igitur tumores omnes malefici scribentium omnium præcepto scarificatu maximè castigantur: equidem scarificandæ sunt & confillæ, cum Zaccuto in praxi med. & cum Mercato in confillis: cum Carnenali neotericorum doctissimo dicerem & vrendas, & vel puerilis importunitas, vel necessariorum proteruitas.

CON-

concedat. Nam nil putredini repugnantius igne : quod autem Aretæus refragatus videatur , declarat ſe inficiatum propter iſthmum. p. 50.

PARTICULA V. I.

Curatoria.

SIC eodem, quem ante produximus, ordine cuncta perficiemus. Primò quidem, quacunq; ſe hora morbus prodiderit, aut ſui ſuſpicionem fecerit, nos obuerſabimur contra cathartico. Suſpicionem autem, ſi principio fuerimus accerſiti; per ea, quæ cōſequentur indicia, comprehēdemus. Sequitur autem eos, qui paſſione tentantur, quærela ſine vlla ratione, atq; difficilis motus collo, & gutturis ſubdolens faucium ſenſus. cum aſperitate ſenſibilis, item difficultas tranſuorandi liquoris ſoliti, ſaliuarum more collecti, cum ſpirationis velut impedimentum, tamquam obſtantis craſſioris humoris. Verba ſunt Aureliani prima cynanches initia demonſtrantis: quæ communia videri poſſunt & prodeuntis iam iam anginx peſtilentis. Hæc igitur, ubi cognoueris, aut ſimilia; continuo pares velim aquam benedictam Martini Rulandi, medici mehercules experientiſſimi, commemorata ab eo Cent. 3. Cur. 62. cuius aquæ apparandæ ratio quæ.

nis ab Authore isto diligenter omnes celata, nulli vnquam reuelata, & sibi soli seruata, nihilominus Deo Opt. Max. qui bona omnia vult diffundi, rescita demum est certissimis coniecturis, & nobis etiam agnita, quæ sit. Stibium venale, pellucidum, contritum, cum pari nitri purgati modo conflatum, (hepar antimonij vocant) in aquam puram, quantum digito lato superet puluerem, coniectum, & agitatum finitur, vsque dum inclarescat aqua. hæc vase reclinato leniter abstracta, aut per spongiolam absorpta, & in alios vsus seruata: puluis residuus exiccatus denuo in aquam cardui benedicti conijcitur, & toto die finitur, & inde clara accepta aqua vnciæ triente, vel quadrante datur stomacho cibis degrauato, breui corpus *ἀντίβιον καὶ κατόβιον* expurgabit moderatè, nec cum aliqua naturæ noxa. Assimilis est calix Hermeticè paratus ex vino diluto infuso, quem quanto cum fructu quotidie præbeam, Neapoli fama est iam vulgata: approbatum etiam à Rolando Cent. XXVII. Curat. 628. Interim paratis ad rem gargarismis refrigerantibus, & adstringentibus sæpè fauces, quæ reuersiones senserint, abluendæ. Gargarismata autem fuerint hæc principio, quæ Rec. aq. plantaginis, & aquæ nucum, viridum extillatarum ana lib. ÷ acet. rosat. vnc. ÷ M. hoc sæpenumero diu, noctuq; gargarisatum capiet ægrotus. Postridie per
 ely-

clyſmum aluo exonerata ſanguis de vena iugulari ſubtrahitor ad lib. vnus quadrantem, aut trientem, vſq; ad ſemiſſim, aut eodem modo, quem poſſit homo ferre. Deie&um nempè virium, & vigoris natui volumus. Porro quod nos monuit Actius hoc eodem ſermone c. 47. licet in angina non peſtilentis cura præſcriptum non pigabit adſcribere. Curandum etiam, vt modica fiat diductio venæ. Nam quum in alijs, tum in magnis venæ deductionibus aceruatim animi defectus irruat: neq; tamen anguſtiores facere venæ incisionem conuenit, nè ſanguis velut percoletur, & craſſior eius pars intus remaneat; quæ cauſa huius adſectionis exiſtit.

Si in tonſillis acri veſtigatu perſpectis, quid diſſiceat, aut putre, aut ſordidum, aut prauè coloratum, aut tumidum impenſe, aut halitu quocunq; malo circumſeptum: vtraſq; lentus non fuerit acuto ſcalpro per-pungere. nimirum vt quidquid in ſe contineant virulenti, reuomant, ac deponant; quæ poſteaquam cruorem viroſum ſatis ſatiſq; reddiderint, phlegmate vitrioli, vel aqua nuncum ſtillaticia ſunt eluendæ. Tertium hoc opus dextrè aggreſſus eſto. Cum quo commemorari licet, & ſimile ſcarificatus auxilium, quem ſecundo, & tertio debemus non ſolum gutturi, vel tonſillarum vicinitati, quæ Græci Anthereona vocant, & neruis maio-

34 *De pestilente, ac præsocante*

ribus ceruicis, quos *τίσιναι* appellant; sed etiam occipitio, & palis, & inter scapuleo, quod Græci *μυτράφουρον* appellant, & pectori, verba sunt præcipientis Aureliani in c. 3. p. 168. Per nervos autem situm intellige, non partem perpungendam.

Opus aliquanto subtilius fuerit vnum, quodpiam, quod complectatur sudorificum simul, & alexipharmacum, ac plurima quæque parte superfluitates per halitum diuaporans. Triplici huic operi vnicè accommodatum Bezoarticum metallicum, quod parare docuit Iosephus Quercetanus in Pharmacopœa dogmaticorum restituta, à XV. ad XXI. granula cum aqua Cardui benedicti sub calido conciaui, vel æstuario decumbenti præbendum, quod Bezoarticum mane, ac vespere offerendum, ad sudorem quidem euocandum semel, si bis inaniendum corpus verearis. Cæterum alio tempore ad tutandum à vi venenata hominem, & roborandum. Frequentius autem vtaris licet atq; etiamnum tantisper dum fracta vis vitij videatur. Mira quippè nostra & Iosephi Donzelli Iatropharmacopœi nostra in ciuitate solertissimi sunt experimenta, quod vel conclamatos iam ægrotos subleuet, & confirmet hocce genus Bezoartici: quod ipsum & infantibus, & lactantibus ex lacte ipso, vel iusculo exhibetur cōmode granorum v. vel vj. quemadmodum & animalis Bezoartici
pon.

pondo: commodum, inquam, infantibus, tū quatenus aphthæ, tum quatenus inimicæ lui contrahitur. Verum cum vlceris causa administratur, aptius tū rhodomelite, vel infus. ros. excipitor, terram sanctam in aqua potabili ad vnc. v. miscuit Martinus Rulandus cent. 4. curat. 41. quod tamen medicamenti genus à se expositum, sed sub velo repositum incompertum est nobis, nisi diuinentes velimus esse apparatus quempiam, & uti dicam euiratum Stribij, qui fit igne in ipsum, & commixtum nitrum sæpius immisso: quod Antimonium Diaphoreticum Hermeticæ scholæ viri vocarunt. Vtus est autem alias aqua cardui benedicti, cuius & sal Rhodostagmate, vel conserua quacunque alia commixtum efficacius est. Verum de sudorificis nos fusè in diætetico Chirurgico nostro disceruimus lib. 1. trimembris Chirurgiæ.

Restat ministerium curandorum vlcerum malignorum, quo munus partim constat vsu medicamentorum beneficientium plurimū, officientium nihil, partim omnino aduersantium vi morbi, partim consulentium naturæ partis, constatque simul vsu manus etiam noui beneficæ. De quibus quidem manus officijs, & cautelis dictum iam fuit, de medicamentis verò inter præsidia.

Sunt & cucurbitulæ à nullo non authore probatæ. Verum enimuero locorum situs & morbi tempus cum primis, & attentè sunt

discernenda. ineunte quippe, aut progrediēte, vsus est alius quam in progresso, & confirmato affectu. Sub progresso enim facile iudicari esse de supernis ad inferna trahēdū, ac retractorias cucurbitas imponendas: irruente verò ad supera sanguinis copiam, de inferioribus ad superiora disponendas easdem arbitror cum Aetio, qui ex Aretzo præcipit, cucurbita primum infra vmbilicū adhibeatur, mox ad latera, dorsumq; & scapulas; in admotione verò ex supernis locis deorsum trahatur: sentioq, cum his, qui apud Aurelianum primò quidem inguinibus tum præcordijs, tum supra mammas cum scarificatione, dehinc gutturi, atq; collo, eiusq; partibus voluerunt infigendas. Iam verò cum mammas dico & alas adijeio, per quas cum reptet axillaris vena, de huius ipsius deductu conscendentem sanguinem plurimum utile fuerit retrahere. Illud porro crediderim indicasse Hippocratem ipsum, cum in l. i. de morb. cucurbitas mammis agglutinandas sanciebat: estq; hunc fortasse secutus Aretæus, qui egregium dicit medicum, qui cucurbita affixa malum in pueris detrahit, aut synapin ossibus pectoris accōmodat.

Cucurbitulas sequitur adiumentum à Cælio Aureliano propositum, qui ait: si passio perseverarit, atq; æger ad perferendam curationem fuerit mollis, ut ferri cuspidē metu se contingi prohibeat, sanguifugas, quas

Græ-

Græci bdellas appellāt, apponemus, vt perfectā ſanguisugarum vulneratione raptā cucurbitæ detractio compleatur.

Quoniam autem ſinapi mentio modo facta eſt, memini nunc eius diuerſiui, ſeu derivatiui præſidij cuiuſpiam ab Aretæo propoſiti, quod eſt. ſi partibus iuxta maxillas, quam cavitatulam auriculæ interpretor, lacunas aurium dixit Aurelianus; imponens ſinapi medicus vlceret, difflationē moliatur. Quē uſum ac fortæſſis etiam Aretæi placitum acutē videntes Hiſpani medici Madritenſes apud Andream Tamayum in libro de Garotillo, c. 3. ſecus vtramq; auriculam imponere conſueuerunt baſilici cerati tantillum cum cantharidibus tritis commixtum. Præſtantiffimum etiam, licet acerbum inualeſcente inflammatione præſidium eſt vinculum, Aretæo auctore, iniiciendum, ſupra talos & genna. optima quoq; ſunt vincula ſupra brachialia verſus cubitos, & ſupra cubitos verſus humeros adſtriſta: quarum vinctum expendimus, certè peregregiam, & efficacem æſtimauerimus adiuncti doloris vi ſpiritus ad ſe ſanguinem, & humores omnes & ichores attrahente n. quare huc tracta vndiq; materia, atq; huc conuerſis liquoribus corporis eximitur multo ſanguine locus phlegmone correptus, atq; adeò flacceſcit, & confidet plurima parte, quod opus vinculi adſtriſti fuerat quæſitum. Huiusmodi

58 *De pestilente, ac praeſocante*

di quoquo pacto, & dolorificæ fricationes fuerunt, & hæ, quarum meminit Symphorianus Campegius l. 3. praxeos medicæ c. 1. sic aient; Est ingenium vulgare cum fricatione compressiua facta parte syluestri brachiorum prope iuncturam manus, vbi inueniuntur quædam parua ad modum nervi, quæ tamdiu fricantur, quousq; videantur deleta: quod fieri non potest absque dolore, & sic cum dolore diuertunt. Approbavit & hanc revellendi rationem Guil. Rendelet. in lib. meth. curat. l. 2. c. 2. Huius fermè generis sūt setacea sub inion defixa, quæ medici quipiã Hispani Madritenses testante Andrea Tamaio, ad patriam hanc luem elevandam vsu probarunt. Id verò haud probarim equidem nisi post exacta, tempora fluxionum, & inflammationum: sed neq; etiam hoc tempore, quū minus necessarium videtur. Satis autem existimaverim id remedij genus affigi sub axillis, non igne tamen, sed scalp pro accipiti adūco, transfossis cutis per digitos sublatae particulis.

Idem Symphorianus eodem ipso loco proposuit & aliam diuertendi rationem, quæ fit per aquam calidam, in qua detenta extrema corporis membra continenti manu confricantur.

Inter hæc silenda nobis, aut medentibus omittenda non sunt clysmata, siue enemata dicta: de quibus velim accipias, quæ scitè pro-

prodidit Aurelianus disertis hisce suis verbis: At si venter officium non agnouerit, etiam clystere utemur, iniicientes aquam calidam cum oleo nunc solo, nunc admixto melle: etenim surgens ex isto liquore vaporatio colla laxat tumentia, & egestus venter facilia facit spiramenta non solum synanchicis, sed etiam hominibus sanis. Manens enim alienitas, hoc est, excrementorum aliena, & superflua sex grauat, atq; expressione quadã acerrimas facit corporis exhalationes, quibus tumentia promouentur, caput impletur.

Sunt & auxilio medicamenta in functione medica duplicia, id est, partim solida, partim fluida, ex quibus conflatur & mista. sub fluidis autem comprehendas licet & vaporabilia. cuiusq; generis capias omnia, fugienda sunt, inquit Cœlius, quæ vsq; ad sensum veniunt mordicationis. Siquidem tumoribus prouocatis fluor quoq; humorû crassescit. E solidis sunt pulueres, qui per fistulam calameam, arundineam, sabuceam, metallicam, immisiles spiritu insufflato, de quibus Aetius serm. citato, c. 46. Huius generis sunt tritus fimus canis & fœcus pastis, item lupi, cinis pullorum hirundinum, terrestrium colearum nudarum. Galeno Chalcitis, sal armoniacus Alexandro Benedicto, sal prunellæ Theophrasto, Rulando, Mullero, sal fuliginis, eupatorii, plantaginis, hyperici, persicariæ, atari, syderitis Fido Iulio Reineccero, atq;

atq; ex alijs arte paratis, aut ex herbis, herbarumq; partibus: vt glandis, rhois, antherarum, olinę frondium contritarũ, de quibus maximè latrones tom. 1. suo loco. E fluidis, spiritus calcanthi, sulphuris, nitri, salis vel per se, cum pura exiguntur, vel succis, serapijs, decoctis aquis commisci. Quamuis aut ol. vitrioli Mysochymici exhorreāt quiddā in assertionē Cl. Petri Castelli acq̃eturos certus sum: quandoquidē & A. Celsus in arte medica, & L. Quercius in Miraldū etiā approbarunt: dat & cum aq. foliorum quercus Euonymus par. 2. th. 378. Ruland. cent. 4. cur. 34. Oleo ligni Heraclij ad colluendas crebro fauces, & partem omnem affectam vsus est salutariter Rulandus Cent. 111. cur. 90 & cent. VII. curat. 91. & Cent. VIII. curat. 9. Succedunt aquae, ē quibus prima est aqua inextinctionis auri, Aqua iuglandium commendata per Alexium Pedementanum, atq; etiam in potum per Euonymum phylatru parte priore thesauri p. 6. Hic autem & l. 2. qua de oleo laudavit & hoc, quod Rec. aq̃e ardentis vnc. j. aq. scabios. l. 2. ex hoc madida lintea externis applicentur saepius iterando spatio trium horarum praestat iuuamentum. Aquam cardui benedicti per sepe vsitatam Martino Rulando ieges. cancrorum cinere infectam aquam, mox percolatam, & calefactam gargarisatu commodam sic perhibet Aetius, vt per hanc crassa educi multā, ac releua-

leuari conſeſtim ægrum teſtificetur. Ex omnibus mihi uſu conſuetum, & frugiferum expertum eſt baſamum Arſenici cum ſale nitro, & tartaro deſagrati, & multoties aqua copioſa abluti, quemadmodum à Philippo Mullero provide apparatus leges: quam materiem approbaſſe viſus eſt Theophrastus l. de apoſt. c. 15. cuius momētū cum conſcorzonarię drac. ÷ voratum ſalutare comperi ſæpè.

Hæc iam plurima medicamentorum & genera & ſpecies & modos cum protulerim: illud mihi video reliquum, vt admoneā demum auditorem meum, hæc aut eiufmodi alia deligenda, adhibenda, miſcenda, temperanda, gargarifmata, collyria, delinētus, intinētus, puluiſculos, vaporatus, ſuffitus, & alias quaſcunq; medicaminum formas languentium viribus, ætate, ſenſu, pro morbi vi, & pertinacia, vlcera puritate, aut impuritate, colore viuido, emortuo, ſic & pro putredinis modo, pro cruſtula adhæſu, refluxu facili, recidiva, pro modis alijs, quæ quidē ſingula nobis difficile deſcribi, ab aſſeſſore medico diſcerni facilè queunt. Alterum adnotabo, quod cataplaſmata non adſcripſi propterea, quod in hoc anginae genere præfertim prima ſunt neruoſa, deinde humida corpora, quæ poſſunt putridū hoc vitium fouere, monente vel ipſo Hipp. l. de medico: tertio multa in his interdum permutandis requiri;

62 *De pessilente, ac præsocante*

ritur sedulitas, & prouidentia, ne tum longiore hac vitiosi corporis contagione, tum corruptibili suo ipsorumet vitio abalienata rancorem, aut acorem concipiant: quod non paucæ offensæ, ac detrimento foret vlceribus, vt monuit Cælius l. 3. de acutis c. 3. p. 164.

Postremum ordine, sed vsu primum remedium est victus ratio: quam fieri potest maximè tenuis, & præparca. Sic igitur Alexander Trallianus in lib. 4. calce. victu vtantur ægri omnium mulla aquosa, quæ vniversa præstare potest; nempe extenuare, & purgare, partim etiam per vrinas, partim per ventrem. A tertio die etiam cremor ptisanæ offerendus, qui & ipse omnem facultatem obtrinet: quippe abstergit, incidit, nutrit, & inflammationū feruorem refringere potest. At inflammatione iam extenuata, & moderatione facta, necesse est lutea ouorum mollißima, non autem multa exhibere; Nam copioso alimento statim angusta premuntur, & rursus strangulata periclitantur: quare inflammatio, vt magnum malum, in his vitari debet: non enim tantum ex parcissimo cibo, quantum à copiosiore periclitantur. Sed & inedia perpetua visi sunt nulli non sanati. Nimirum Alex. Bened. l. 7. de cur. morb. c. 19. narravit de synanchico, qui citra sanguinis missionem inedia plurium dierum sanatus est, quia sanguis alimentum corpori sub:

subministravit. Ego verò Seuerinus noui puellam XI. annos natam, quæ cum nullis, vel cibis, vel potibus per paristhmiorum obturatam viâ vti potuisset, & oâiduo maiorem *æritia* in ediam passa, non alijs medicamentis restituta est: quæ XVI. ætatis suæ anno nupta geminos mares peperit viuentes nunc vtrosque filios, cui Gratia Feulæ nomen.

His de curatione sic dictis, nemo mihi vitio det velim, quod ad anginam hanc pestilentem pleraq; quæ veteres ad non pestilentem curandam præceperint, detorta traduxerim. Nimirum facile deponent accusationem; siquidem audierint Aretzum in libr. 1. de curatione acutorum c. 7. pestilentium in faucibus morborum curatione dicentem hæc; Horum vitiorum curatio cum alijs consillarum affectibus, quæ communis, quæ propria. In inflammatione, & strangulatu purgatio per clysteres, venæ sectio, irrigationes, cataplasmata, fots, deligationes, cucurbitæ, omnia demum eadem, atq; in his conueniunt, &c.



PARTICVLA VII.

Satisfactoria.

NVnc, quæ dilatæ fuerant in locum com-
modiorem ambiguitates, ab alijs om-
nibus expediti diſcutiamus. Difficile fit ple-
riſq; quod caput, & cerebrum propriam,
morbi ſedem fecerimus, quæ cenſenda po-
tius fuerat internus thorax, qui febrili mali-
gnitate, aerię peſſulétia, & ſymptomatu affi-
nitate, ac pluritare morbi videtur præ capite
hospes accõmodatior. Atqui vero caput ab
his omnibus, quæ retuli, longè alienum ap-
paret, nec ſymptomata ſua exhibet, niſi pra-
ro. Verum enimverò, ſi rectè rem æſtimave-
ris, ac profundè perſpexeris, non aliud ſanè,
quam cerebrum dixeris morbi domicilium.
Nam quod pleroſq; ſuos affectus oſtendit
thorax, maturius id fit loci intolerantia, ſub-
ſtantia tenuitate, & functionum acrimonia:
qualia non ſunt quidem cerebro, quod citra
nervos, & ventriculos eſt hebes, & obſtupi-
dum, utpotè quod frigidum, & humidum,
crassæ ſubſtantia, & viſcida concrementum
ſomni ſedes, cordi *ἀντιπροπῶν*, & pituitæ pluri-
mæ conceptaculum; quare deſluxibus fre-
quentibus, & catarrhis obnoxium. Quæ ſua
crasſa, ac ſyſtaſi fit, ut hospitetur æquius ma-
la, diutiuſq; ſerat habitu præſertim exterior-
re.

re. Quin & interiore concamerato duo de-
viginti aquæ concretæ libras Colonienſes,
quæ XXIV. forent ex noſtris, ſuſtinuiſſe pue-
rum hydrocephalo languentem teſtatus fue-
rit, qui mortuum inſecuit Guil. Fabric. Hil-
danus, Cent. 1. obſeru. Chirurg. c. 12. Quid?
quod & exciſis cerebri ſegmentis vixiſſe
homines, tum ipſe Hildanus, tum Iacobus à
Carpo, atq; alij probata fide Authores per-
hibuere. Qua conſtanti ſua hebetudine, vt ad
rem redeam, ſuſceptum aerem prauum, qui
per nares perq; palatum delatus fuerit, ad-
mittens facilè non remittit, neq; vincit, aut
diſſipat, ſed acervat in ſeſe volens libenſq;
cum verò per cauſas exteriores humoribus,
& ſuperfluitatibus gravatur, non obſiſtit, ſed
circa ſe retinet non gravatè, eſſi gravatum.
Ita fit demum, vt in horas labefactatus la-
bem mali concipiat, & vt dixerat Hippo-
crates, corrumpatur: hoc eſt, euerſa tempe-
raturæ in alienum modum tranſmutetur, qui
ſphacelos alias appellatur. Atq; illud qui-
dem ſub longiore morbo accidit. Ceterum
in breviori brevius etiam veneni vis vigo-
ris ſui numeros abſolvit, nihil refragante
cerebri obtuſitate, vel fungæa ſubſtantia tri-
uenticæ quippe peſtilentiæ tantū id præciſè
quod non mortale reſiſtit.

Quamquam autem multæ, & magnæ de-
monſtrationes proferantur de obſeptis, de
vitiatis, de corruptis, ſpiritui deſtinatis viſcer-

ribus: hæc quidem omnia posse fieri, ac interdum facta non inficior: possint enim hæc sub atroci pestilentia, sub immani veneno pura, intaminata, integra se tueri? Pessum, quidem in pestilentibus eunt omnia: verum quod origo, & scaturigo malorum per cerebri sit vitium, longè plura nos evincunt persuasionis momenta, quam quæ producuntur ab aduersæ opinionis amicis. Profectò tam insolens, tam enormis, tam abdita, forma hæc est affectionis, ut non ineptè etià pleriq; profiteantur, febrem malignam, quæ septa suo viru sit in hominis perniciem, ut fusè descriptum est, facessat.

Alij malignam veneni facultatem, quæ per abolita seminaria in spiritus nostros, & corpus aere attracta est, & variè diducta, suo modo, vel prout partes primo, aut secundo receperint, & viam concesserint: sic has ordine, vel potius sine ordine apprehendere, ledereq; & quia partes debiles, laxæ, molles, frigide, immobiles, adenosæ, minimè resistunt, & faciliè cedunt: hæc propterea primæ corripuntur, mox aliæ, atq; aliæ iuxta modum, quo plus, aut minus pertrahi se sinunt, aut obluantur. Tamen plurimæ conteruntur, & corrumpuntur, donec ventum fuerit ad præcordia, quæ maximè omnium vigent, & ad ipsam regiam cordis, qua contacta, demum, & malè affecta deperit animal.

Sunt hæc quidem & similes omnes sententię

tix non improbables, nec impunè reijciendæ, præsertim in re tam occulta, quam est pestilentia. Itâ prouisorî Deo placeat quandoque, aut malum auertere, aut mentes nostras medentium illuminare, quatenus & intimam morbi formam agnoscere, & suam huic medelam quadratè adaptare possimus. Cui sic titubantis hominis, ut confirmetur, nec vinci se sinat, argumento, itâ responderim. Sphacelum huic morbo terminum, & consummationem esse. Vbi scilicet natura, vel ars suis vtriusq; ope, & auxilijs hanc contra nitenti morbo non anteuertat, atq; præcludat, scilicet in contrarium ambæ paratæ sunt: verum quum vterq; conatus naturæ, inquam, & artis euicerint; illa crisi- bus, sudoribus, eruptionibus, hæmorrhagijs; hæc vomitibus, deiectionibus, inanitionibus, & abstractionibus: sic retro labens labes hominis vitæ concedit ipsi. Porro sic comparati sunt plerique venenatæ naturæ morbi, & syphilis nostro æuo adhuc permanēs, ut nisi effluuium quaquā nanciscantur, ad absolutionem prouecta vtraque mortales perdant.

Qui sphacelus cum morbo essentialis à nobis constituatur: & illud propterea fiet multis difficile, quomodo sub corruptorio affectu cuncti prorsus non moriantur, sed hi quidem ingulcentur, hic velut præripiantur orco. sed hæc tamen materiæ modi, & effector faciant.

Alia difficultas est, quid torpescentem, & desidem adeò cerebri naturā fecerimus? quæ calvaria per ictum percussa, si sanguis super, aut infra membranas suffundatur: corporis vel tantillum innatantis sic ægrefert. ut obruatur continuò doloribus, vigilijs, phrenitide, febre, vomitibus, convulsionibus, erysipelatis sic, ut plerunq; non leuata ope magistra fatum oppetat suum. Verum huic difficultati volo sic occursum eadem demonstratione nostra, quam ad historiam de angue bifido flagelloso diuturno cordis hospite subiecimus; docente, quod vulnera, vel exigua partibus nostri corporis præcipuis illata è vestigio tollant hominem: earundem verò partium abscessus, atq; vlcera diutius ægrotantes trahant. Vide & in hanc rem Fortunati Fidelis præcellentem, dissertationem cōtemplationis medicæ capite postremo descriptam.

Iam autem, quia mētio incidit sanguinis, quæ fuerit oportunè quispiam, unde & qui fiat ista eadem sanguinis effusio? Quibus utriusq; quæsitis occurro, quod ad locum, unde fluat, dicens, illa esse mea sententia surculos rami iugularis internæ protensos, & protractos sic, ut in venulas abeant membranz tenuioris: effundendi autem sanguinis rationem, & modum esse hunc: quod of-farcta nimia plenitudine vasa iugularia (quæ mos est & vsus expultricis facultatis, & nu-
tus

tus humorum altè aggestorum) refunduntur hæc in furculos minores; hi autem in minimos, qui cum capere tandem immoderationem humoris non possint, distrahi, atq; diducti reuolunt circa se fluorem superfluum, & inde educus hic stagnat frigefactus, & grumefactus subinde.

Ad hæc hesitabunt etiam inexperiti, & pauidi quidam consuetorum tantum rituum amici, non assentientes medicamentis per superiora purgantibus, sed negantes per affectam, quod magis exasperari possit, humores malos pertrahendos. Verum tamen non ego responderim his, quod Aurelius Celsus l. 4. c. 11. ad linguæ resolutionem curandam crebris utitur vomitorijs: sed in hac ipsa causa dico, non nostram hanc solum sententiam, neq; nostra emetica noxam illatura faucibus; quin etiam his supra quam leuissimæ cathartica benefactura. Quod spectat ad suffragantes, & auspices: Aetius est vnus, qui dicto lib. c. 57. disertis verbis professus est hæc; maximum autem remedium, inquit Archigenes, purgatio frequētior existit per pharmaca fortiora, & vomitus a radicibus per interualla suscepti. Et inferius: mirum in modum autem efficax est, quod ex elaterio constat, & octaobolon appellatur. Elaterij æreolos .i. spumę nitri obolos tres, synapsis dra. i. hæc in aqua dilata in octo catapota infuso, maneque duo, tantundemque;

velperi exhibeo. Purgat enim citra molestiā
 supernè, aliquandiu quidem permanens, &
 soluens. His verò, qui robustiores sunt, post
 trium dierum spatium rursus exhibeo. Sunt
 autem hæc orthopneis, anhelosis, & ægrè
 spirantibus proposita. quod si velis ad angī-
 nam diætata vomitoria, idem ipse cap. 47.
 Archigenis remedium, quo vtor, inquit, ad
 occultas anginas, mirabiliter etiam condu-
 cit anhelosis. Elaterij oboli dimidium, spu-
 mæ nitri obolos tres, sinap. dra. i. contere,
 cum aqua & informa. Mouet autem vomī-
 tum elaterium cum oleo, aut melle tritum,
 & penitissimè illitum. Ita quidem ille, qui &
 post multas ibidem propositas formas vo-
 mitorium prodidit, & illud Martiani, quod
 & ad opertas, & manifestas anginas prodest.
 Præexige, inquit, mercedem. Aeris vsti drac.
 XII. atramenti sutorij drach. XIII. myrrhæ
 drac. i. elaterij, drac. i. spumæ nitri dra. i. fellis
 taurini drac. iiii. excipe melle, & cum pinnu-
 la quam penitissimè illine. Ita quidem in ca-
 pite isto. Verum in antecedente 17. multò
 luculentius scriptum reliquit: vtilia etiam
 his sunt ea, quæ vomitoriam vim obtinent,
 maxime illis, quibus gravitatis sensus circa
 ventrem hæret; quæ confirmat & alijs qui-
 busdam experimentis; quæ subdidit ibidem
 Author: Hæc Aetius, & antiqui alij. Quibus
 isti non acquiescentes fortasse producent,
 quod nihilominus oblectentur hæ partes
 tran.

transitu biliosorum, & corruptorum humorum. Verum ò imprudentes, ergo præstiterit, inquam, asseruari biliosos, & corruptos humores in stomacho & h:scæ locis, quam è proxima vicinia, vndè fit anathymiasis educi semel. Anne audistis Aretæi Cappadocis oraculum, qui vos monuit, è gula, & partibus alijs refundi malum in paristhmia? Si quis verò displicens sensus ex reiectis adhererit faucibus, hanc vtiq; licebit protinus gargarismate sublui, quemadmodum & offensa deiectionibus infima intestina clysmis idoneis absterguntur, aut lacescit catapotijs acribus ventriculus, iusculo, aut apoze-
mate suaviore restauratur. Sic nihil fit noxæ residuum, & multum vomitorij emolumentum. Accessit & in veterum sententiâ Symphorianus Campegius l. 3. med. praxeos. c. 1. Item Amatus Lusitanus, Cent. 7. cur. 90. atque etiam Martinus Ruland. cent. 11. cur. 62.

Hactenus iam excussimus offendicula vomitorium: altera nunc controuersia nascitur de phlebotome iugulari, quam nedum non profuturam, verum etiam obfuturam adducunt nonnulli, quod ad supremas partes facta phlebotome aduocatura sit sanguinem potius, quam auocatura, propterea quod rapi eò sanguinem credant, vnde scissura facta promanet idem. Verum liberè fatear, pigere me laboris in re patente, tum

secundum experimenta, tum secundum placita clarissimorum Authorum, qui & nil improbarunt hocce praesidij genus, & singulariter etiam approbarunt. non improbarunt, neq; nhibuerunt exordio faciendam: quia quod velint homines isti, primo reuulsoriam in pedibus, & brachijs instituendam, mox de proximis vasibus euacuandam, illud neq; Avicenna seruauit, qui lib.3. f.9. tr. 1. c. XI. ait, & non postponatur phlebotomia, venae, quae est sub lingua, immò oportet, vt aperiatur illa eadem die. Sic Am. Lusitanus Cent.7. obseru.90. nulla interposita mora, aut vacuatione alia posthabita sub lingua venam secuit, & hominē seruauit. Sic Rondelet. Secundae tamen sunt venae sub lingua eadem die, ad materiae deriuationem, quae facile fuit, & locum replet; vnde dispnea, & saepissimè suffocatio. Hæc ille l.3. meth. med. morb. intern. c. 5. p. 325. Sic Camerarius apud Schenckium in obseru. l. 1. Patavij meis temporibus quidam Scholasticus Græcus oriundus ex præcipua familia, sanguineus, vnica nocte in Anginam acutissimam incidit, vna cum tumore linguae maximo, vt statim loquendi facultas adimeretur illi. Cūq; tam celeriter medicorum, & chirurgorum opera vti non posset, ipse præsentē animo, linguam acuto cultello decussatim incidit, ac satis multum sanguinis effluere permisit, quo facto, rursus loqui cepit. Medicus postea

Ac accersitus, pauca vniuersalia, & totum corpus respicientia adhibuit, præscripta re-
cta victus ratione, linguæ verò vulneratæ
pulueres ex Thure, Bolo, & similibus siccan-
tibus inspergi iussit, & ita intra paucos dies
conualuit. Sic interdum fortuita remedia
alijs sunt efficaciora. Et præterea si rectè in-
terpretemur, id prisca sancierunt in morbis
non excellenter peracutis, & in adultis: At
verò in pueris, quibus monito Galeni in
l. 1. meth. c. 14. & lib. de therap. per sanguin.
mission. c. 17. & 4. acut. 25. fas non est exhau-
rire sanguinem, si necessitatis, & vrgentiæ vi
phlebotomo pûgamus eosdem semel, & vix
in morbo venenoso: verum efficaciter pun-
gamus oportet, præsertim quia miras tot, &
singulares de hac phlebotomia prærogati-
uas prædicarunt; Soranus primum Ephesius,
Isag. med. c. 21. Alexander Trallianus, l. 4.
c. 1. Razes, Mesuarius, Auicenna, Haliabbas,
Albucaasis, Author lib. de anat. viu. Prosper
Alpinus, l. 2. de medicina Ægyptiorum, c. 9.
Andreas Celsus, l. 6. art. med. c. 3. Ioh. Heurn.
lib. de cap. morb. c. 23. Riolanus in medendi
methodo part. c. proprio, ac Doctor Zacu-
tus nouissimè in principum medicorum hi-
storia, 76. quem legas velim, multo plures
quàm nos Authores huic præsidio suffraga-
tos recensentem. Equibus omnibus audi
Aetuarium, l. 3. meth. medicinalis, c. 1. perhi-
bentem, etiam in causa nostra proficuum
hanc

hanc euacuationem, his suis verbis. Sunt qui venas colli incidant, verisimileque est, eas iuuare, cum sanguis copiosior ad caput confluit, atq; idcirco inflammationem in cerebro exeat. Comprehendis iam, quam egregiè per huius viri sententiam congruat iugularis pertusio nostro malo. Vin plura? sed vise, quæ appositè ad hanc rem ingenio pariri, ac iudicio refertissimus Andreas Cæsalpinus l. 2. quæst. med. c. 12. prodidit demonstrans, suffocationem in angina fieri magis oppletis venis iugularibus, quam clauso laryngis osculo. Id quod scilicet in hoc anginae genere præsertim exitiali, ac ter acuto fieret facile, nisi, quod ad superiora transcurrit. Post quos omnes Authores mira nos beneficia ex hac inanitione deprehendimus, admirati sūt medici, qui nouerunt, egroti senserunt in se ipsis, tum simulac aperta iugulari degrauiatum plenitudine cerebrum, tum quod feruidi caloris ventilatus excessus. Sic quod nedum non obfutura, sed profutura, maximè sit hæc phlebotome, iam vides. Ceterum, quia non vñtatæ alioquin chirurgiæ administrandæ ratio est ignota; de hac ego in opere efficacis chirurgiæ, qua & angiologiâ proprio suo loco fusius explicauit. Quoniam autem in manus administratorum conforum recidit hæc actio: Si Petrum Paulum Magnum lib. de venis rectè secandis, c. 2. adierint, vel Cynthij Amathi Neapolitani

eb.

observatoris nostri nouissimā praxin. Quā-
uis autem dubitatum à plerisq; sit, de non
attingendis Scalpro venis colli, tū propter
infrenabilis proflui sāguinis, tū propter vin-
culi subiiciendi metum: nihilominus equidē
ostendi in priore parte efficacis chirurgiæ,
qua de angiotome venarum; & nullum san-
guinis superfundendi metum esse; & inanē
prorsus vinculi formidinem, cuius utiq; vñ
neceffe non est.

Posthęc offenduntur & nostri, quod ante-
cedere catharticum sanguinis detractationi
voluerim: cum inuerso Galenus & Galenici
oēs ordine consueuerint prælijs hisce vri.
Verum istorum dissensus est mihi sedare fa-
cile. Porro meminerunt sanguinis emissio-
nes, sub venenatis & pestilentibus vitijs haud
probari doctis, nimirum quod inantis vasi-
bus possit vis venenata recurrere ad interio-
ra, atq; etiam quod huic affectus generi vi-
rium imbecillitas adiuncta sit. quate ne mi-
rum quidem est, quod Galenus in lib. de ci-
bis euchymis, & cacochymis auidaciz ta-
xat eos medicos, qui non dubitarint in pe-
stilenti febre venam secare, atq; ex aduerso
commendat eos, qui pestilentibus in affecti-
bus abstinerint à sanguinis detractatione,
qua eadem prudentia, & cautela magnus
Hippoc. si credimus Petri Salij li. de febre
pestilente, demonstrationibus, ne venam
quidem attigit. ita quidem antiqui dictato-

res nostri, à quorum decreto non discessit
 Heurnius in libro de peste, Ioh. Vierus quo-
 que in curanda febre maligna abstinuisse
 se venæ sectione professus est, quod hanc in-
 feliceiter cessisse animaduertit. Ex aduerso
 tamen est Ioh. Forestus, qui libro 6. obser. 3.
 de morbo epidemico in fauces, guttur, pul-
 mones irruente scribens ad Iacob. fratrem
 dicit experimento non inutilem, neq; detri-
 mentosam sibi compertam sanguinis è vena
 detractionem, neq; etiam hanc damnauit,
 sed approbavit Auicenna, vbi de febris pe-
 stilentis curatione tradidit. inter quas binas
 sententias se quasi medios facientes Hie-
 ronym. Fracastorius l. de contagio morbo-
 rum, Ludouicus Mercatus in cõsil. medico.
 24. & Hieron. Mercurial. l. de peste c. 2. cen-
 suerunt constantibus viribus, & plenitudine
 suadente mittendum esse sanguinem, verum
 tamen in affectus principio dumtaxat: nãq;
 hoc elapso tempore sanguinem exhaurire
 est languentes perdere. Cui nos placito ad-
 hærentes & semel & morbi initio tantum
 sanguinem minui volumus. è binis autem
 prædijs catharticum præmitti placet, quod
 tutius, & præstabilius id videatur. Quis enim
 non enucleatè videt, & pestiferi vitij vim
 sic elui citius, & huius futores succos ab-
 strahi provide. Quãquam verò nostræ huic
 assertioni quidam refragari, nosq; corripere
 conentur, quod primo quoq; tempore Ca-
 char-

tharticum, & illud vehemens propinari doceamus, quod est contra normam expectandæ coctionis, & contra monita sapientum, ne quietos humores perturbemus, & crude frustra mouentes irriteremus. Quibus tamen responsum volumus, quod cogamur in terperacuto, & pestifero morbo solliciti, & festini esse, præsertim ita suadentibus M. Galeno l. 6. de medicam. localibus cõpon. cap. 3 itemq; Alexandr. Trall. l. 4. rei medicę c. 1. ac nouissimè Zacuto Lusitano acuto, & experientissimo ætatis nostræ viro, in l. de princ. med. histor. c. 75. quam Lusitani viri Clarissimi disputationē adeas quęso Lector.

Obijciat & quis, qui audeam equidē scalpro tonsillas percundere, quia facilè sic exacerbentur. Verum, inquam, non obtrudo his; quod Cornelius Celsus l. 4. c. 4. satis altis plagis palatum incidit, itemq; Paulus l. 3. c. 17. itemq; Cēl. Aurel. l. 3. c. 3. ipsamq; linguam, & fauces, & palatum tenui, ac longiori phlebotomo scarificat. Etenim, inquit, in locali sanguinis detractione tumentia relaxantur. Non hæc, inquam, obtrudo, vel similia; verū tuendum affirmo decretum nostrum, quod tonsillas vitio tactas crebris ictibus concidit Hippocrates, l. 2. de morb. l. decimo, & l. de affectionib. num. 4. & Corn. Celsus l. 6. rei medicę, cap. 10. & Cēlius Aurelianus, l. 3. morb. acut. cap. 34. Tamen post scarificationem mitibus gargarismis vtendum voluit

78 *De pestil. ac praeſoc. pueros abſceſſu.*

& Oribasius l. de ſcarif. c. 20. & Iſaacus 9. praët. c. 41. & hūc ſectatus Cōſtanti-
nus Afer Chirurgus c. 38. & Gariopētus l. 1. Paſſiona-
rij c. 23. & Hieronym. deniq; Mercurial. l. de
morb. puerorum c. 12. Andreas Tamayus, &
medici omnes Palatini Madritēſes, & in Hi-
ſpania. Ita ſcil. ſcarificatus tutus, & frugife-
rus tō illis extumeſcentibus viſus eſt doctiſ.
omnibus: nō ita quidem adaſtorū cum lan-
cinatione digitorum impreſſus, quo perſepē
vulgares Medici cruſtulam elidentes vti cō-
ſueuerunt. Quō diuinitus, & aīrō: verē ſpe-
cāuit Aetius eodem iſto ſermone c. 46. di-
cens, conandum a. eſt in vniuerſum, ne digi-
tum quidem locis admoueamus, aut leni ſal-
tem tactu manum admoliamur. Etenim in-
ſcij, ad quos maximē in rebus dubijs homi-
nes confugiunt, vehementius illinūt, ſimulq;
inflammatum locum comprimunt, ſimulq;
cruſtam detrahunt, quod minimē facere cō-
uenit: priuſquam eleuatam, & vix innitētem
cruſtam conſpiciamus. Quod ſi enim adhe-
rentem adhuc cruſtā aggrediamur, vlcerā-
tiones in profundum magis ēt procedūt, in-
flāmationes conſequūtur, augentur dolores,
& in vlcera ſerpentia proficiūt. Secutus hoc
Aetij monitum eſt Paulus, l. 3. c. 26. ſicut in-
cunctis aſſolet: Compendioſē autem ā no-
bis de peſtilēte, & praeſocāte pueros abſceſ-
ſu dictum ſit ad hanc horam vespertinam 22.
Ianuarij An. XLII. ſupra M. DC. Deo litemus
authori gratias.

Ex.

THOMAE BARTHOLINI,
GASPARIS F. ILL. DANORVM.

In Librum de Pædanchone pestilenti
Cl. Viri Marci Aurelij Seuerini

EXERCITATIONES.

De Pestifera Angina Parte Affecta.
Exercitatio I.



Vanquam Iuris Consulti di-
ctatum non ignorem, cul-
pam esse, immiscere se Rei
ad se non pertinenti; tamen
sponte id quicquid est vitij
incurro, siue fato ductus,
siue affectu. Duplex hic ex

pari iuris diuisione, vel in Rem, vel Personã.
Vtriq; debeo, quod præsto, quamuis impar
conatus destituat volentem. Hæc verè spe-
ciosa, quam à dignitate, & Senatorij ordinis
ornamentis clarissimam indigitabat Vlpia-
nus. Illa & causam complectitur, & iura, im-
mò si iudicata sit, pro veritate accipitur,
quam innata sciendi cupidine amplectimur
quotquot cordata pectora gestamus. Nec
cul-

culpæ metus apud Paulum I. C. terret, quum
infra minimam subsistamus negligentiam.
Dolus abest, stipulationem interpono, ne
terrearis, qui placidos oculos promissisti.
Vtriusq; causâ ad nos spectat, quanquam
alio Sole calentes, huius quidem per benefi-
cium, illius per naturam. Personam vis? Se-
uerinus est aureo Sole clarior, Rem? perso-
næ par, Non subiecto, vt barbarè loquar, sed
necessitate. Cunas quippè excutit, in quibus
vt de Deorum filiis Seneca, ipse caput polo
intulit, puerosq; ad calami ductum vocauit,
qui inter Senes Oraculum sedet. Affectionē
antiquis ignotam, sui verò temporis, & soli
horrendam, pessilentiam dico, quæ puero-
rum colla velut fatali sydere afflar, & accu-
ratè vidit, & depinxit ingeniosè, siue ideam
morbi spectes, siue curandi ordinem, quo
Æsculapij vice gallum, vel obtinuit, vel me-
ruit. Ad corruptam affectionis naturâ pars,
cui impacta est, refertur, de qua litigant eru-
diti sententiarum diuersitate. Cor alij, prin-
cipem terrestris domicilij, alij huius arcem
in Padanchone affici crediderunt, plures
collo insidere, vtriusq; velut ponte existi-
maverunt. Neq; aliò diuerunt coniecturæ. Nos
duabus distinctionibus rem omnem amica
côcordia componemus. Vel enim sympto-
matum expendimus sedem, vel morborum,
& amborum vel primariam, vel secundariâ.

Quamuis non rarò confusio tam loco-
rum,

rum quam affectionum in turbato mortaliſi ſtatu exſurgat, vt vices primarias habeat modo hæc pars modo alia. Altera ex ſymptomatum natura emergit cōſideratio, quæ vel morbum lege neceſſaria comitantur, vel caſu ſequuntur, quod per accidens Philoſophorum filij dicerent.

Rurſus affectiones pleræq; quæ corpus vexant, duplici vt plurimum loco efferuntur. vni quidem inhærent, arboris inſtar, radices altiores velut in terrâ defigentes, alteri verò ita, vt non niſi fructus, lataq; ſeminū germina oſtendant.

Hunc ſcholę modum manifeſtatiuum vocitarunt, illum radicalem, commodis notionibus rem omnem complexæ: ex quibus quæ de affecta in Angina puerilis ætatis peſtiferæ, ſede oriuntur controuerſiæ, facilè ſoluuntur. Enimverò τῆς κεφαλῆς primarium ſubiectum, & fixum radice in morem, cerebrum eſſe, quæ graua rerum momenta prohiberent? ſiue ipſum concretum corpus dicas totam implens caluariam, ſiue interſtinctos eiufdem ſinus, ſiue principes ventriculorum ſedes, ſiue deniq; membranarum tenuium, amplexus. Hinc velut radij exporriguntur effectus, & ingrata ditioris luis merces in collo, eiufq; vicinia omnibus appenduntur venales, in Pariſthrijs, ſeu Tonſillis, larynge pariter & gula, muſculis motui omnium inſeruientibus, reliquis deniq; hanc compa-

gem perficientibus. Non alia sanè ratione Philosophorum Princeps, & antiqui naturæ moderatores irascibilem animæ potestatem, quam *θρῆνισμός* in corde statuerunt, quum tamen per oculos effleratur, & ardenti visus imagine terreat. Pari quoq; pacto latens in iecinore virus per extremam manus, pedisq; cuticulam modo exanthematum, modo efflorescentium specie prodit, sæpius per inguina bubonis, perq; decoram faciē aphthæ figura efflorescit, & quæ non in externis fingit interiorum causarum ludibria. Nempe causæ subeunt rationem subindè morbi, accidentium causa, quæ vel necessaria sunt, vel minus. Vtræq; locum variant, & modo eadē cum morbis sede concluduntur, modo diuersa. Qua norma si symptomatum omnium in Pædanchone expendere situm, alia in cerebro stabulari, ut stuporem, alia in collo, ut crustam, in corde alia, ut febrem, & alia deniq; in pulmone deprehendes, ut tussim, & suffocationis periculum, quorum tamen nullam pro necessarijs æstimamus, quod in tanta varietate, & incerto situ sit manifestum, ex varia cerebri affectione, modoq; in solidum dependens. Ceterum à cerebro malignam originem cum Eruditissimo Severino nostro deducere, durior foret labor, nisi facem ipse præstulisset.

Nos in compendium, & eius rationes stringemus, & nostras. Vrgemus principio

natiuam puerorum constitutionem humidi feracem copiosissimi, & morborum pluriū ab ea humiditate dependentium, quæ cum in cerebro humidi, frigidique officina consistat, non mirabimur in ea ætate vberiorem huius pestilentiae prouentum. Humidi autem excedentis puerorum cerebri varias imaginor rationes, naturales partim, partim factitias. Origini quippè propiores eandem cerebri emulantur temperiem, quam in vtero, tenera ætate nondum exsiccationis opus aggressa. Fluidum autem est Embryoni, & veluti diffuens cerebri coagulum, longiori inter tacita matris claustra quiete torpidū, quod tardius excitat debilis nati iam facultas, eo magis quod per apertum diutius sin- put externi frigoris experiatur iniurias, accedente humidioris victus instituto per lactis succum, & eiusdem, sine discrimine, conditionis, adulti cibum confirmato. Unde facile inquilinos puerorum morbos, Comitiales, Exanthemata, aurium humiditates, conuulsiones, tonsillarum intemperies, aliosque ab Hippocrate notatos, solius capitis vitio ascripseris. Auget de cerebro suspicionem constans observatio hominum iustæ ætatis, qui in cladis huius admittuntur vsumfructum, semper ferè, vel capitis aliqua intemperie, vel deteriore confirmatione, siue in magnitudine, siue figura ab incunabulis vexari.

Ad quam rem diligentiori cura aduertant velim Doctissimi Parthenopeę salutis moderatores. Accedit subdolos venenati morbi modus, quo per naris aerem ea labe inquinatum attrahentes, perq; spongiforme os, cerebro interiori, retiformiq; processui, maligna fide, se insinuat. Testatur & Crisis morbi, quę non rarò per natium, siue hęmorrhagiam, siue purulentum fluxum, solutionem tentat simul, & perficit, materia nempe per singulares venas cum sanguine deducta, quę ad inferiora capitis omnia ex eo deferunt, ad superiora nihil, quia id pulsatiliū venarum sit munus, sursum à corde ascendentiū. Qui fluxus si alijs exitiosus fuerit, vt proditū quibusdam, vel id factum largiori spirituum exitu, quo partim infringuntur vires, partim in solito, nouoq; vacui habitu alterantur, nō secus ac in hydropicorum, empyicorumue vniuersa euacuatione insuetum de repente statum malè sustinuisse traditum est: vel naturali retentione vi morbi abolita, vel denique copia cerebri angustias occupante, quę & maior fuerit, quā vt solo narium fluxu absorberetur, is sine hoc fortè superueniente hominem iugulasset.

Quanquam & ad venenatum impressum signum referres. Author enim Galenus in Theriaca, percussos ab Hęmorrhoe, sanguine per os, & nares effuso, defungi. Ex earundem narium stillicidio sinistra prædicti, citra

miraculum puto, nam & debilioris virtutis,
& sanguinis in grumos compacti est augu-
rium. Similis naturæ conatus in sternutamē-
to elucet huic paroxysmo frequens, ex quo
Criseos modum iudicamus, & quod ad rem
magis, cerebri primas offensas indubitato
τὴν μὲν πρῶτον stabilimus. Soluta iam per criticum
effluxū affectione succedit salutaris stupor
totius, quæ causa vehementiori, etiam cum
Comate aliquando hominem in portu ferè
morbi iam nauigantem sustulisse observauit
Seuerinus, verus naturæ vtriusq; genius.
quid? quod sanatum puerum nervorum lan-
guor, oculiq; strabismus tentauerit. Quibus
cōiecturis quid pro cerebro affecto certius
dici possit, obtusior sum, quam vt intelligam.
Nerui optici in cerebro & sunt, & oriuntur;
Stupor, sensus nimirum priuatio, vt rectè in-
culcat Galenus, in cerebri sit substantia, quia
hæc, quod primus aduertit in Anatomicis
Parens noster, seruat pro sensu spiritum ani-
malem, ad motum in medulla eius alioquin
destinatu. Quibus si inuidiam ἀντιψύχου fidem
iunxeris, suo robore opinio Seueriana persi-
stet. Ipse enim in secandis humanorum ca-
daveribus exactissimas, non semel observa-
se se bona fide narrat, grumos sanguinis in
membranz crassioris sinu, in mirabili rete,
& inter musculos temporarios pituitam ci-
trinam congestam, quodq; maius est, putri-
laginem velut cerebri substantiam natibus

cuidam fuisse excretam, de quo experimento non dubitem, qui maiora in capitis vulneribus viderim, sequentibus Exercitationibus ordine suo recensenda.

Dicent tamen scrupulosiores, Anginam esse, adeoque non cerebri, sed colli affectionem. Fateor. Quod autem ad musculorum reponent conuulsionem? In musculis, nervosisque illorum aduertitur partibus. Non ergo à cerebro, nervorum fonte? Viderint sanè, quid responsum velint, ne proprios laqueos incurrant, quos nobis imprudētius obtendūt. Vomitus deinde vrgebunt, Cardialgiæq; fideles affectus huius comites, stomachi vitium manifestius prodentes. Quorum neutrum à suscepta nos mouet opinione, siquidem à cerebro vtriusq; deriuetur materia per cognatam nervorum progeniem sexti paris ventriculo largius circumfusam, quæ stomachum nauseantem mouet, tum in capitis vulneribus, tum in hemicrania. Cardialgiam autem idem excitat cerebri influxus, siue in ore ventriculi, quod cordis nomenclatura dignabantur Celsus, Galenus, & Aphrodisizus, siue in corde ipso, quod singulari tristitiæ sensu cum cerebro afficitur, non tam vicinitatis consensu, quam nervorum, membranarumq; origine, arteriarum, venarumq; commercio, quinimò læsæ ad pulmonem spectantes particula necessario vicinitatis iure, cordi quoq; labem suam imprimunt.

munt. Hinc æstimare licet quæ veritatis specie vitalium actionum præsidem, cor nempe in primariæ partis participationem asciscat. Viri classis non infimæ quidem. Certum est, & extra dubitationis aleam positum, omnium malorum hanc clausulam, sed quæ sequatur cerebrum non præcedat, eo præcipuè argumento, quod sine febrili intemperie Pædanchone fatum maturet, cerebri non cordis affecti iudicium. Cor enim omni alienæ, contrariæq; virtutis aduentu velut ad rem diuersam, & noxiam quocunq; gradu contractum perpetuos pulsum motus vel retardat, vel accelerat. At verò alia cerebri conditio, corruptionem sine vitalium intemperie eousq; perfert, donec venas, cordis ductus, vitij magnitudine infecerit. Imò ex se, sine cordis consensu, mortem inducere quid vetat? quod animalium spirituum ad vitæ usum, iuxta necessariorum, fata moderatur.

De cerebro medius fidius in Pædanchone minus ambigo, quam de eiusdem partibus in societatem mali, nè prærogatiuam dicam, ascribendis. Quippe interior nobilioris cerebri recessus, quem medullam vocat, ut pars princeps excludi non meretur, apud quam animalis vitæ sedet arbitrium, & potestas. Ab hac enim nervorum origine per occipitis foramen in musculos cæruicis, laryngis, hyoidis, & faucium disseminatur, par vagum, ad latera trachæ exteriora recur-

rentes nervos vocis ferè, & respirationis moderatores expandens, quos in sanguinoso hoc affectu non leuiter læsos deprehendimus. Quanquã causã alij, inter quos Aetius, in impedito pulmonum motu coniecerit, est medullæ, vel horum neruorum. Atq; hinc problematum plurimorum pendet solutio, quæ torserunt morbi noui interpretes. Quo fiat fato, vt subito subindè sine alia manifesta causa extinguantur ægroti? In promptu ratio quæriti, ex cerebri nuclei conditione, qua vel leuiter læsa, siue ab interiori incidēte, siue punctura exteriora, animans inopinato mortis genere prostermit, quod laniorum artificium solo acus in ceruicem impactu apud Subalpinos improvidi boues experiuntur. Ex difficilioribus nodis, & hic est, quare exanthemata, & colli extumescētia alibi, vt sæpius ἀποφισιῶν monuit Celsus Senex, salutaria in pestilenti tamen Angina inter mortifera signa habeantur? Ego breuiter duplici nomine exitialia pronuncio, tã causæ ratione, quam signi. Huius respectu mala, quia nobilissimæ cerebri officinæ monstrat statum, ea malignæ materiæ copia grauatur, vt suis terminis contineri amplius nequeat. Deterior causa, quæ vt maturius moriendi necessitatem acceleret, recurrentibus nervis oppletis strangulantem humorem suscitant, in musculis alioquin nudis innoxium. Ea dubij enodatione non parum Aphoristi-

ca Hippocratis sententiæ mutuabimur lucis, quam *ἐν τῇ σπείδι* accendam. Bonum sit exterius urgere humorem, in Angina quacunque, si materiæ *πυρρῆς* vniuersæ sequatur, & extra neruorum tactum subsistat. Vltima in sinibus latet difficultas, quæ rectè expensæ eorum naturâ disparet. Quatuor in vniuersum demonstrantur ab Anatomicis, crassæ membranæ veluti ventriculi, quibus tres alij Syluiani nuper accedunt, à me primum in Anatomia Locupletata descripti, inferior nempe falcis, & laterales duo. Horum omnium pressior cum arterijs est copula; ex latere altero venis sociantur iugularibus, ad quas velut canaliculi illum sanguinem amandant, qui in superflua cerebri nutritione ex arterijs venerat, ad inferiores iugularium venas, solito gyro rediturus. Vnde si rationē, ut par est, subducamus, ex necessario horum ductu expeditam delabentis causæ morbificæ ad partes in Angina affectas, collumque viam exstruemus solutionis, seu Criseos gratia, quæ subinde per narium hæmorrhagiam perficitur ex continuata longissimi sinus falcis cum summis naribus communione; nonnunquam & sæpius quoq; per laterales sinus venis descendentibus insertos abscessu critico ad colli partes tentatur. Quancquam frustraneam non rarò operam ludat Natura ob impleti cerebri, & corrupti vehementiam, qua in sinibus grumescit sanguis spiri-

rituum defectu, & ad nares corruptionis labefectus, altis, putridisq; apthis commutatur. Cuius utriusq; & sinuum, & nasi turpes facies in demortuorum sectione Maximus Severinus aduertit.

EXERCITATIO. II.

De Anginosi Affectus Causis.

DVplici nomine causarum necessaria investigatione, ad intimiorem affectus notitiam, & feliciorem eiusdem curationem, quæ utrumq; sequitur. Vnde natus magni Pergameni ex causa scopus, quem Præservatorium passim, alibi Curatorium appellat, primum medæti consilium, cuius inuictam necessitatem quum perspexisset oculatissimus Severinus, maximum & Orbis, & amicitiæ nostræ ornamentum, eam in perquirendis pestiferi morbi causis adhibuit felicitatem, quam à tali ingenio nobis facile promissimus: adeò in his virum se præstitit, ut quod addi, vel emendari possit, frustra quæras, nisi crepidam Veneris cum Zoilo tibi resumam culpandam. Ego sanè de venenati contagij suspitione tam certus sum, quam qui certissimus, in quæ demonstranda adeò anxie sudarunt magnæ mentes. In eiusdem tantum natura hæreo, nec emergendi spes, si denegauerit manû Inclytus Severinus. Qui nem:

nempe calidum, humidumq; sit seminarium;
aut esse possit, in quo caloris, sicciq; clario-
ra elucent vestigia.

Sicca aeris temperies, & calida, quæ in-
gratas has merces infauſta aura aduexit.
Vrentis pariter & torrentis fideris, quod à
caudâ minaci Cometam nuncuparunt, par
in mortalibus effectus, ardentium februm,
æſtus, malignorumq; bellorum ignitæ faces
Orbem iam ferè totum, ab eo, quo viſus fuit
anno, miſerè depaſcentes, terrarum ſiccitas,
& ſterilitas, de qua conquerentes audias nō
paucos gulæ ſuæ interpretes. Dehinc ingēs
faucium ariditas, à qua ſiti perpetua ferè di-
uexantur Anginoſi, infelices ſiticuloſi Tan-
tali imitatores. Mox venenorum natia cō-
ditio, quam ex ſicco plerumq; metimur, atq;
eo magis quod ad lucis accedat proprieta-
tem, vt libro primo, & ſecundo Operis no-
ſtri De Animantium Luce paſſim expoſui-
mus, quo etiam vtuntur ductore fiderei or-
bes, medio lumine noxias qualitates deri-
uari. Præterea, calori, ſiccoq; fauet natura-
lis Cœli, aerisq; temperies Ægypti, Melitæ,
Siciliæ, Calabriæ, Apuliæ, Latij, Neapoleos,
& Hiſpaniæ, quorum locorum inquilina
hæc peſtilentia cenſetur. Tandem non re-
pugnat attrahentis in cerebro analogia, quæ
aeri illis qualitatibus miſto cum ſpiritibus
animalibus intercedit. Atqui nec pueri ſicci
ſunt, nec tale eſt cerebrum, primarium, vt
cui.

cuicimus, recipiens. Ingeniosum quidem, sed causæ nostræ ex æquo subseruiens. Puerilis quippe humidior ætas, cerebriq; similis constitutio morbi augent magnitudinem, & periculum, quia nec ætati, nec naturæ familiaritate vlla contagiū siccum similitur. Quorum veritatem cuius notum Hippocratici aphorismi confirmat oraculum. Versa autem vice, adultiores ætatum progressu facti, & siccior temperamento confirmati facilius contagiosam anginam perferunt, sed difficilius inficiuntur, quando quidem tum ad recipiendum promptiores sint humidior ætas, & cerebrum flaccidum, quam ad patiendū inipriosam contrarię siccitatis actionem. Hæc pro calidi, sicciq; contagij suspicionem, quum liberiori, vt meus est mos, calami ductu hic signassem, commodè subiit animum recordatio contagij controuersi duplicem esse statum, proprium vnum, alterum peregrinum, vel si Philosophorum notiones acclamantem placidè feras, vnum per se, per accidens alterum: Illum in calore, siccoque naturæ suæ convenientiore consistere, hunc in cerebro acquiri humoris proprii, & alieni perfusione, vnde humidum fieri venenum, quod sibi relictum siccum fuerat, varijs, quibus abundat larga segete caput, humoribus admixtis, quod innuere obscurius visus est in morbo sacro Diuinus Hippocrates. Equidem eo inuento medio non parum non lætor,

tor, quod sine ullius offensa dubiū apud me
natum proprio Marte represserim. Atq; de
causa propinqua hæc occurrebant. Ad re-
moras referrem lubens, quod alijs intactum
video, nativa Venereæ luis semina, vel à Pa-
rentibus ea labe infectis, vel nutricibus at-
tracta, quibus deindè aeris nociui acceden-
te malignitate infausta copula nouum mor-
bi genus productum, tanquam noua ex Hy-
dro capita. Quò forsan venereæ luis colli-
neant signa manifestiora, vlceratarum fan-
gium, familiarisq; plerisq; dictarum natio-
num veneni, cerebri primas partes excen-
tis, ratione contagij eiusdem, vel eò per leui-
tatem delati, vel per oris suctionem attracti,
aliorum populorum immunitatis, quibus li-
cet calidis, humidisq; ignotior hætenus libi-
dinis huius fructus. Qui quidem quo pacto
per intervalla hos, illosue aggrediantur, no-
lo post Mercatum Hispanorum doctissimū
plura condere, ne post Homerum Iliada
maiori ausu quam gloria videar tentasse.
Causis externis toto genere alienis summo
consilio aggregauit cordatus iuxta, ac per-
spicax Seuerinus, ciborum familiarium pes-
simos succos, quales sunt herbarum quoti-
dianus vsus, brassicæ, lactucæ, & ante omnes
fungorum, quorum venenatam qualitatem
plenis buccis veteres decantarunt, in emen-
dandis adeò ex arte solliciti, siue vomitu su-
bitanco, quod suasisit Scribonius, eoq; aquæ
ca-

calidæ potu, vt hortabatur Hippocrates, siue corrigentium miscella, quorum accuratam seriem Celsus, & Plinius Valerianus texuerunt, vt & Macri varia extant, quæ

— *quoq; fungorum depellant sumpta
venenum.*

EXERCITATIO III.

De Strangulatorij morbi essentia.

Absconditus more suo naturalis morbi status, qui tot apud Libitinam abscondit crudas simul & maturas mortalium animas. Expositus tamen in lucem ab eo, qui plures luci reddidit, quam sorpserat orcus. Aurelius nempe Seuerinus, aureus verè sæculi doctor, & seuerè Philosophiæ, quæ non verborum inuolucris, sed rerum conditor, sectator stupendus. Hic miram affectionis Ideam in syderatione cerebri, quam *επατασις* Græci indigitabant, corruptionem alij, pari eloquentia, & ingenio reposuit, quod multis quanquam prematur difficultatibus, mearum tamen partium duxi, egregium effatum explicare partim, partim vltiori fulcro stabilire, si fauerit genius, nunquã alias iniquior.

Palmarium siderati cerebri argumentum præbent ipsa corruptæ eius substantiæ indicia ab Hippocrate de Morbis reuelata, quorum pleraq; suis expressa coloribus in An-

gina

gina pestifera, me interprete, dignoscas. Ex capite dolor vexat, qui si spinam occupet, vel verius penetret, musculos laryngis, eiusque nervos in tubera attollit, si penetrantis naturæ contrariæ licet ductu, per arterias, vel ordinario potius, suetoq; cursu per venas ingulares defluat liquari cerebri causa, ad cor animi defectum, sudorem ex vehementiori naturæ conatu, & noctes ex dolore turbantes insomnes observabis: Si ad vetriculi vicini os delabatur bilis, aut pituita, malorum in cerebro causa Cardialgia excitatur, & ab acrimonia, putredineq; alter, vtrius erosio venis, vomitus sanguinis: Si deniq; perfecta sit cerebri dissolutio, ex eadem vehementia disrupta sanguinis conceptacula, arteriæ, venæ, & sinus, ex naribus, qua via patet prima, hæmorrhagiam suscipias alibi salutis, hic necis augurium. Alia non tangam signa ab eodem Oraculo profecta, quia, cranij fiderati sunt *τρυμνισμῶν* prorsus ab hac linea, nisi alterius luis sit suspicio excludenda. Signa dicta confirmant partis affectæ demonstrationes supra appensæ, quarum stante veritate sphacelismus faciliè approbabitur. Atq; hoc eo magis quo alias non semel visus fertur. Rarum eius rei exemplum in anatomia nostra Locupletata memoriæ posterorum ex Nicolao Fontano prodidimus, pueri cuiusdam Amstelodamensis, qui paucis retro annis loco cerebri, & spinalis medullæ

dulle aquam limpidissimam se&atoribus ostendit, ex liquata, putridaq; cerebri compage dubio procul expressam. Vt mirari nō satis valeam Cardanum summum alioquin nature artificem, sideratum vsquam in sectione cerebrum obseruari, temerariē negantem sensu oculorum repugnante, & ratione. Enimuerō vis siderationis, vt Hippocrati, Galenoq; placuit, in corruptione firmatur, & vitio quocunq; quod bifariam superinduci sum persuasus, à manifesto nempè causarum primarum incurfu, & occulta venenorum labe, ille calore, & frigore, hæc pestilenti aura spiritibus, & toti substantiæ inimica, conseruante calore, & *ιδιουγενῆς* partis debellata, consternit cerebrum, resoluit, & glaciei instar fundit, reliqua; inducit, quæ *νιξου* adamussim redolent. Quam putredinis speciem mollis eiusdem, humidaq; principiorum mistio tanquam ex facili sequitur, vt in nimio Veneris placidæ vsu experti plures, quorum immutatam *τοῦ ἰγνιφάου* substantiam vidit in Epistolis Horstius. Rationem suffulcit experientiæ fides fallere nescia, quæ cerebri abscessus, sphaceli & mulos, sæpe sæpius propalauit. Quamuis huius effati veritatem eo suauis rationis momento negauerit Serapion Arabum doctissimus, quod tensionem pars frigidior recipere minus videatur apta; tamē verior Aben Sina, vulgò Auicenna, extensionem cum nutritione, ce-

re.

rebro necessaria, pari passu composuit, & ex huius veritate, illius necessitatem summo iudicio induxit. Quod quotidiano rerum even-
tu prout astruimus. E nosocomio Pataui-
no quidam præterito anno ex vulnere capi-
tis accepto curatus, ut quidem credebatur,
quum certa salutis fiducia exiret, quadrage-
simo à vulnere die inopinata morte defun-
gitur.

Causa exitij cum variantium opinionibus incerta esset, mox aperto cranio euidē-
tius comparuit ingenti viso in substantia
cerebri apostemate. Similem superior huic
annus casus in Procuratore quodam Florē-
tissimæ Nationis Germanicæ, quæ Patauij
in Orbis vniuersi supplementum, Musis gra-
ta, & Serenissimæ Reipublicæ Venetorum
efflorescit, protulerat.

Hic ex leui capitis contusione neglectis
per imprudentiam remediorum prædijis
primò pedum, brachiorumq; Paralyfi mox
mature inde fato cessit. In eleuati verò ce-
rebri systemate nullum alicuius momenti
vitium, præter abscessum in opposito latere
enatum comparuit. In eandem rem conspi-
rat & Dodonzi observatio Lechargici à se
dissecti, cui in anteriori cerebri parte absces-
sus repertus, & pus interiori cranij ossis par-
ti adhærescens. Nec ab similibus soporosus al-
ter, Schenckio memoratus, apostemate ca-
rancæ magnitudinis aqua repleto muscila-

ginosa, prope nervos opticos in media finistri cerebri parte, nobilitatus. Quid autem longius abscissus ad has partes aduocari?

Propius instituto fauet Hippocrat. Aphoristica dicendi breuitate cerebrū *ερακλιζισθαι* certa dierum norma sanciens. De cuius tamen interpretatione, contentionis funem ducunt Eruditi. Galenus de spbaceli principio exposuit, eo ductus argumento, quod à perfecto nullus regressus. Applauserunt tanto viro Thriuerius, Marinellus, Hollerius, Mercurialis, alijq; Commentatores magni nominis, & eruditionis, qui imperfectum putredinis gradum cerebro condonarunt. Verum contrarij se præbuerunt Brasauolus, Cardanus, & Plantius; feruidè non sideratū cerebrum, sed concussum à quacunq; siue externa, siue interna causa propugnantes. *ερακλιζισθαι* enim pro *ἀνταρτίστισθαι* nō raro simili significationis flexu permutari à *εράττειν* sine dubio, quod iugulare ex repentino ictu, vel casu, notat, vnde Apoplecticum cerebri affectum per siderationem illam ingeniosè cōmentus est D. Antonius Stella, Neapolitani Gymnasij non sydus solum, aut stella, sed Phœbus. Quo pertinent laudata Cardano, Schenckioq; percussorum exempla sine cerebri interioris offensa à solo concussu exitiosa, quippe violentiori motu turbati spiritus, & cōstricti, nisi mora tridui ad se, locūq; redierint, de Apoplexia conclamatum, vt facile

cilè expreffisse Cous Senex putatur. Sanè
quanquam sua hæc fient probabilitate, no-
lim tamen in totum Galeni mentem repu-
diare, vt cerebri incipiens fit inflammatio,
quæ ad naturam suam redeat, pure confe-
cto, domata causa, & viribus à tertio die fu-
perioribus, quod ei in singulis humani do-
micilij particulis vfu venit. Quin si mei arbi-
trij efferem, non tam principium solum, quam
putredinis, perfectū in Hippocratis sphace-
lo gradum induceré. Hic enim, non imper-
fectus, breuem mortem accelerat, siquidem
visæ apud Hildanum, Carpum, & nos quoq;
cerebri non exiles portiones vulneratis ex-
cisæ sine vitæ noxa quidem, non putredinis
particularis. Adhæc considerationis illa species,
quam lethalem inficiatur Hippocrates in
Morbis, cum carie ossis capitis, & cuti vici-
næ, & subiecto cerebro aliquam corruptio-
nis labem impressit. Quo loco commodè
illius meminero, de quo nuper summo artis
detrimento mortalibus Io. Dominicus Sa-
la, Dux olim in Praxi noster, Patauij refere-
bat, in ipsa cerebri substantia gladioli impa-
cti frustulum perpetuo, reliquo curato vul-
nere sine detrimento hæsisse, aut actionum
incōmodo, nisi quod Comitiali morbo co-
mite vitam transegerit. In quo profectò à si-
deratione minuta immune cerebrum exti-
tit nunquam. Sola nos vrget adiecta Apho-
rismo clausula, reditum à sphacelo post ter-

tiam lucem non obscure spondens.

Quam equidem Martiani Hippocratis genij sequutus duam, transuerso hinc stylo perfoderem, partim quod eius conclusionis non meminerit in opere de Morbis, partim quod inter ea numerari possit, quæ à curiosis sectatoribus huic præsertim sectioni afficta leguntur, quam querelam ipse pluribus hinc inde Galenus instituit, tacitèq; approbarunt Senensis Hugo, & Thaddæus Florëtinus, dum munere explicationis fideliter functi, Particulam Septimam data, ut videtur, industria transuolarent. Quidquid autem sit, horum syderationem anginosam in duplici pono differentia, vel enim totius est cerebri equali tractu per vniuersum eius Orbem cerebrum pariter, & medullam diffusa; vel flaccioris partis substantiam insedens. Huius rursus, vel principium expendo, vel complementum, & vtriusq; vel æqualem, vel inæqualem tractum, ex quibus futuri rerum euentus certiori augurio diuinabimus. Syderationem namq; totius, si ad medullam peruenerit, nulla salutis spes micabit, subitaneo inuadente exitio. Cuius ex Galeno ratio in Commento, quia affectus sit grauissimus, & pars principalis, nobis intellecta, qui solam medullam, non cerebrum, nec cerebellum, partibus principibus accēsemus, à cuius quoq; nobilitate accidentium grauitatem pensamus. Minus à reliqua cerebri
sub.

substantia periculi, tum maxime ubi & in-
qualis sit, exclusis vasis, membranisque; & in-
ter initia putredo versetur. Non tamen ve-
idè cerebri laudem apertionem, quam
proposuit in sphacelo Hippocrates in co-
cis, & post eum Hollerius. Quia in perfe-
cto sphacelo frustranea, in incipiente pericu-
losa, ipsoque malo acerbior. Cæterum hoc
agmine ita ordinato, facile erit dubitantiũ
difficultatibus occurrere. Principio durum
non abs re videbitur cerebri in angina cor-
ruptionem, nullas febres, phrenitidesue se-
qui, quum ex leui quocunq; cranij vulnere
tot insurgant symptomatum monstra, & ci-
ta mors. Dubio difficili varias adaptabo re-
sponsiones, quas pro cuiusq; palato quiuis
seligat. Scilicet nouum in morbofo statu non
est exigua vulnera plus partibus principi-
bus nocere, quam abscessus, vlcera magna
simul, & etate, & more, quemadmodum sin-
gula percurrenti patet. Pulmo vulnerum
impatientissimus vomicas, tabidorumq; vl-
cera in multos annos perfert, propriamque
substantiæ corruptionem tanquam in sinu
anguem circumfert. Nobilissimum cordis
vilcus abscessus patitur in auricula, & in
utroq; sinu, tumores ibidem ex vario mate-
riarum contextu ortos, calculos, vermicu-
los, pituitam, pinguedinem, vlcera, magno
subiade temporum spiramento, quod vix
aciculæ puncturam in sinistro admitteret.

Pari pacto vulnera, siue iecoris, siue vesicæ, siue intestini tenuis, siue deniq; transversî septi pro lethalibus ablegat Cons Iudex, in quibus maiori vehementia tumores, ulceraq; & steatomata, lumbricos, & quoduis insecti genus patientissimè distinguas. Quorum singula ex Authorum diligenti lætione, plurima ex propria experientia, alibi fusius enarranda, non dubia fide mutuo. Diverfitatis autem ratio, si de cerebri constitutione loquamur; ex qua reliquorum fiat iudicium, ex tardiori ulcerum, tuberumq; generatione, & illabente aere, mea quidem conjectura emergit. Successivo quippe conge-
 sionis momẽto cerebrum in sensu pigrius, putredinis noxam velut consuetudine familiarem sine subitanea totius immutatione amplectitur, donec virus totum compleverit orbem, singulari præsertim cranij, membranarumq; obvallatu ab aere tutum externo, adeò in vulneribus capitis fugiendo, ut si exactam qualitatam symmetriam excedat, certum; & matorum ægro fatum acceleret. Addo solutioni prædictæ peculiarem veneni proprietatem, quæ in pestifera angina nativam cerebri temperiem ad sphaceli contrarium habitum sine inflammatione primorum elementorum sobole, apta est flectere, non alia sane ratione, quam cordis naturam sine febre nõ rarò pestilentia lues infringit. Opponent & similitudinem, vel si Philoso-
 pho

pho esse licet, idēritatem morbi huius cum Caro, soporoso affectu, alijsq; quibus spha-
celus cerebri communis videtur; Verum
enimvero & affectus sede, quæ his particu-
læ tantum cerebri, illi sæpius quoq; oblon-
gata medulla, & effeçtrice causa separantur,
illi aura quædam maligna, his ex comuniū
humorum aliquis nascendi debere occasio-
nem. Atq; ex læsa medulla, quo facto neque
Apoplexiæ, neq; Epilepsiæ anginoso morbo
inducuntur? De utrisq; sanè iam dudum fuit
suspicio, nec dubitare euenire, utrumq; si
per veneni vim diutius pausâ fecerint Cha-
ronteæ Cymbæ. Imprimis augetur de Co-
mitiali affectu coniectura, ex natura ætatum;
teneriore, spuma circa os morituris, & di-
serto Aetij testimonio, qui infantes hac aura
circa collum afflatos plurimos in vicerum
repurgatione conuulsionem passos asseue-
ravit. Id quod neutiquam de vehementiori
conuulsionis specie, aut Epilepsia, sed leuio-
ris saltus aliquo, aut contractionis gestu effi-
cto, qualem in pueris alias vidimus, libentius
interpretarer, quia pestiferæ suffocationis
hæc est indoles, ut sine vulgatis symptoma-
tis medullæ nobilis exitium moliatur.



EXERCITATIO IV.

De Curatione per Vomitum.

IN angina suffocatiua primas vomitui partes assignat magnus noster Seuerinus. De cuius consilij veritate, vt verum fatear, impensè semper dubitauì. Omnia discussurus quæ in contrarium obuerti possunt, experiar fauentis genij ductum, an calamum dubium in Seuerinianam opinionem flexurus fortassè sit. Adhuc enim dubius hæreo varia argumentorum serie promotus, quæ ex Indicantibus, vt vocant, Permittentibus, & Prohibentibus in angina pestifera scenam prodibunt. Initio quidem ab angina pestifera non indicari vomitum, dispar vtriusq; ratio ostendit. Illa enim morborum, quæ corpus miserum vexant, acerbissima, & maxima censeatur, siue motum spectes, siue morem, siue partem affectam intuearis, siue symptomata parem affectionem comitantia. Vnde remedia postulat virtute non inferiora, siquidem ex Leschia mentium norma, magnis morbis remedia magna applicentur, quorû vicem vomitus non supplet, nusquam inter magna auxilia ab artis nostræ conditoribus repositus. Ea enim nominis prærogatiua gaudent tantum venæ incisio, & per alium purgatio. Neq; peccantis humoris situs vo-
mi.

mitum indicare potis est. Oraclum est mag-
 ni Præceptoris nostri, morbos ea parte
 qua proximi sunt, educendos, & qua parte
 singulis patet exitus, illac extrahendos. No-
 stræ autem affectionis noxam non ventri-
 culi ambitus complectitur, siue causam ma-
 li consideres, siue malum ipsum, sed illa ce-
 rebro, hoc partibus collum componentibus
 insidet, quas sedes per vomitum proximum
 expurgari quis dixerit? Verum ex permittē-
 tibus inueniamus nè vomitum utilitatem
 iam inquiremus. Primarium permittens sit
 robustior corporis constitutio, siue quoad
 vires, siue quoad confirmationem, mox suf-
 ficiens ætas, temperamentum aptum, & tã-
 dem consuetudine acquisita vomendi faci-
 litas. Hæc in morbo anginoso puerorum
 deficiunt omnia, qui corporis naturalem
 imbecillitatem minus resistere potentem,
 ætatem puerilem, & ignotam consuetudinis
 intercipit, imò humida carne præditam, de
 qua cautione Hippocratis extat effatum
 in veratri vomitorij nempe remedij usu, vi-
 tandos maximè humida carne præditos, &
 subsecos, & balbos, & blæfos. De prohiben-
 te ætate Aëtius, & Plinius cum senectute
 puerile coniungunt ad veratri usum ineptam.
 Quod ideo amplectimur libentius, quia &
 vires in his, qui peste hac corripuntur na-
 tura partim, partim morbo debiliores, quã
 conditionem ætati puerili prohibentem

addi

addi voluit in Emeticis Petrus Castellus, vir Maximus. Prohibentium vomitum in angina nostra numerum augent imbecillius puerorū caput, colli vitiū, & thoracis affectus. De capite Celsus pronunciat: Quibus caput infirmum est, maximè alienus vomitus est. Et suadet ratio vehementiori stomachi motu eleuari ad caput per se imbelles vapores, turbari spiritus, & concuti membranas magne ægri capitis damno. Quamquam Celsus, vir eruditus Emeticorum fautor de capite non morbo, sed natura imbelli, laxo, & raro interpretetur, nostri instituti tamen iuvat conatum puerorum naturalem cerebri flaccitatem ex mala conformatione, & seminarij parentum veneni, & aeris pestiferi influxu dolentem, quibus ad fide-rationem peruenisse supra ex Seuerini mente demonstratum quum sit, maiorem sanè capitis imbecillitatem nec vidimus, nec cōcepimus. Vomitum quoq; in gulæ apparatus morbofo damnant certatim omnes antiqui pariter, & nouitij. Rotundo sermone insinuat Arabum Princeps Aben-Sina noxiū vomitum jis, qui pectus strictum habent, & malè anhelant, collum, gacule, & apostematibus, quæ in ipsorum gulis nascuntur, apto. Profecto si dispositio colli nuda ad apostemata purgationem per superna inhi-ber, quanto vehementius præsens iam gulæ abscessus? De quo clarius Galenus com-
men-

mentatur de humoribus, cauendum monens, si quem in gurgulione, aut faucibus, aut ceruice, morbus exercere consueperit. Quorū authoritates inuicta firmabo ratione. Vomitus quippè in abscessu colli anginoso materiam ex ventriculo noxiam reuocat ad affectam insigniter partem, conatuq; vehementi eandem irritat, & si dicere liceat, contra omnem medendi regulam, quæ per partem affectam expurgari humores concedit nusquam, curatione defungitur. Simile de affecto thorace, contentisq; in eo partibus iudicium, quæ non alibi magis quam in suffocatorio hoc puerorum affectu à vomitu dilacerantur, vbi & respirationis adest difficultas, cordis defectus, & suffocationis periculum. De hoc Sibillæ folium Paulus Ægineta recitauit, vbi vomitus commodè ad examē vocans, aduersari refert ijs, qui suffocationibus sunt opportuni. Reliquorum veritatē testimonio summi Medicinæ restauratoris Pergameni tueor, qui libro de Humoribus in purgationibus per superiora tusses suadee obseruari, asthmata, interna vlcera, ac pulmonis tabem, iecinoris pariter colliquationem, & sanguinis sputum. Quo cum sentit & Actius fideliter de Vomitibus monens, sanguinis reiectioni contrarios esse, strangulatibus vteti, naturis nauseabundis, animi deliquijs his qui à suffocatione assidue vexantur, & qui ex qualibet occasione caput dolent.

Ho-

Horum autem symptomatum ferè omnium *εὐρίσκειν* quum in Pz danchone oculata fide aduertamus, miraculo sanè non caret vomitum perniciosum in salutis vocari auxilium. Vt silentio præteream reuulsionis, & euacuationis modum, per inferiora tentandū, contraria videlicet ad partem laborantē via, per vim quasi reuocari. nolente & natura, & ventriculi structura, in primo præsertim vitæ limine, inglutitioni destinata, non contrariæ regurgitationis officio, à quo & animantia cetera, & stomachi rotundiora fibrarum oscula, post pastum velut sine naturæ adepto, concidentia abhorrent. Et hæc quidē contra vomitus vsum animo concepi. Quibus an aliquid ex veritatis fonte reponi queat, porro videbimus. Non latet mihi difficile saxum volui, sed obfirmandus animus seria naturæ cogitatione, vt ad vtranq; controuersię partem promptum se exhibeat, & indifferentem, qualem subinde Amicorum gratia Sceptici induimus. Ad primum quod de minori vomitorium, quam requirat morbus magnus, efficacia; non vno modo respondere parati sumus. Enimuerò vomitum replicabimus in fortiori medicamentorum censu haberi, quam purgantia, vnde valentibus tantum helleborum propinat Hippocrates, purgationem per inferiora, debilio-ribus. Quodq; inter magna remedia à Galeno exulet, duplici factum reor de causa, seu quia

quia propofiti memor duo fuma genera remedium conftituens, diuerforum eradicatorum, fanguinis nempe, & humorum aliorum, fub hac purgationis nomenclatura etiã Emetica comprehenderit: fua quod minori loco, remedij hoc genus, æftimauerit, quo fanè titulo malè ab Eruditis Hippocraticæ antiquitatis feftatoribus Pergamenus audit. Quod fi id nolis refponfi, debiliorem morbo vomitionem nullo meo damno affumam, fed optimo medentium inftituto, morbi non fatis cogniti exordio debiliora tentantium, itã viam monftrante Coo fene libro de Locis. Quin ex fententia fcholę communis, præparationis munus aggrediatur, dum ad maiora illa præfidia aditum fternat fecurior. Verum ex rei veritate, quocunq; remedij gradu vomitum habeas, præmiſſa venæ apertione, magno utiq; auxilio, reiectionem per os præcipit ingenioſus Seuerinus. Maior ex fitu humorum urget nodus, qui cum Pædanthone non fit in ventriculi cauo quærendus, fed thorace collo intermedio, & capite, fruſtra vomitum fine utilitatis fenſu moleſtum excitabimus. Hunc ut ſoluamus, diſtinguenda ſemel vomitus indicatio primaria ab illa, quę ſecundaria dicitur, ſeu per accidens, deindè inter cauſam præeuntem, ſeu fouentem, & coniunctam, mox inter ſymptomata, & morbum accurata hic ſeparatione utendũ. Primariò quidem vomitum indicat præſens in ventriculo

eulo materies, secundariò verò vicinarum partium plenitudo, siue ob communem reliquarum partium cum ventriculo consensum mediantibus membranis, vasis, & vicinitatis iure, siue necessaria sequelæ ratione per reuulsionem humorum, & antecedentis causæ, forsan & fouentis euacuationem; siue deniq; per vicinarum compressum, qui partim remotis ordine recto communicatur, partim quiescentem singularum vim ad expellendû suscitatur. Et quamuis morbum pressius non tangat in cerebro fixum, sat tamen fuerit, si causam fouentem detrahat, leniat symptomatica, quæ ob instans suffocationis periculû, vniuersam ferè ad se operâ trahunt, & morbi prauam sobolem in collo manifestâ vel exterat, vel imminuat. Quo id autem fiat modo, post pauca edisseram. Iâ ad singula progredior. Vomitus dixi scopo principali ex ventriculo latentem, impactûq; arctius morbi puerorum anginosi causam expiare, quæ fomitis instar perpetuo noua mali incrementa capiti, collo, & thoraci suggerit, siue bilis feruidioris sit substantia in æruginis iam, vel porri malignitatem transmutata, siue pituita candidior, quam auida puerorû ingluuies quotidie generat, siue sporadici veneni & mullæ putredines superiora partium affecta fouentes. Seruit insuper expurgandæ vicinæ medijs ventris regioni, in quam per arteriam asperam ex faucium voragine destillauit labes,

su-

suscitata respirationis difficultate, & in superioribus quoq; extremo suffocationis periculo. Quippe excitatus à vicino ventriculi, septi, medij, & muscutorum motu pulmo, cōstringitur simul, & dictum factum exprimit, quicquid in eo purulenti collectū haret. Cui motu subsidia pharmacij vomitorij, præsertim Antimonij, opera accedens selecta illa trahendi qualitate peccantis puris particulam ad stomachū vocat, vel recta per spiritum secerat. Non alia quidem ratione, quā in tuberculo pulmonis cū vomitu pharmacij vi concitato pus consequutū in l. de Morbis Hippocrates prodidit. Non id per spiritū solum, ut arbitror, sed immēdiato ad ventriculū ductu per phrenicas arterias ex Diaphragmate productas, vel cœliacas venis ventriculi per anastomosin cōmissas, vel alia quacunq; via ignota, quā indigna subinde natura ex se modo facit, modo factā inuenit. Expeditori modo gulæ partes in Pædaneone, vomitu inaniuntur, ab Emerico videlicet pharmaco transeunte, partim resolvente cōpactam in consillis pestem, partim inflammationē temperante, partim quoq; concussione partium communi spontaneam adiuuante excretionem. Parem, si non maiorem ex vomitu utilitatem experitur caput in abscessu puerorum suffocatorio primario tentatum, primò materiæ fouentis reuulsione, qua ex stomacho retracta, spontè sua succedit capitis

tis inanitio tanquam iure successionis ad inferiora prolapso veneno, q̃ technica quoq; medicaminū attractione perficitur. eo planē modo, quo per masticatoria, & nasalīa fluētem humorem elicimus. In quo rerū conatu conturbatur cerebrum, & proprias partes cōstrictum vehementius agit, ad ventriculi membranarū contractum se componendo, continuata partium inter utrūq; compage, quæ ad alterius motum mouetur, & ad cōstrictionem pariter retrahitur. Quod superioris purgationis beneficiū non capiti per aliarum partium consensum solum, sed & *idiotis* affecto salutari euentu præbetur, ut sexcentis in locis profitetur Antesignanus noster Hippocrates, cumq; vno ore sequuti omnes, qui Diuinæ Arti nomen suum inferuerunt. Cetera permittentium dubia ad indicationem Virium spectant, temperamenti nempe, ætatis, consuetudinis, quæ quid agendum non prohibent, sed mensuram singulorum, quam quantitatem nuncupat Galenus, ut in paucorum morbis, depilium, aut insuetorum non sit adeò fugiendus vomitus, quā huius in debita ætate, viriumq; mensura excedentes vsus gradu minori temperandus, & quantitate.

Quo digitum intendit Oraculum Cœm in Morbis, ad aphtham pulmonis curandā, si potens sit ægrotus, Veratrum per se, sin minus, porionis dimidium exhibendum scripsit.

piſſimè præcipiens. Qui indicantis vomitus ſpecificus gradus in electione materiæ medicinalis quoq; ad uſum ætatis puerilis, & tẽperamenti, variari abſ re non erit, vt nos non promiſcua electione Pædanchonen vomitu, ſeu veratro, cuius iam ob ignotã præparandi rationem inoleuit ferè uſus, ſeu alijs vchemẽtioribus curemus, ſed benigniſſima ſtibij ſalutaris præparatione, quam in omnẽ formam mutatam pueris anginoſis innumeris innoxie exhibuit Seuerinus verus Parthenopes Machaon, & ipſi filiolo Hyacintho, quem dulcedine auxiliij adeò cœpit, vt ſingulis ferè menſibus à Parente ſũmo precibus non fictis perpetuum vini eius hauſtũ viderim extorſiſſe, ea tamẽ cautione, vt ætatis puerilis intuitu poculum exigua doſi dilueret. Eam medicaminum ſelectionem antiquis fuiſſe uſitatam in virium infirmitate nõ inani coniectura aſſequor, debiliuſq; veratrũ nigrum fortioribus albũ præparaſſe. Qua diſtinctione vis aduerſantium nobis auctoritatum cuitatur, quarum aliquæ à pueris vomitũ prohibebant, admittebant aliquæ, idq; nigrum Elleborum, quem albo præferunt ob temperamenti mediocritatem Meſues, Matthiolus, & Condronchus. Quæ opinio noſtra noua ex textu Hippocratis in acutorũ viũ nata, qui valentes elleboro albo reuellẽdos ſignata oratione notauit. Notandum autem ad vberiorẽ argumenti ſolutionem, viriũ,

H

ætã.

ætatîq; robur nunquã adeò in Pædanchoneſt principio diſſectũ, niſi fatale portendat exitium nulli remedio tentandum, vt lenia Emeticorum repudiet medicamenta, nam, in vigore morbi libetius ijs abſtinemus. Cõſuetudo prorsus ~~impediatur~~, quæ ea eſt ætate, vt cum alijs ortus ſui initium ſine diſcrimine capiat, ſacili ſcilicet ventriculo, & laxo, humorũ in eo copia, victus ratione humidior, & reliquis ad ſequendum artis Medicæ du- æum quam promptiſſimis.

Nec magnopere prohibentia ſtringunt, quanquã & capite laborent anginoſi pueri, & collo, & thorace. Repleatur ſanè caput excitato vomitu? ea facilitate euaneſcent ſubitanei illi vapores, qua generati fuerunt, (ceſſante conuulſiuo vomitus motu, quo eleuati ſpirituum in morem ex ſtomacho prodierant) ſive per nariũ decliua, ſive inſenſi-ẽ diſcuſſum, ſive condenſati à cerebri frigidi- tate per palati infundibulũ ſeceſſerint. Quo minus autem mala capitis diſpoſitio vaporibus excitatorum in vomitu humorũ affligatur, obducendam capiti ſaſciam ex linteo ar- etam præmonuerunt Authores noſtri. Quod ſi infirmius ſit caput, quam vt vomitui reſiſtat, Emeticorum fortium uſu minori, quoad ferre poſſit, permutandũ cẽſeo, de qua Emeticorum vehementia, non tẽperatura parti debita, explicandus omninò Celfus, ubi vomitũ infirmo capiti alienum ſtabiliuit. Quũ
alibi

alibi ipse cū tota antiquorū schola vomitū probet in vlceribus capitis, insania, melancholia, apoplexia, Herculeo morbo, hæmicrania, cephalæa, paralyfi, & reliquis affectionibus penè omnibus, quæ caput imbecille vexant. Sin eò peruenerit anginosi puerorū capitis status, vt sidera imitetur, deposito vomitus consilio conclamandum.

Grauius contrariæ sententiæ pondus suggerit pars gulæ offensa, inflammatione, & tumore, per quam nouum materiæ fomitem ducit euomitio. Sed perit apud nos argumenti vis, qui Seuerinum omnia medicato iudicio pensantem, defendimus. Enimuerò per partem affectā euacuationis ergò peccantē causa ducere, inauditum Asclepiadis non est, qui intestinorū vlcera, seu Dysenteriam per aluum curant, menstruum quoduis vitium per os vteri, per vrinæ ductus eorundē egritudines ducunt. Vnde maiori securitatis fiducia anginam per vomitū tentamus, à latere tantum affectas tonsillas lambentem, & in transitu materiā tuberosam simul, & damnū inflammationis soluentem, quod vt per partē lēsam fiat cōmodius, cito transitu totū opus absoluunt Emetica. Damnū verò si quod est, maioris beneficii cōmodū compensat, quē admodum in re parū dissimili ad Methodū inculcauit Galenus. Purgationes per alui extrema tentari hoc casu neq; debēt, neq; possunt. Non debent ob malignæ naturę suę ne-

ecessariam copulam, qua oleum igni adderet, neq; possunt ad tardio rem motum, quē pessilens angina, nullius moræ patiens, non expectat. Naturam contrariam frustra inculpamus, quæ omnem æquo animo excretionem didicit perferre, ambiguis ad id negotij fibris non expellendo, sed firmando ventriculo dicatis. Claudii quidem ventriculi ostiū vltro dederim, sed coctionis tantū spiramēto, quo vomitum noxiū planè damnamus ex Galeni de Phlebotome cōtra Erasistrati sectatores disputatione. Quibus omnibus pro re nata in vtramq; sententiam ventilatis, & difficultatē agnoscas, & Severini ingenium diuino instinctu omnes superās, quod vt vltius admiseris fauentia vomitui Pædanchones momēta scribam pertexam. Agmen ducant claræ Authorum nostrorū voces, Celsi nēpe, & Aetij, quorū ille ad linguæ resolutionem, & spasmū Cynicum, hic egrè spirantibus, vt & anginis occultis, manifestisq; Emetica probauit. Nec vtriq; ratio defuit, si æqua mecum lance rem expēdas. Quippe excitatus motu vomitorio linguæ calor resolutionis damnum facilè refarcit, & vibrato flexu spasmū reducit, ab arctiori autē materiæ infarctu excitata respirandi facultas, eadē compressionē resoluitur. Quorum pressis insistent vestigijs æui nostri Doctores quidā præsertim Spagyrici Hartmannus, & Faber, vterq; in arte exercitatus, nullum pro angina præsertius remedij genus, quam

quam per superiora reiectionē, experientia edo&1. A qua sanē angina simplici ad pestiferam vi maioris argumenti valet demonstratio, quam *ἀντισπῆς* vrbis nō itā pridem infectæ, terror Charontis, & solatium viuorū Seuerinus sapiculē expertus est. Idq; præmeditato medendi conatu, quem vltèrius inui&to argumentorū apparatu laudabo. Nā magnis morbis paria debētur subsidia, & acutis, pestiferisq; *διὰ θύρας* quæ cum mora certum trahunt exitium, eadem celeritate, & salutifera natura auxilijs, quā fieri potest citissimè occurrendū. Quos perfectionis numeros solus implet vomitus, non quiuis, sed quē ex antimoni puluere inuexit perspicax Seuerinus, siue ipsum expendas subsidium, siue subsidij materiam. Remedium ipsum cito transitu, & vehementiori partim abscessū gulæ suffocatorium resoluit, partim resolutum euacuat, partim nē in principio cōgeratur accuratius prohibet. At remedij materia quid non confert? Malignitati pestiferæ contrariatur, & sūmo opis experimēto malignis se febribus applicat, inflammationem gulæ sedat, vel extinguit, contra quam operantur alia siue Lorum Scribonij, siue Veratū, siue Nicotiana herba, imò quod mireris magis, sium vrgentissimā præsentaneo iuuamento debet, vt de quodam felicissimè Neapoli à se curato mihi testatus est Seuerinus. Hæ antimonicī poculi sūt dotes, hi effe&us, propria quasi pro-

prietate angina pestiferæ insidiantes . Hæc præter duplicem fructum ex totidem vomitorij regressu imaginor, & impressam ab eo in affecta parte virtutē eo discedente, adhuc superstitem. Tandem, vt probare probatissima finiam, eo magis in angina eligendus vomitus, quod subindē naturæ ductu fiat , hanc viam in Pædanchone monstrantis. Vt taceāt iam suspiciones vomitui, tanquam contrarię naturæ aduersantes, quem adēdō quidam naturalem habent, vt non alia via excrementa naturę deponant. Id in vtroq; animantiū genere obserues, homine brutisque. Præteritis retrō annis per Italiam ceteram, & Patanij, me præsentē, oberrabat vir quidā consistentis ætatis, & benē habito corpore, cui Annæ nomen ob fœminæ primam faciem inditum fuerat. Huic cum à primis incunabulorū annis clausus esset & anus, & vrinæ meatus, naturæ quadā facilitate duriora coctionis primæ recrementa statis periodis per os quotidie regurgitabat, aquosum verò secundę coctionis serum per fungū quendam spongiosū sub vmbilico pendulum exstillabat , quā historiam alibi in Opere de Fungosis Morbis clarius perreximus. Viperis eadem excernēdī per os superflua, naturæ est conditio, quia in inferioribus patentē exitum genus dene-gauit, iam quotidiana de canibus, hosq; imitaturis hominibus vulgata, & domestica, in præsentiarum transmittō ad finem properās,
&

& totius disputationis terminū duplici omnino distinctione signandū. Vna erit Morbi, & Causæ, altera temporū vtriusque. Morbus summus, totam cerebri substantiam irrigans, frustra Emeticis expugnatur, nouitij verò, & lenioris, siue in capite, siue collo affectionis constitutio purgatione supera, velut diuina virgula, exanimatur. Causarū in ventre præsentia duplici tempore definitur, vel morbi principio, vel declinatione. Vtroq; momēto Emetica frequentiora suaderem ego. Ibi ad exturbandum causarū cumulū, hic reliquias fortè ab affecto loco delegatas, extergendū. Sed contra murmurantem audio, concocta in declinante angina, grauitate sua ad aluum vrgerè, non stomachum. Cui dictum velim, grauiora etiam vicinis locis expurgari, vt in capitis vlceribus, pulmonūq; purè docemur, & ventriculum collo proximè subiectū, tonsillisq; arte irritādum si sponte nolit. Deniq; quod primo vomitui obuertitur ex Hippocrate in victu acutorum veratri vsum graui-ter damnaute, si inter initia versetur inflam-matio, nostrę angine iugulum non petit, quia malignitatis certā excipit suspiciōē, cuius nulla, si differatur speranda maturitas.

Ad summam complemēti dicam vnū. Sa-tius est paulo vehemētioribus auxilijs natu-ræ periclitanti opitulari, quā benignioribus vtendo medicamentis naturæ proditorē ha-beri; cum, s. vires ferant. nā in earū debilitate.

nunquā magna remedia sunt adhibenda: quę verba sunt Rasis in continēte: cui adſtipulatur Iac. Pontanus in meth. l. 3. par. 3. c. 7. q. de regulis Therap.

Atq; hęc pari cū calamo paſſu euomui potius, quā ſcripſi, & reieci in chartā, antequā concepſſem, in iuſtam vomitus ab Excellēti planē viro propoſiti laudem, cuius exactam omnia ſapiunt digeſtionem ſine vomitu, aut nauſea, vt merentur, amplectenda.

EXERCITATIO V.

De Sanguinis miſſione.

Phlebotomię inflammationibus neceſſitatem haſtenus negare auſus eſt nullus, quanquā de febribus aliqui dubitarint nouiti, qui in earum cauſa a cōmuni ſchola diſſident. Neq; anginę præſentius remediū nouit antiquitas, ſalutari venę ſectionis uſu, qui ſubitaneo auxilio, confertimq; cruorem, ſiue læſis partibus inſidentem, ſiue ad eas accedentem exhaurit. Quę quum in Pēdanchone acuta concurrant indicationes, de remedij genere nos ſecuros iubet ratio, & experientia. Accedit autem huic anginę ignota alijs inflammationibus peſtilētia, cui ideò aduerſatur ſanguinis turbatio, quia ad interiora inanitis vaſis venenata vis recurrit. Pro ſe, febreq; peſtilentiali reſpondeant, qui id ſaxū operoſe volunt, ego anginę peſtilēti minus

periculi timeo, quòd veneni noxæ intra colli ambitum constringantur, huic parti adeò sic propria, & determinata pestis, vt extra eam veneni deponat nomen. Certa enim singulorum membrorù venena scimus alias partes sine damno occupantia, quæ apud Authores sparsim leguntur. Vnde retrahatur licet ad interiora ex colli regione infestus gulæ sanguis inani sanè metu cætera percurreret. quanquam difficultas hæc ex loco secādo, de quo inferius, pressius solvatur. Sed prohibent tenuiores vires in acutis morbis, malignisque consuetæ, & ætas puerilis huic malo familiaris, quibus vtriusq; noxiam phlebotomiâ Galeni sexcenta loca clamant. Virium quidem in acutis iacturam maturû anteuertat ex sanguine auxilium in morbi primo insultu præmissis præparantibus tentandum, ne mora longior salutæ remedij tēpus interturbet. Phlebotomiam autem in pueris tum demû damnat Galenus, etiam maximè necessariâ, vt in Angina, Pleuritide, & si ad animi vsq; fiat deliquium, adeòq; non absolūtè ex ætate sanguinis prohibet missionem, sed quantitatem determinat, quemadmodum optimè, vt omnia, mentem Pergameni contra Siluaticû in Abusu Phlebotomiæ explicauit Petrus Castelius. Vel dicendum puerorum naturâ Galeni quò imbecillem tractu temporù sumpsisse augmentû ex mutata viuendi regula, quæ iam vinû etiam in cunis concedit olim

ætati huic interdictū. Nequam sanè gentiū. religiosè adeò ætas illa habetur, vt quondā visa est. Memini enim Parisienses Medicos Principi Delphino, nunc Regi Christianissimo vix bimulo aliquoties aperuisse venam, alijsq; idem permisisse. Nec ætati parcunt Hispanorum Æsculapij. In Septentrionali contra regionū nostrarum plagā ante annos pubertatis nūquam ferè puerorum phlebotomen tentant, vt illuc terrarum, Romanum Galeni Cælum migrasse crederes. Ratio in externo frigore, humidioriq; corporum temperie firmatur, habitibus candidis, ac molli- bus, teneræq; carnis, quo charactere sui sæculi Gallos describebat Galenus.

Quidquid horum sit in Pædanchone necessariam sanguinis immutationē vltro largiuntur omnes, vt frustra sim, si id fusiori calamo persuadeam. Aliquid tamen locorum differentię dandum, quæ vt hominum tēperies, ita medendi rationes subinde immutāt. Ansam moniti præbuit laudati Castelli inter nos Messanæ hac de re ortus sermo, quo in angina ea pestilenti nullo successu phlebotomiam ibidem institui certam fidem fecit, sed omne præsidium se in deiectione, & medicamento simplicium syrupum seu Violam, seu Rosam poculo nō fallaci experientia collocare. Causam in tenuiore Siciliæ aerē, & bilioso, adustoq; incolarū temperamento, nisi me fallit conjectura, referrem, quod non sanguis

guine, sed alterantibus notandum. De loco maior inter morbi noui curatores dissentio, quæ ad duo referuntur capita, pars enim extrema pedis secanda, alij iugularium vicina sustinent. Sed ex duplici sectionis fine his dirimenda, nam vel reuulsionis gratia instituitur, vel deriuationis. Illa remotissimas partes querit, hæc vicinas. Ex alterutra vt in Pedanchone fiat electio, vrgentior hic scopus iusta fidelitate expendendus. Vrget inflammatio cum tumore, & venenatæ qualitatis suspicione. Omnes euacuatione, deriuationeque impacti humoris indigent, non reuulsionem. Enimvero hæc ad præcautionem augmenti utilis, non curationem præsentis, quã requirimus. Illa cum opere ipso citam perficit sanationem, hæc ad longinqua trahens longiori mora spem differt, & auxilium incipienti affectus acutissimi momento protrahit. Illa venenatum sanguinis contagium dicto citius exhaurit, & foras elicit, hæc ad interiora reuocat, & ingrati hospitem nobilissimæ arci obtrudit, adeoque in eam nos coniecit difficultatem, quam sanguinis in pestilentia ab istius acius obuertunt. Verumque quippe si & suppositione cor transit cruor, qui in reuulsi locum succedit. Scitæ saphena à venis trahit cruralibus, hæc truncum descendente rursus sollicitant, qui venæ cauæ fontem adoritur, à quo, vt iugulari, subclauiaque cor influentem sanguinem excipit. Aut si cir-

cu.

culum velis, apertæ pedis venulæ à socijs arteriosis implentur, quæ mox à cruralibus, & descendente arteriæ trunco, hîq; ab aorta continuo vase petunt, eâdem per cor ex caua, eiusq; ascendente furculo ad hanc reuelendus humor transit. Vtroq; autem tractu quanto locorum ambitu, & quo detrimento affectæ partis, & admitteretis cordis auxilium protrahat reuulsio sine me vasorum series loquitur. Vnde prudenter imprimis, & ad rem sagax ingenio Seuerinus, in Pêdanchone pestilenti iugularis venæ sectionem, summo successus emolumento induxit, quâ in pari istarû partium affectu salutarem antiqui Medicorû Principes, Actius, Paulus, Trallianus, Aëtarius, aliq; non pauci commendauerant. Profecto siquidem in angina simplici, & si ad hâc fiat cõparatio, innocua, tanto successu iugularis apertionem experti sint omnium ætatum sapientes, maiori dubio procul effectû in pestilenti, hic conuincta intemperie circa genus euacuatoriû versabimur, quia eliminari magis amat, quâ vel corrigi, vel retrahi. Verû ex ea Phlebotome magnam contrariæ sententiæ pondus emergit. Obijciunt enim ad supremas partes factâ incisionem aduocare potius sanguinẽ ad affectum locum, quam euacuare. Gordio nodo durior difficultas autoritatibus soluitur, & in rem nostram rationibus. Illas in Diatriba politissima Seuerinus attulit, has ex ingenio

nos

nos subministrabimus. Negare utiq; non possumus euocato ex iugulari, vicino tonsillis vase, sanguine peccante, statim immediato fluxu alium succedere, siue ex caua ascendente, siue arterijs carotidibus; sed minus hoc mali esse, cōtra vrgemus. Putridus. n. tōsillis infarctus, suffocationis periculum intentans, & venenata vi præditus summa utilitatis spe per sectam venam confestim extrahitur, siue ex venulis partis, siue ex spongioso tonsillarū corpore. Cui quidem quāvis vel ab inferiori caua trunco, vel arteriarū iugulariū vicinis ramis recens, puriorq; sanguis nulla pestilentiz labe infectus vtrinq; succedat, nec subitaneum suffocationis inferet periculū, nec veneni suspicionem. Vnde nos, quia omne in exhaustiendi sanguinis celeritate præsidium, & certam curationis fiduciā ponimus, iugulares meritō cum Seuerino laudamus. Quid autem nouo fiat affluxui? Non ad curationē præsentis, sed præseruationē futuri mali, hæc cura spectat, quæ reuellētibus data occasione tentetur. Cætera pro iugularis sectione adeò feliciter exposuit Author noster, ut nefas sit soli lucem fenerari. Parua de Arteriotomia superest ambiguitas, quam nō inutilē Pēdāchona futurā duplici argumento suspicor. Principio, quod affectibus capitis, quibus anginā pestilentē superius ascripsimus, singulari partis proprietate succurat. Oculis calido sanguine, ac vaporum pleno turgētibus

bus arteriam inciderūt Galenus, & Paulus. Idē in Phrenitide nuperæ Panaroli Romani Medici obseruationes persuadēt. Maniæ verò ad miraculum vsq; cum Ægyptijs suadet Seuerinus, quod præsentē Mariæ Schipano grauissimo Parthenopes Hippocrate, & Celso rediuiuo non infeliceiter cesserit. Morbo quoq; Comitiali idē remedij genus me præsentē in amplissimo Incurabilium Nosocomio applicasset, nisi scrupulosū aliorū dissuasisset consilium. Quibus cum affectibus dum Pēdanchone cognationem habet, in parem phlebotomen lubens cōcedit. Altera ab euidēti ratione ratio succurrit. Dissecta quippe capitis manifesta aliqua carotidis arteria, fluentem ad partem affectā alioquin sanguinem intercipit prōptē, & prōptius euacuat, hinc .n. partibus suggeritur sanguis, exindē per venas interspersas rediturus. Quod institutum, vtpotē præseruationi dicatum, cōmodius peracta iugulariū venarum euacuatione reservatur. Modum autē ipsum sectionis, & sectę glutinationis dexteritati Chirurgici relinquimus, qui id ex Authoribus nostris expressius didicerit. Præter dictas phlebotomes species non iniuria de linguæ, nariumq; venulis dubitatur, an eodē medentiū scopo veniant aperiendæ. Anginam certē exsecris sub lingua venis profligatē Medicorum antesignanos, extra, debitationis est aleā. Nec minora mihi ex narium, siue spontanea, siue pro-

prouocata hæmorrhagia spondeo, quã maioribus venis in virũ imbecillitate substituit Abensina, apud Ægyptios adhuc nõ soli puerorum etati, sed adultiorum in omnibus doloribus, & capitis inflamationibus quacunq; partẽ occupantibus frequentatã. Hancq; eo fidentius admitterem, quo puerili sexu communior, spontẽ sua natura plerũq; per nares se exonerãre, quod alibi inculcat Hippocrates, & rationẽ ex copia sanguinis huic etati, minus absumẽti familiaris, Galenus repetit. Probauit eandẽ propria experiẽtia Amatus in febricitante puella annorum decem hæmorrhagia largiori à morbo liberata, nec repugnat Anatomica ratio eundem venarũ ductum à iugularibus solito carotidum artiarũ commercio expãdens. Vim opinionis firmãt crebriores per nares in Pẽdanchone visæ crises, quas quia eò vergit humor, prudẽs naturæ imitator promoueat. Qua mête Ægyptiorũ medentes, teste Alpino, criticis diebus, quum per stillas aliquot parciorẽ hæmorrhagiam præsagiunt, nares ad profluuiũ irritant. Irritandi autem modum varium diuersi elegerũt. Ægyptij scarificatu totũ opus feliciter absolũt. Europæi pleriq; hirudines applicant. Setis suillis sanguinẽ prouocabãt Trallianus, & Rõdeletus. Abq; alias inuenerũt rationes, quas longũ foret recensere. Placet Niliaca scarificatio, nec displiceret ferro aliarũ venarũ instar referari nariũ vascula,

ut & aliarum corporis partium, quæ inanitionis indigent. Nescio .n. cur hirudinum tantus apud mortales creuerit amor, ut quacunq; ætate, morboq; omni Neapoli, & Panormi frequentius applicentur, ex quibus tamen tot fistulæ ulcerosæ in Xenodochijs quotidie prostant. Quæ incômoda ex maligna bestiarum natura augentur, quàm in Pædâchone, per se maligna serio vitare. Ut silencio inuoluam abominationis imaginem in sanguisuga expressam, quæ remedij loco nobis habetur, quam poenæ vice olim Numen voluit iusto iudicio mortalium cruorem lingentibus bestiis expositurum. Quare melius barbara Indorum gens hirudinibus aculeos substituunt canis cuiusdam Hoitzelaquatzin dicti, qui hirudinum instar partibus admoti, non prius decidunt, quam sanguine cavitatem repleuerint, ut ex Mexicana Anonymi Historia apud Illustrissimum Equitem Cassianum à Puteo Romæ intellexi. In quo nomine, ut auspiciatissimo, & Diuis sacro, sponte acquiesco, & ad eius limen pedem sisto, ubi pleno confesso Musæ omnes habitant, & Charites, nè vltiores gressus malum aliquod omen forsan offenderet. Quamquam plura suggereret genius, quæ in amicissimi Seuerini gratiâ diffuso calami obsequio expenderem, malo tamen intra pauca subsistere, quam in pluribus errare.

FINIS EXERCITATIONVM.

